

ריבroxaban דקסל 10 מ"ג, טבליות מצופות

כל טבלייה מכילה ריבroxaban (Rivaroxaban) 10 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים ומלריגנים בתרופה - ראה סעיף 6 " מידע נוספת" ובסעיף 2 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העיון עד סופו בטרם **תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעיון, לתרופה **ריבroxaban דקסל 10 מ"ג** קיימים כרטיסים מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול **בריבroxaban דקסל 10 מ"ג** ולפעול על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצריכן בטרם תחילת השימוש בתרופה. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

ריבroxaban דקסל 10 מ"ג מיועד ל:

- מניעת הייצרות קריישי דם בוירידים, במבוגרים לאחר ניתוח אלקטיבי להחלפת ירך או ברך.
- מניעת חזרה של קריישי דם בוירידי הרגלים (פקקת ורידים עמוקים) ובכלי הדם של הריאות (טסחף ריאתי) במבוגרים, לאחר השלמה של לפחות 6 חודשים טיפול לפקקת ורידים עמוקים או לטסחף ריאתי קודם.

קבוצה רפואיית: **ריבroxaban דקסל 10 מ"ג** שייר לקבוצת תרופות הנקראות נגד קריישה ופועל על ידי הקטנת הנטייה לצירוף קריישי דם וזאת על ידי חסימת גורם המעורב בתהליכי הקריישה (פקטור a2).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (ריבroxaban) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה סובל מדימום מוגבר.
- יש לך מחלת או מצב באיבר בגוף שפגיברים את הסיכון לדימום רציני (כגון: כיב קיבה, חבלה או דימום במוח, ניתוח במוח או בעיניים שהתרחש לאחרונה).
- אתה נוטל תרופות למניעת קריישי דם (כגון: אפרפין, דביגטראן, אפיקסבן או הפרין), מלבד במקרים של מעבר מטיפול כנגד קריישה אחד לשני או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשאיו פתוח.
- אתה סובל ממחלת כבד הגורמת לעלייה בסיכון לדימום.
- את בהירין או מניקה.

אל תיטול **ריבroxaban דקסל 10 מ"ג**oso לרופא שלך אם אחד מהמרכיבים המתוארים מעלה חל עלייך.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת **ריבroxaban דקסל 10 מ"ג**.

נדרשת זהירות מיוחדת בשימוש בריברוקסבן דקסל 10 מ"ג. לפני הטיפול בריברוקסבן דקסל 10 מ"ג, ספר

לרופא אם:

- אתה בסיכון גבוה לדרגה בינונית או חמורה, לאחר שתפקידו הכספי עלול להשפיע על כמות התרופה הפעילה בגוף.
 - מחלת כליה בדרגה בינונית או חמורה, לאחר שתפקידו הכספי עלול להשפיע על כמות התרופה הפעילה בגוף.
 - אתה נוטל תרופות אחרות למניעת קריishi דם (כגון: ארפראין, דיביגטראן, אפיקסבאן או הפרין), כאשר אתה עבר מנגד קרישא אחד לשנייה או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר וריד או עורקי כדי להשאיו פתוח (ראה בסעיף 2 "תగובות בין תרופתיות").
 - הפרעות דם.
 - לחץ דם גבוה מאוד, שאינו מואזן באמצעות טיפול רפואי.
 - מחלת בקיבה או בעמי העוללה לגרום לדימום, כגון: דלקת המעי או הקיבה, או דלקת בוושט כתוצאהה, למשל, מחלת החזר וטי-קיבתי (מחלה בה חומצה מהקיבה עולה לוושט) או גידולים הממוקמים בקיבה או בעמיה או באיברי המין או בדרכי השתן.
 - בעיות בכל הדם של רשתית העין (רטינופתיה).
 - מחלת ריאות בה הסمفונות מורחבים ומלאים בהפרשות מוגלאות (ברונכייאקטזיות) או דימום קודם מהריאה.
- יש לך מסתם לב מלאכותי.
 - ידוע לך כי אתה סובל ממחלה בשם תסמונת אנטיפוספוליפידית (הפרעה במערכת החיסון אשר גורמת לסיכון מגבר לקריishi דם), ספר לרופא שלך והוא יחליט האם יש לשנות את הטיפול.
 - הרופא קבע שלחץ הדם שלך אינו יציב או משתוכנן בעבורך טיפול ניתוח או אחר להסרת קריש הדם מהריאות.
- במידה שאתה מחייבים הניצרים לעיל קשרו אלינו, ספר לרופא לפני ניתילת התרופה. הרופא יחליט אם יש לטפל בך בריברוקסבן דקסל 10 מ"ג וגם אתה זקוק למעקב צמוד.
- אם הרופא יחשוף שאתה נמצא בסיכון מגבר לפתח כיב קיבה או מעי, יתכן שייתן לך גם טיפול למניעתו.

אם אתה צריך לעبور ניתוח

- חשוב ביותר ליטול ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג לפני ואחרי הניתוח בדיק בזמנים שקבע לך הרופא.
- אם צנתר או זריקה תור שדרתיים (כגון לאலוחש אפיידורי או שידרתי או לשיכוך כאב) מעורבים בניתוח שלך:
 - חשוב ביותר ליטול ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג בבדיקה בזמן שקבע לך הרופא.
 - פנה מיד לרופא המטפל אם אתה סובל מחוסר תחושה או מחולשה ברגליים או מביעות בעמי או בשלפוחית השтан לאחר התופוגות האלוחש, לאחר שיש צורך בהתערבות רפואית דחופה.

ילדים וمتבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים ולתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. אין מספיק מידע על השימוש בילדים ובתבגרים.

תגובות בין תרופתיות

- אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופחת. במיוחד אם אתה לוקח:
 - תרופות מסוימות נגד זיהומיים פטריטיים (כגון: פלוקונאזול, איטראקונאזול, ווריקונאזול, פוסאקונאזול), פרט לאלו שימוש רק למРИחה על העור.
 - טבליות המכילות קטוקונאזול לטיפול בתסמונת קושינג – מצב בו הגוף מייצר עודף של קורטיזול.
 - תרופות מסוימות לטיפול בזכיהומיים חיזיקיים (כגון: קלאריתרומיצין, ארייתרומיצין).
 - תרופות אנטיו-יראליות מסוימות לטיפול בזכיהום של נגיף האידיוס (VII) (כגון: ריטונאביר).
 - תרופות נגדות קרישא אחרות (כגון: אנטוקסאפרין, קלופידוגREL או אנטוגוניסטים לוויטמין K כמו ארפראין ואצנווקמרול).
 - תרופות נגדות דלקת ומשכחות כאב (כגון: נפרזקסן או חומצה אצטילסילצילית [אספירין]).
 - דרונדרון, תרופה לטיפול בדופק לא סדי.
- תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון (מערכות סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין [SSRIs] או מעכבים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין ונוראפינפרין [SNRIs]).

אם אחד מהמצבים הנזכרים לעיל קשור אליך ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום להגברת פעילות ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג. הרופא שלך יחליט האם לטפל בך עם ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג והאם יש צורך בהשגה רפואית צמודה.

כמו כן, יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה:

- תרופות מסוימות לטיפול בכפין (אפילפסיה) (כגון: פניטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל).
- Wort St. John's Wort - תכשיר צמחי לטיפול בדיכאון.
- ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה).

אם אחד מהמצבים הנזכרים לעיל קשור אליך ספר לרופא לפני נטילת התרופה, כיוון שתרופות אלו עלולות לגרום להגברת פעילות ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג. הרופא שלך יחליט האם לטפל בך עם ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג והאם יש צורך בהשגה רפואית צמודה.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן לטיפול ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג עם או בלי מזון.

הירין, הנקה ופוריות

אל תיטל ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג אם אתה בהירין או מניקה.

אם יש סיכוי שתיכנסו להירין, עליך להשתמש באמצעות מנעה אمن בזמן נטילת ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג.
אם נכנסת להירין במהלך נטילת התרופה, פנו מיד לרופא, אשר יחליט לגבי המשך הטיפול.

ניגזה ושימוש במכונות

ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג עלול לגרום לסתחרות (תופעת לוואי שכיחה) או לעילפון (תופעת לוואי שאינה שכיחה) (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"). אין לנו גורם, לרבות על אופנים, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות בזמן השימוש בריברוקסבן דקסל 10 מ"ג אם אתה מושפע ממתסמים אלו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
ריברוקסבן דקסל 10 מ"ג מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבירות לסתוכרים מסוימים, יש להזכיר ברופא לפני נטילת התרופה זו.
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתן לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח ב涅וגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- למניעת היוצרות קריישי דם בוורידים לאחר החלפת ירך או ברך, המינון המקביל בדרך כלל הוא טבלייה אחת (10 מ"ג) פעם ביום.
- יש ליטול את הטבלייה הראשונה 6-10 שניות לאחר הניתוח במידה והרופא קבע כי מצבך יציב. לאחר מכן יש ליטול טבלייה אחת כל יום עד שהרופא המטפל יורה לך להפסיק.
- למניעת חזרה של קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי) לאחר השלמה של לפחות 6 חודשים טיפול לפקקת ורידים عمוקים או לתסחיף ריאתי קודם, המינון המקביל בדרך כלל הוא טבלייה אחת (10 מ"ג) פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

- בנייתו החלפת מפרק הירך,משך הטיפול בדרך כלל הוא 5 שבועות.
- בנייתו החלפת מפרק הברך,משך הטיפול בדרך כלל הוא שבועיים.
- למניעת חזרה של קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי) לאחר השלמה של לפחות 6 חודשים טיפול לפקקת ורידים عمוקים או לתסחיף ריאתי קודם,משך הטיפול יקבע על ידי הרופא.

צורת הנטילה

מומלץ לבולע את התרופה עם מים.

אם קשה לך לבלוע את הטבלייה בשלמותה, דבר עם הרופא שלך על דרכי אחרות ליטול **ריברוקסן דקסול 10 מ"ג**.

ניתן לרסק את הטבלייה ולערבב עם מים או מחתת תפוחים, מייד לפני נטילתה. במידת הצורך, הרופא שלך יתן לך **ריברוקסן דקסול 10 מ"ג** מרוסק דרך צינור החזנה לקיבה. אסור לחזות את הטבלייה מאחר שאין קו חלוקה. אין מידע לגבי לעיסת הטבלייה.

נטילת התרופה באותו זמן בכל יום, תסייע לך לזכור את נטילתה.

אם נטלת בעutes מינון גבוהה יותר

עליך לפנות מיד לרופא המטפל. נטילת **ריברוקסן דקסול 10 מ"ג** יתר על המידה מגבירה את הסיכון לדימום. אם נטלת מנת יתר או אם בעutes בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיעון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחתי ליטול את התרופה

אם שכחתי ליטול תרופה זו בזמן המועד יש ליטולמנה מיד כשנכרת. את הטבלייה הבאה יש ליטול ביום לאחרת ולהמשיך בטיפול כרגיל. בשום אופן אין ליטולמנה כפולה!

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה לפני השלמת הטיפול ללא התיעצות עם הרופא מכיוון **שריברוקסן דקסול 10 מ"ג** מונע התפתחות של מצב מסוכן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש **בריברוקסן דקסול 10 מ"ג** עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיית תופעות הלואן. "תיכון שלא תסבול מכך אחד מהן".

כמו תרופות דומות אחרות להפחנת היוציארות קריישי דם, **ריברוקסן דקסול 10 מ"ג** יכול לגרום לדימום העולול לסיכון חיים. דימום חזק עשוי לגרום לירידה פתאומית בלחץ הדם (שוק). בחלק מהמטופלים הדימום עלול להיות סמי.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מהתופעות הלואן הבאות:

סימנים לדימום:

- דימום מוחי או תוך גולגולתי (התסמינים יכולים לכלול: כאב ראש, חולשה מצד אחד, הקאה, פרכוס, ירידת ברמת ההכרה ונוקשות בצוואר). זהו מצב חירום רפואי חמור, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי!
 - דימום ממושך או מוגבר.
 - חולשה יוצאת דופן, עייפות, חיוורון, סחרחות, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטורייס).
- הרופא שלך יחליט האם נדרש השגחה צמודה או דרוש שינוי בטיפול.

סימנים לתגובה עורית חמורה:

- פריחה אינטנסיבית מתפשטת על הגוף, שלפוחיות או פצעים ברקמה רירית, למשל בפה או בעיניים (Stevens-Johnson syndrome/Epidermal Necrolysis).
- תגובה לתרופה הגורמת לפריחה, חום, דלקת של איברים פנימיים, חריגות במערכת הדם וחולי מערכתי (DRESS).

התדרות של תופעות לוואי אלו היא נדירה מאוד (תופעות שטויות מושתמש אחד מtower 10,000.).

סימנים לתגובה אלרגית חמורה:

- התנפחות הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון; קשיי בליעה; סרףת וקשיי נשימה; צניחה פרטומית של לחץ הדם.

התדרות של תגובות אלרגיות חמורות הן נדירות מאוד (תגובה אנטיפילקטית, כולל שוק אנטיפילקטית; תופעות שטויות מושתמשים בפחות מtower 10,000) ואינן שכיחות (אנגיואדמיה ובצקת אלרגית; תופעות שטויות מושתמשים מtower 1,000).

תופעות לוואי נוספת נספנות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שטויות מושתמשים מtower 1-10):

- ירידה בתאי דם אדומיים העוללה לגרום לחיוורון, לחולשה או לקוצר נשימה
- דימום בKİבה או בעור, דימום באיברי המין ובדרכי השתן (כולל דם בשתן ודימום וסתמי מוגבר), דימום מהאף, דימום בחניים
- דימום לתוך העין (כולל דימום מלובן העין)
- דימום לתוך רקמה או חלל בגוף (שיטף דם פנימי מקומי, חבלת)
- שיעול דמי
- דימום מהעור או מתחת לעור
- דימום לאחר ניתוח
- דליפה של דם או נזול מפצע ניתוחי
- נפיחות בגפיים
- כאב בגפיים
- תפקוד לקיי של הכליות (יכול להתגלוות בבדיקות המבוצעות על ידי הרופא)
- חום
- כאב בטן, קשיי עיכול, בחילה או הקאה, עצירות, שלשול
- לחץ דם נמוך (תסמינים לכך יכולות להיות סחרחות או עילפון כאשר אתה נעמד)
- ירידה כללית בכוכ ובערגה (חולשה, עייפות), כאב ראש, סחרחות
- פריחה, גרד בעור
- בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה באנזימי כבד מסוימים

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שטויות מושתמשים מtower 1,000):

- דימום תוך מוח או תוך גולגולתי (ראיה לעלה, סימנים לדימום)
- דימום לתוך מפרק הגוף לכאב ונפיחות
- טרומבווציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם, שהן תאים שטטיים לקרישת הדם)
- תגובות אלרגיות, כולל תגובות אלרגיות בעור
- תפקוד לקיי של הכבד (יכול להתגלוות בבדיקות המבוצעות על ידי הרופא)
- בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה בבלירובין, באנזימי מסוימים של הלבלב או הכבד או במספר הטסיות עילפון
- תחושה כללית לא טוביה
- דופק מואץ
- יובש בפה
- חרלה (אורטיקרייה)

תופעות לוואי נדירות (תופעות שטויות מושתמשים מtower 1-10):

- דימום לתוך שריר
- כולוסטזיס (זרימה מופחתת של מריה), דלקת הכבד (הפטיטיס) כולל פגיעה בתאי הכבד (כבד דלקתי)
- הכול פגיעה כבדית)
- הצהבהה של העור והעיניים (צהבת)
- נפיחות מקומית
- שיטף דם פנימי מקומי (המטומה) במפשעה כתוצאה מסיבוך של הליך לבבי בו מוכנס צנתר לעורק ברגל

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמייניות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- הצטברות של אוזינופילים, סוג של תא דם גראנולוציטים לבנים הגורמים לדלקת בריאות (דלקת ריאות אוזינופילית)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- כשל קליתי לאחר דימום חמור
- דימום בacellular, לעיתים מלווה בנוכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לעבוד כראוי (נוירופתיה הקשורה לנוגדי קרישא)
- לחץ מוגבר בשדרי הרגליים או הזרועות לאחר דימום, הגורם לכאב, לנפיחות, לשינוי תחושה, לחוסר תחושה או לשיתוק (תסמונת מדור לאחר דימום)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
 - אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.
 - טבליות מרוסקות: טבליות מרוסקות יציבות במים או במחית תפוחים עד 4 שעות.
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, macrogol 3350, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות מצופות עגולות, צבע אדום בהיר, קמורות משני הצדדים עם סימן "י" בצדן אחד.
גודל אריזה מאושר: 30 טבליות.

שם היצרן וכתובתו: מדיכם, ס.א., ברצלונה, ספרד.

נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 172-93-36479-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

בעל רישום: דקוטל® בע"מ רח' דקוטל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל