

## פרטי המטופל



שם המטופל:

תאריך לידה:  
(שנה/חודש/יום)

מספר טלפון:

איש קשר למקרה חירום  
(שם):

איש קשר למקרה חירום  
(מספר טלפון):

## מידע על הטיפול

אנא השלם סעיף זה או בקש מהרופא שלך לעשות זאת.



המינון המומלץ של איזטוקסימאב  
10 מ"ג/ק"ג לפי לוח הזמנים הבא:

מחזור 1: ימים 1, 8, 15, 22  
(פעם בשבוע)

מחזור 2 ואילך: ימים 1, 15  
(אחת לשבועיים)

תאריך סיום  
(שנה/חודש/יום)

תאריך התחלה  
(שנה/חודש/יום)

## תוצאות בדיקות דם



בטרם התחלת הטיפול באיזטוקסימאב,  
תוצאות בדיקות הדם שלי מתאריך:

הן:

סוג דם:  A  B  AB  O  Rh+  Rh-

תוצאת בדיקת אנטיגלובולין עקיף (indirect Coombs test) היא:

שלילית  חיובית לנוגדנים הבאים:


## פרטי הרופא המטפל

במקרה חירום או אם תמצאו כרטיס זה,  
אנא צרו קשר עם הרופא שלי על פי הפרטים הבאים:



שם הרופא:

מספר טלפון של הרופא:



## כרטיס למטופל

### — לכבוד מטופל בסרקליסה (איזטוקסימאב) —

- יש להציג כרטיס זה בפני אנשי צוות רפואי **לפני** עירוי דם.
- עליך לשאת כרטיס זה איתך בכל עת ועד **6 חודשים** אחרי המנה האחרונה של איזטוקסימאב.
- על מנת לזהות מידע בטיחות חדש, ביכולתך לסייע בכך על ידי דיווח תופעות לוואי שיייתכן שתחוה. אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא:  
<https://sideeffects.health.gov.il>
- כמו כן ניתן לדווח ישירות לחברת סאנופי בטלפון **09-8633081**
- לקבלת מידע נוסף על איזטוקסימאב, אנא עיין **בעלון לצרכן**.

### — אזהרה לאנשי צוות רפואי —

- אנא שים לב כי מטופל זה מקבל טיפול **בסרקליסה (איזטוקסימאב)**.
- כרטיס למטופל זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך להיות מודע לו לפני, במהלך ואחרי הטיפול באיזטוקסימאב.
- טיפול באיזטוקסימאב נקשר ל-CD38 על תאי הדם האדומים. הטיפול קשור **לסיכון להפרעה לבדיקת סוג דם (positive Indirect Coombs Test)** אשר עשוי להימשך כ-6 חודשים לאחר עירוי איזטוקסימאב האחרון.
- על מנת למנוע בעיות אפשריות בעירוי תאי דם אדומים עליך לבצע בדיקות לסוג דם ובדיקות סקר לפני העירוי הראשון עם איזטוקסימאב. **יש לשקול לבצע בדיקת פנוטיפ בהתאם למה שמקובל מקומית.**
- אם הטיפול באיזטוקסימאב כבר החל **ובמקרה של עירוי מתוכנן, עליך להודיע לבנק הדם שהמטופל מקבל איזטוקסימאב ושקיים סיכון לשיבוש בבדיקות האנטיגלובולין העקיף.**
- לקבלת מידע נוסף אודות איזטוקסימאב, אנא עיין **בעלון לרופא**.