

Лекарства, получаемые параллельно

Название препарата	Дозировка

Случаи, требующие немедленного обращения к врачу:

кровотечение, потенциально опасное для жизни; аллергическая реакция, проявлением которой могут быть сыпь, отечность, отек лица, губ, ротовой полости, языка и/или горла, затрудненное дыхание (редко).

Побочные эффекты

При приеме антикоагулянта могут возникнуть побочные явления. Нужно знать о них и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Полный перечень побочных эффектов приведен в инструкции по применению препарата. Наиболее распространенный побочный эффект - кровотечение.

Кровотечение может проявляться в разных формах, в том числе следующим образом:

- Кровотечение из ЖКТ, которое может выражаться в присутствии крови в кале (черный / темный кал), боли (например, боли в животе), вздутие
- Кровь в моче (моча красного или розового цвета); кровь в моче, обнаруженная при анализе мочи
- Кровотечение из глаз, носа или десен
- Кровохаркание и рвота с кровью (кровь в рвотных массах, либо рвотные массы, напоминающие кофейные гранулы)
- Выделение крови или жидкости из порезов и других повреждений кожи; длительное кровотечение из порезов
- Необычное по объему кровотечение, либо кровотечение, не проходящее само по себе
- Головная боль, головокружение, анемия, проявляющаяся в слабости и бледности, тошнота

Факторами риска применительно к повышенной кровоточивости могут быть:

заболевание печени, приводящее к нарушению свертываемости крови и, соответственно, повышенному риску кровотечений;

травма или заболевание, сопряженное с повышенным риском кровотечений, например: активная, либо недавно прошедшая язва

желудка или кишечника; злокачественная опухоль с повышенным риском кровотечения; недавно случившаяся травма головного мозга или позвоночника; недавно случившееся внутричерепное кровоизлияние; варикозное расширение вен пищевода или подозрение на данную патологию; артериовенозная мальформация; аневризма сосудов или выраженное повреждение сосудов головного мозга или позвоночника; перенесенная операция на головном мозге, операция на позвоночнике или на глазах;

прием других антикоагулянтов, за исключением следующих случаев: замена терапии, т. е. переход с какого-либо препарата на препарат **Апиксабан Тева**, либо с препарата Апиксабан Тева на другой препарат; у вас установлен внутривенный или артериальный катетер, и подача гепарина через него необходима для поддержания его проходимости.

Если вам предстоит операция или иная медицинская процедура, могущая вызвать кровотечение, включая стоматологические процедуры, следует проконсультироваться с врачом. Возможно, в этой связи вас попросят на короткое время прервать лечение данным препаратом.

Если вы точно не знаете, может ли какая-либо медицинская процедура вызвать кровотечение, проконсультируйтесь с врачом.

Извещение о побочных эффектах

О побочных явлениях можно сообщить в Минздрав через специальный портал, размещенный на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения по адресу:

www.health.gov.il

либо по следующей ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

Можно сообщить также владельцу регистрационного удостоверения, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., по электронной почте

safety.israel@teva.co.il

Дополнительная информация

Teva Israel, п. я. 3190, ул. Двора а-Невиа, 124, Тель-Авив, Израиль.
Телефон: 1-800-805-005

Информационная
карточка по
безопасности
пациента
Апиксабан Тева
APIXAVAN 2.5 mg, 5 mg

Обладатель данной карточки получает терапию препаратом Аликсабан Тева

Имя, фамилия пациента:

Дата рождения:

Адрес:

Терапия (дозировка, график приема, с пищей или без):

Показания / цель терапии:

Дата начала курса лечения:

Лечащий врач - имя, фамилия, телефон:

Данные родственника пациента для обращения в экстренных случаях (имя, фамилия, степень родства, № телефона):

Группа крови (с подписью врача):

Вес:

Клиренс креатинина на момент начала курса лечения:

Всегда держите под рукой эту карточку с информацией по обеспечению безопасности.

Удостоверьтесь, что вы используете последнюю версию данной карточки.

Данная карточка утверждена в соответствии с указаниями Минздрава в феврале 2023 г.

Для получения дополнительной информации следует ознакомиться с информационным листком-вкладышем.

Подбор дозы при сниженной функции почек

Аликсабан Тева не рекомендуется пациентам, страдающим почечной недостаточностью (с клиренсом креатинина ниже 15 мл/мин) или проходящим диализ.

Для пациентов с фибрилляцией предсердий (НФП) следует адаптировать дозу в следующих случаях:

1. клиренс креатинина 15–29 мл/мин
2. в случаях соответствия **как минимум двум критериям из трёх:**

А. Возраст 80 лет и старше

Б. Вес 60 кг или меньше.

В. Концентрация креатинина в сыворотке крови 1,5 мг/дл или выше.

Обратитесь к лечащему врачу, если не уверены, соответствуете ли вы этим критериям.

Цель терапии



2,5/5 мг

Для профилактики инсульта и системных эмболий у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий (НФП)



2,5/5 мг

Для лечения тромбоза нижних вен (тромбоза глубоких вен – ТГВ) и легочных сосудов (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА)



2,5 мг

Для профилактики рецидива тромбоза нижних вен (тромбоза глубоких вен – ТГВ) и легочных сосудов (тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА)



2,5 мг

Для профилактики тромбоза вен:
- после elective операции по протезированию тазобедренного сустава;



- после elective операции по протезированию коленного сустава.

Полный перечень показаний, утвержденных Министерством здравоохранения, приведен в информационном листке-вкладыше.

Дозировка и режим приема препарата

Дозировка и режим лечения назначаются исключительно врачом. Лекарство следует принимать два раза в день. Старайтесь принимать лекарство в постоянные часы каждый день, т. к. это способствует наилучшему терапевтическому действию.

Способ приема лекарства

- Препарат следует проглотить, запивая водой. Лекарство можно принимать с пищей или без нее.
- Если вам трудно проглотить таблетку целиком, обсудите с врачом другие способы приема препарата **Аликсабан Тева**.
- Таблетку можно измельчить и смешать с жидкостью: водой; декстрозой 5%, разведенной в воде; яблочным соком или яблочным пюре. Смешивать следует непосредственно перед приемом лекарства. Инструкции по измельчению таблетки приведены в информационном листке-вкладыше, прилагаемом к упаковке препарата.
- При необходимости врач может дать вам **Аликсабан Тева** через эпигастральный зонд.
- Не превышать рекомендуемую дозу.

В случае передозировки или случайного приема препарата ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы; покажите упаковку препарата. Передозировка может вызвать кровотечение. В случае кровотечения вам может понадобиться переливание крови или операция. Если вы забыли вовремя принять препарат, следует принять дозу немедленно, как только вспомнили; следующую дозу следует принять

в обычное время. Затем продолжать прием в соответствии с рекомендованным вам режимом и в назначенной дозировке. Если вы не уверены в том, как поступить, или если вы пропустили более одного приема, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или медсестрой.

Рекомендации по наблюдению при каждом визите к врачу

- Постоянное и точное выполнение всех указаний по лечению
- Наблюдение за всеми случаями кровотечений и других побочных явлений.

Рекомендуется сдавать анализы крови по указанию врача.

Даже если наступило улучшение состояния, не прекращайте прием лекарства без консультации с врачом или фармацевтом. **Если вы прекращаете прием данного лекарства**, у вас могут образоваться тромбы.

Если вы принимаете, либо недавно принимали другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу, фармацевту или медсестре.

Непреренно сообщите врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете: Рифампицин (антибиотик), Фенитоин, Фенобарбитал или Карбамазепин (противоэпилептические), hupericum (зверобой); данные препараты снижают концентрацию Аликсабан Тева в крови, и тем самым могут снизить его эффективность.