

**עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986**  
התרכזה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**אייברנס<sup>MD</sup> טבליות 75 מ"ג  
אייברנס<sup>MD</sup> טבליות 100 מ"ג  
אייברנס<sup>MD</sup> טבליות 125 מ"ג  
טבליות מצופות**

כל טבליה מכילה:  
palbociclib 75 mg, 100 mg or 125 mg פלבוציקליב 75 מ"ג, 100 מ"ג או 125 מ"ג

רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראי סעיף 6 "מידע נוספים".

קראי בעיון את העlon עד סוףו בטרם תשמש בתרכזה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרכזה. אם יש לך שאלות נוספות, פנו אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעבiri אותה לאחרים. היא עלולה להזיך להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופה זו מיועדת לנשים ולגברים מעל גיל 18.

**1. למה מיועדת התרכזה?**

- אייברנס מיועדת לטיפול בסרטן שקדם גורתי, המבטא קולטים לאסטログן ושלילי ל-HER2, בשילוב עמו:
- מעכבר ארוםטאז בטיפול משולב ראשוני (המבוסס על טיפול הורמוני) בנשים שלאחר גיל המעבר או בגברים.
  - פולווסטראנט (fulvestrant) במתופלים שמלחמת התקדמה לאחר טיפול הורמוני קודם.

קבוצה רפואיית: אני נאופלסטי, מעכבר קינאצ.

**2. לפני השימוש בתרכזה אמ:**

- אין להשתמש בתרכזה אם:
- את רגשה (אלרגיה) למרכיב הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרכזה, המפורטים בסעיף 6 "מידע נוספים" בעлон זה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרכזה:

לפני הטיפול באיברנס, ספרי לרופא אם:

- את חשה בחום, צמרמות או בכל תסמין אחר של זיהום.
- את סובלות מליקוי בתפקוד הכבד או הכלויות.
- את בהירין או מתכנתה להיכנס להירין. למידע נוסף יש לעין בסעיף 2 תחת "הירין, הנקה ופוריות".
- את מניקה או מתעדת להניק. למידע נוסף יש לעין בסעיף 2 תחת "הירין, הנקה ופוריות".

ספר לרופא אם אתה נוטל אייברנס ויש לך בת זוג שיכולה להיכנס להירין. למידע נוסף יש לעין בסעיף 2 תחת "הירין, הנקה ופוריות".

**ילדים ותבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותבגרים מתחת לגיל 18 שנים. בטיחות ויעילות התרכזה לא נבדקו ילדים ותבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

**בדיקות ומעקב**

הרופא יdag לביצוע בדיקות דם לפני השימוש בתרכזה ובמהלך השימוש בתרכזה.

**אינטראקטיות בין תרופתיות**  
אם את לוקחת, או אם לך תרופה אחרת כולה תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם את לוקחת:

- תרופות העולות להעלות באופן משמעותי את רמת אייברנס בدم: קלריטרומיצין, טליתרומיצין (אנטיבוטיקה); איטראקונازול, קווקונאצול, פוסאקוונאצול, ווריקוונאצול (טיפול בזיהום פטריטי) ריטונאביר; לופינאביר/ריטונאביר, אינדיינאביר, נלפינאביר, סאקוינויאביר (טיפול בנגיף האידס); טלפריבר (טיפול בדלקת הכבד); נפאזוזון (טיפול בדיכאון). יש להימנע שימוש בתכשירים אלו במהלך הטיפול באיברנס.

- תרופות העולות להוריד באופן משמעותי את רמת אייברנס בدم: ריאמפיקין (לטיפול בשחפת); פניטואין, קארבאמאזפין (לטיפול באפילפסיה), היפריקום Wort St. John's Wort (לטיפול בדיכאון), אנדולומיד (לסרטן הערמוני), מודפיניל (לטיפול בהפרעות שינה); יש להימנע משימוש בתכשירים אלו במהלך הטיפול באיברנס.
- הימנע מאכילת אשכולות, מזוכרים המכילים אשכולית ומשתית מיצ' אשכולות במהלך תקופת הטיפול עם אייברנס. השימוש עלול להעלות את ריכוז התרופה בדם.
- תרופות אשר אייברנס עלול להעלות את ריכוזם בדם: מיזולם (לטיפול באפילפסיה), ציקלאופורין, סירולימוס, טקרולימוס (לדיבי מרכיב החיסון), נגזרות של ארוגט (כגון ארוגטמיין, דיבידרארגטמיין), אוורולימוס (לטיפול בסרטן ולדיבי מערכת החיסון), פנטניל, אלפנטניל (לשיכון כאבים חזקים/אלחוש), פימוזיד (נוירופטי), כינידין (להסדרת הפרעות בקצב הלב).

**שימוש בתרופה ומזהן**  
יש ליטול את התרופה עם או ללא אוכל.

יש להימנע משתית מיצ' אשכולות או אכילת אשכולות במהלך הטיפול באיברנס.

#### הירין, הנקה ופוריות

- לפני תחילת הטיפול באיברנס יש לידע את הרופא אם את בהירין או מתכנת להיכנס להירין. תרופה זו עלולה להזיק לעובר שלך.
- נשים אשר יכולות להיכנס להירין ונוטלות תרופה זו לצורך להשתמש באמצעות מנעהיעלים במהלך הטיפול ובמשך שלושה שבועות לפחות לאחר סיום הטיפול באיברנס. יתכן שהרופא שלך יבקש שתעתשי בדיקת הירין לפני התחלת הטיפול עם אייברנס.
- גברים אשר נוטלים אייברנס ולהם בנות זוג אשר יכולות להיכנס להירין צריכים להשתמש באמצעות מנעהיעלים במהלך הטיפול עם אייברנס ובמשך שלושה חודשים לפחות לאחר סיום הטיפול באיברנס.
- התיעץ עם הרופא לגבי אמצעי מנעה היוצרים להטאים עבורך במהלך תקופה זו.
- אם נכנסת להירין או שקיים חשד להירין, יש לידע את הרופא או מתעדת להניך. לא ידוע האם תרופה זו לפני תחילת הטיפול באיברנס יש לידע את הרופא אם את מניה או מתעדת להניך. אין להניך גם מופרשת בחלב אם. עלייך לדון עם הרופא האם ליטול את התרופה או להניך. אין לשלב בין השניים. אין להניך גם במשך 3 שבועות לאחר הפסקת הטיפול באיברנס.

אייברנס יכולה לגרום לביעות פוריות לגברים. זה יכול להשפיע על יכולתך להביא ילדים. פנה לרופא לקבלת ייעוץ לפני תחילת הטיפול עם אייברנס אם יש לך חששות בנושא פוריות.

#### נהיגה ושימוש במכונאות

עיפוית היא תופעת לוואי שכיחה מאוד. אם את מרגישה עייפה באופן חריג, יש להיזהר במיוחד בעת הנהיגה או שימוש במכונאות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בעוון למינון ואופן נטיילת התכשיר.
- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. מינון אייברנס המקביל בדרך כלל הוא:
  - טבליה של 125 מ"ג פעם ביום, עם הארוחה, במשך 21 ימים רצופים ולאחר מכן הפסקה בת 7 ימים בnellyת התרופה, להשלמת מחזור של 28 ימים.
  - כאשר אייברנס ניתנת בשילוב עם מעכב אرومטАЗ, יש לקחת את המינון המקביל של מעכב הארוםטАЗ. יש לעיין בעלון לצריך של מעכב הארוםטАЗ.
  - כאשר אייברנס ניתנת בשילוב עם פולווסטראנט, המינון המקביל של פולווסטראנט הוא 500 מ"ג ביום, 15 ו-29 פעם בחודש לאחר מכן. יש לעיין בעלון לצריך של פולווסטראנט.
- אין לעבור על המנה המומלצת.
- חשוב ליטול את התרופה בערך באותו הזמן בכל יום.
- זכרת הנטיילה: יש לבלוות את הטבילה בשלהמתה. אין ללעום, לחצוץ או לכטוש את הטבליות.
- אין לשנות את המינון או להפסיק את הטיפול בתרופה ללא הוראה מהרופא.

#### אם נטלת בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מין התרופה, פני מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והביא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, או אם הקאת לאחר נטילת המנה, אין ליטול מנה נוספת באותו יום. קחי את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועצי ברופא.

יש להתميد טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדק התוויות והמנה **בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיברנס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבחלי למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבלי מ一封 אחת מהן.

**יש לפנות מיד לרופא במקרה של:**

- **ירידה בספירת תאי הדם הלבנים במחזר הדם (נויטרופניה):** ירידה בספירת תאי הדם הלבנים בדם היא מצב מאד שכיח בשימוש בתרופה זו. מצב זה יכול להוביל לדיזומים חמורים, העולמים להוביל למות. הרופא שלך יבצע ניטור של ספירות תאי הדם הלבנים שלך לפני ובמהלך הטיפול בתרופה זו.  
אם את מפתחת במהלך הטיפול עם איברנס ירידה בספירת תאי הדם הלבנים, יתכן שהרופא שלך יורה לך להפסיק את הטיפול, להפחית את המינון או להמתין טרם התחלת מחזר הטיפול הבא.  
פני לרופא מיד אם אתה חש בתסמינים של זהותם כגון חום או צמרמותות.
- **ירידה בספירת כדריות הדם האדומות וירידה בספירת הטסיות במחזר הדם:** ירידה בספירת כדריות הדם האדומות ובසפירת הטסיות במחזר הדם היא מצב שכיח בשימוש בתרופה זו.פני לרופא מיד אם את מפתחת את אחד מהتسمינים הבאים במהלך הטיפול: סחרחות, קוצר נשימה, חולשה, נתיחה מוגברת לדימום או שטף דם, דימום מהאף.
- **בעיות בריאה (פנאומוניטיס):** איברנס עלולה לגרום לדלקת חמורה או מסכנת חיים של הריאות במהלך הטיפול שעוללה להוביל למות.פני לרופא שלך מיד אם יש לך תסמינים חדשים או החמרה כוללי קשי נשימה או קוצר נשימה, שישול עם או ללא ליהה, כאב בחזה. יתכן שהרופא יפסיק באופן זמני או לחולטן את הטיפול עם איברנס אם התסמינים חמורים.

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (≥ 10%) של איברנס במתן יחד עם לטrozול או פולווסטראנט:**  
נויטרופניה, תרומבויציטופניה (ירידה ברמת טסיות), אנמיה, יובש בעור, הפרעה בחוש הטעם, עייפות, דיזומים, בחילה, פריחה, דלקת וכאבים בפה, שיער דק יותר או נשירת שיער, שלשול, ירידה/חוסר בתיאבון, הקאות, חולשה, לויוקופניה (ירידה ברמת תא דם לבנים), חום.

**תופעות לוואי נוספות של איברנס במתן יחד עם לטrozול או פולווסטראנט:** טשטוש ראייה, יובש בעין, דמיעה מוגברת, דימום מהאף, חום נויטרופני, חריגות בבדיקות דם של אণמי הכבד.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חמירה, או כאשר את סובלות מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמניע הרעללה. אל תגרמי להקה ללא הראה למפרשת המרופה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אחסני בטמפרטורה מתחת ל-30°C. יש לאחסן באזירה המקורית על מנת להגן מלחות.
- אין להשתמש בתרופה אם את מבחינה בטבליות שהין שבורות/סדקונות/נרתות פגומות.

#### 6. מידע נוסף

**נוסך על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Microcrystalline cellulose, succinic acid, crospovidone, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), triacetin, indigo carmine aluminum lake (E132), iron oxide red (E172) (75 mg and 125 mg tablets only), iron oxide yellow (E172) (100 mg tablets only).

**כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארזה:**

איברנס טבליות 125 מ"ג: טבליה אוביילט, מצבע סגול בהיר, עם המילה "Pfizer" מוטבעת בצד אחד, ו- "PBC 125" בצד השני.  
איברנס טבליות 100 מ"ג: טבליה אוביילט, מצבע ירוק, עם המילה "Pfizer" מוטבעת בצד אחד, ו- "PBC 100" בצד השני.

אייברנס טבליות 75 מ"ג: טבליה עגולה, בצבע סגול בהיר, עם המילה "Pfizer" מוטבעת בצד אחד, ו- "PBC 75" בצד השני.

כל אריזת קרטון מכילה 21 או 63 טבליות.  
יתכן ולא כל גגלי הארץ מושאקים.

**בעל הרישום וכתובתו:** פייזר פרמצבטייה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיתוח 46725.

**מספר רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות הם:**

אייברנס טבליות 75 מ"ג: 173-61-36955-99

אייברנס טבליות 100 מ"ג: 173-62-36956-99

אייברנס טבליות 125 מ"ג: 173-63-36957-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון נקבה. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עלון זה אושר ב-09/2023.