

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلانية (مستحضرات) 1986** يسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبية فقط

## لوسك 20 ملغ Rx كبسولات

**التريكية**
تحتوي كل كبسولة على: أومپرازول 20ملغ (Omeprazole) للحصوى على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسيبات الأجيحة انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية!"

**اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك**
للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.
**هذا الدواء مخصص للأولاد الذين عمرهم فوق السنة، ووزنهم 10 كيلو غرامات فما فوق.**

- 1. أقرأ عرض مخصص هذا الدواء؟**
يُنظِّمُ الدواء إفراز الحمض في الجهاز الهضمي. الدواء مخصص لـ:
علاج قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر.
علاج *Helicobacter pylori* المرتبط بقرحة هضمية، بالجمع مع مضاد حيوي.
علاج التهاب المريء الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي (ريفلوكس).
العلاج الطويل الأمد لالتهاب المريء الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي (reflux oesophagitis) والعلاج متلازمة زولينجر إليسون (Zollinger Ellison Syndrome)، العلاج المدموم لمنع التوراث المتكرر لدى المرضى الذين تكون لديهم استجابة القرحة الهضمية ضئيلة، أو لالتهاب المريء الخطير الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي.
علاج التهاب المريء الخطير الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي لدى الأطفال من عمر سنة فما فوق.
علاج ومنع قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر الناتجة عن العلاج بـ NSAIDs (غير مناسبة لالتهاب لامتبرويدية) لدى المرضى المعرضين لخطورة عالية.

**الفصلية العلاجية:**

مثبطات مضخة البروتون (Proton Pump Inhibitor (PPI)).

### 2. قبل استعمال الدواء

**لا يجوز استعمال المستحضر إذا:**
كانت لديك حساسية (أرجحية) للمادة الفعالة أومپرازول، أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 – "معلومات إضافية").

كانت لديك حساسية (أرجحية) لأدوية تحتوي على مثبطات أخرى لمضخة البروتون (PPI) (مثل: بانتوبيزول، لانسوبرازول، رابيبرازول، إسوميبرازول).

كنت تستعمل دواء يحتوي على تيلفانيفر (دواء لعلاج ثلوثات HIV).
كنت تعاني من صعوبة أو ألم عند بلع الطعام، من تقيؤات دموية أو من براز دموي أو أسود.
وُجِدَ لديك حرقة مصحوبة بالثبوش، والتعرق أو الدوار.
وُجِدَ لديك ألم في الصدر أو في الكتفين، مصحوب بضيق التنفس، بالتعرق، بالألم الأذخ في الانتشار إلى الذراعين، الرقبة أو الكتفين، أو بالدوار.
وُجِدَ لديك ألم في الصدر في أحيان متقاربة.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**
- تم التبليغ عن ردود فعل جلدية خطيرة، تشمل: متلازمة ستيفينس-جونسون، وتقرح الأوسجة النموثة البثرية التسممي، متلازمة تفاعل الدواء المنحوب بكثرة البثورينات والأعراض الجلدية الحزازية (DRESS) والتهار الطفحي المعمم الحاد (AGEP). يجب إيقاف استعمال لوسك والتوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري إذا لاحظت وجود أعراض ترتبط بزدود الفعل الجلدية الخطيرة هذه، الوارد عنها في البند 4.

**قد يخفي لوسك أعراض أمراض أخرى، لذلك، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية قبل البدء بالعلاج بـلوسك أو أثناء العلاج بـلوسك:**
- كنت تعاني من انخفاض كبير في وزنك من غير سبب، وكانت لديك مشاكل في البلع.
- كنت تعاني من ألم البطن أو من صعوبات في الهضم.
- كنت تعاني الطعام أو كان لديك تقيؤ دموي.
- كنت تعاني من إسهال خفيف أو متواصل، لأن استعمال لوسك قد يزيد بعض الشيء من خطر نشوء إسهال نتيجة للتلوث.
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في وظيفة الكبد.

تطور لديك ذات مرة رد فعل جلدي بعد استعمال دواء شبيه بـلوسك قبل إفراز الحمض في المعدة.
- كنت على وشك الخضوع لفحص دم معين (كروموجرائين A).
- كنت تعاني من حرقة لفترة تزيد عن 3 أشهر، فقد يشير هذا الشيء إلى مشكلة أكثر خطورة.
- كنت تعاني من آغيان أو تقيؤات.
- إذا كنت تستعمل لوسك لمدة طويلة (طوال أكثر من سنة)، فقد يمارك الطبيب بالخضوع لمتابعة طبية دامتة. يجب إبلاغ الطبيب عن أي عرض جديد وشذ في كل مرة ترى فيها طبيبك.

- استعمال دواء من فصيلة مثبطات مضخة البروتون، مثل لوسك، خاصة طوال أكثر من سنة، قد يزيد بعض الشيء من خطر حدوث كسر في العروق، المعصم (الرسغ) أو العمود الفقري. يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت تعاني من تخلخل العظام أو إذا كنت تستعمل الكورتيكوستيرويدات (التي قد تزيد من خطر نشوء تخلخل العظام).
- إذا تطور لديك طفح جلدي، خاصة في المناطق المصابة للشمس، فيجب إبلاغ الطبيب بأسرع وقت ممكن، لأنك قد تضطر إلى إيقاف استعمال لوسك يجب إعدام الطبيب أيضاً إذا كنت تعاني من أعراض مرضية أخرى مثل آلام المفاصل.

- يجب استشارة الطبيب بخصوص فحص منتظم لمستوى المغنيزيوم في الدم خلال فترة العلاج بهذا الدواء.
- استعمال لوسك قد يسبب التهاب الكلىتين. يمكن أن تشمل الأعراض على انخفاض في كمية البول أو على دم في البول و/أو على رد فعل الحساسية المفرطة مثل الحمى، الطفح الجلدي وتصبُّب المفاصل. يجب إبلاغ الطبيب المعالج عن هذه العلامات.
- قد يؤثر لوسك على امتصاص فيتامين B12 خاصة إذا لم تستعمل لوسك لفترة مطولة. يجب مراجعة الطبيب إذا لاحظت وجود الأعراض التالية التي تدل على مستوى منخفض لفيتامين B12:
  - شعور شديد أو انعدام الطاقة
  - إحساس بالوخز والتتميل
  - ألم أو احمرار في اللسان، تقرّحات في الفم
  - ضعف العضلات
  - اضطرابات في الرؤية
  - مشاكل في الذاكرة، ارتباك، اكتئاب
- **التفاعلات بين الأدوية**
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بوصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:
نيفينايفر (دواء لعلاج ثلوثات HIV) – لا يجوز استعمال لوسك إذا كنت تستعمل دواء يحتوي على نيفينايفر.
كيتوكونازول، إيتراكونازول، بوساكونازول أو فريكونازول (علاج الثلوثات الفطرية).
ديجوكسين (علاج مشاكل القلب).
ديازيبام (علاج القلق، لإرخاء العضلات أو المصراع).
فيفينوتين (علاج المصراع).
إذا كنت تستعمل فينتونين، فسومو لوسك بمتابعة طبية عندها تبدأ بالعلاج بـلوسك أو عندما توقفه.
أدوية لتسيع المث مثل وارفارين أو حاجيات أخرى لفيتامين K.
قد يقوم الطبيب بمتابعة طبية عندها تبدأ بالعلاج بـلوسك أو عندما توقفه.

ريفامبين (علاج اللسل).
أتازانيفر، ساكوينافير (دواءان لعلاج ثلوث HIV).
تاكروليموس أو ميكوفينولات (في حالات زراعة الأعضاء).
نبتة St. John’s Wort (العرن المقوَّب) لعلاج الاكتئاب.
سيلستازول (علاج العرج المنقطع).
كلوبيجرويل (مضاد للتشنج).
إرلوتينيب (لعلاج السرطان).

ميثونريكتام (دواء للعلاج الكيميائي ويستعمل بجرعات دوائية عالية لعلاج السرطان) – إذا كنت تستعمل جرعات دوائية عالية من ميثونريكتام، فسيدرس الطبيب إيقاف العلاج بـلوسك بشكل مؤقت.
أموكسيسيلين وكلافنتريموسين (مضادان حيويان) – إذا وصل لك الطبيب حين المضادين الحيويين سوياً مع الدواء لوسك لعلاج القرحتات الناتجة عن ثلوث هليكوباكتر بيلوري، فمن المهم جداً أن تبلغ طبيبك عن أي دواء آخر تستعمله.

**الحمل، الإرضاع والحسوية**
يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، متحملاً، أو تتخطين للحمل أو متعتين.

يُفَرِّزُ أومپرازول (المركب الفعّال في الدواء) في حليب الثدي، لكن لا يُتَوَقَّعُ أن يؤثر على الطفل الرضيع عندما يتم استعمال الجرعة الدوائية الموصى بها.
يسفرور الطبيب ما إذا كنت تستطعين استعمال لوسك عند الإرضاع.

**الاستعمال لدى الأولاد**
قد يتطلب هذا الدواء علاجاً طويل الأمد لدى الأولاد معينين، الذين هم مرضى بشكل مزمن، على الرغم من أنه لا يوصى بذلك. هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد الذين عمرهم أقل من سنة أو ورنهم أقل من 10 كيلو غرامات.
**السابقة واستعمال الماكنتات**
لا ينبغي أن يؤثر لوسك على الفترة على السابقة، استعمال الأجهزة أو تشغيل الماكنتات.
تحدث أعراض جانبية مثل الدوار والاضطرابات في الرؤية (انظر البند 4). إذا أحسست بهذه الأعراض فلا يجوز السيقاة أو تشغيل الماكنتات.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**
يجب إعلام لوسك على سكر يسمى اللاكتوز. إذا وُجِدَ لديك حساسية لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.
يجتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الكبسولة فلذلك يُعتبَر خالياً من الصوديوم.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دوماً بموجب تعليمات الطبيب.
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.
**الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددما الطبيب فقط.** الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:
علاج التهاب المريء الناتج عن الارتجاع المعدي المريئي (reflux oesophagitis):
بالبالغون: كبسولة من 20 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4-8 أسابيع.
قد يوصي الطبيب بمواصلة استعمال الكبسولات أو برقع الجرعة الدوائية عند التزموم.
لمنع تكرر ظهور الأعراض، قد يوصي الطبيب بمواصلة استعمال الدواء بجرعات من 10، 20 أو 40 ملغ.

الأولاد: سيتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل كبسولة من 20 ملغ مرة واحدة في اليوم. سيتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب، وعادة سيكون لفترة 4 إلى 4 أسابيع.
قد يوصي الطبيب بمواصلة استعمال لوسك أو برقع الجرعة الدوائية بحسب الحاجة وفقاً للاستجابة للعلاج.
منع معاودة القرحة الهضمية:
لمنع معاودة القرحة، الجرعة الدوائية المتبعة هي 10 ملغ أو 20 ملغ مرة واحدة في اليوم. قد يرفع الطبيب الجرعة الدوائية إذا تكررت الأعراض.
علاج ومنع قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر الناتجة عن العلاج بـ NSAIDs (أدوية مصادرة للالتهاب لامتبرويدية):
إذا عانيت في الماضي من قرحة، وهناك حاجة لمواصلة استعمال دواء من فصيلة مضادات الالتهاب الالستبرويدية، فإن الجرعة الدوائية المتبعة هي كبسولة من 20 ملغ مرة واحدة في اليوم لمدة 4-8 أسابيع.

**علاج ومنع القرحة الهضمية الناتجة عن جرثومة هليكوباكتر بيلوري:**
الجرعة المتبعة هي كبسولة من 20 ملغ مرتين في اليوم لمدة أسبوع.
قد يوصي الطبيب بتناول اثنين من المضادات الحيوية التالية: أموكسيسيلين، وكلافنتريموسين وميثرونيدازول.
مدة العلاج المتبعة هي أسبوع.
يجب الحرص على تطبيق تعليمات تناول الدواء بدقة، واستشارة الطبيب إذا كان هناك شك ما الأولاد:
تمديد الجرعة الدوائية وفقاً للوزن.
الأولاد الذين يعانون من صعوبات في البلع، انظر آناه.

**علاج قانض الحموضة في المعدة، الناجم عن ورم في البنكرياس (متلازمة زولينجر إليسون):**
الجرعة الابتدائية المتبعة هي 60 ملغ مرة واحدة في اليوم.
سيرشك الطبيب إلى كمية ملائمة تمنع تفكك الدواء في المعدة بواسطة الحمض.

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**
يجب تناول الدواء قبل وجبة الطعام، يوصى بتناول الدواء في الصباح.
يجب بلع الكبسولة بكاملها مع كأس ماء.
لا يجوز مضغ أو سحق الكبسولة و/أو محتواها، لأن الكبسولة تحتوي على كريات مملّية تمنع تفكك الدواء في المعدة بواسطة الحمض.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال الرضع دون السنة من العمر.

إذا لم يطرأ تحسن على وضعك فيجب مراجعة الطبيب.

**الأولاد أو المرضى الذين يعانون من صعوبات في البلع:**

يمكن فتح الكبسولة وبلع محتواها مع كأس ماء، أو بدلاً من ذلك يمكن كطحنها في الكبسولة مع مشروب حامضي بعض الشيء (مثل عصير البرتقال) أو مع اليوجورت، وتناول خلال 30 دقيقة من أجل التأكد من أنك تناولت كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى. بدلاً من ذلك، يمكن مص الكبسولة وبلع محتواها.

**إذا تناولت خطأ جرعة مفرطة من الدواء، أو إذا قام ولد بلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى** واحضر معك عبوة الدواء.

**إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب**

فيجب تناول جرعة فور تنكرك؛ لكن إذا كان وقت تناول الجرعة القادمة بالتقريب، فيجب تخطي الجرعة المنسية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة تعويضاً عن الجرعة المنسية.

**إذا توقفت عن استعمال الدواء**

لا يجوز التوقف عن استعمال الدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
**يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.**

**لا يجوز تناول الأدوية في العتمة!** راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

**إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.**

### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال لوسك إلى مشاعر أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تعلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد تعاني من أي واحد منها.

**يجب التوقف عن تناول لوسك والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا لاحظت وجود الأعراض الجانبية التالية التي تعتبر نادرة (تؤثر على أقل من 1 نلتق 10,000 مطلقاً)**

**1 نلتق 10,000 مطلقاً** أو نادرة جداً (تؤثر على مئتي 1 نلتق 10,000 مطلقاً)

**1 نلتق 10,000 مطلقاً** أو نادرة جداً (تؤثر على مئتي 1 نلتق 10,000 مطلقاً)

أزيز مفاجئ عند التنفس، انتفاخ الشفتين، اللسان والحلق، أو انتفاخ الوجه، طفح جلدي، إغشاء أو صعوبات في البلع (رد فعل تحسسي خطير) (نادر).
احمرار الجلد المصحوب بالحويصلات والتقرح. قد تنشأ حويصلات خطيرة ونزيف دموي أيضاً في الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية. قد تكون هذه الحالة هي "متلازمة ستيفينس-جونسون" أو توكسيك إبيديرمال نيكروليزيس (تقتصر الأوسجة النموثة البثرية التسممي) (نادر جداً).

طفح جلدي موسع، حرارة جسم مرتفعة وعند لمعاوية متضخمة (متلازمة DRESS - متلازمة رد الفعل الدوائي المصحوب بكثرة البثورينات والأعراض الحزازية أو فرط الحساسية للدواء) (نادر).
طفح جلدي موسع يتميز بجلد أحمر مع قشرة وجلدي ذي نتوءات مع حويصلات بصبحية حمى.
تظهر الأعراض عادة في بداية العلاج (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) (نادر).
اصفرار الجلد، بول غامق وتعب، قد تكون هذه أعراضاً لمشاكل في الكبد (نادر).

**أعراض جانبية إضافية**

**أعراض جانبية شائعة (تؤثر على مئتي 1 نلتق 10,000 مطلقين لل علاج):**

**صداغ:**

تأثيرات على المعدة أو الأمعاء: إسهال، ألم في البطن، إمساك، انتفاخ في البطن، غثيان أو تقيؤ.

سلائل حميدة في المعدة.

**أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على مئتي 1 نلتق 10,000 مطلقين كحد أقصى من بين 100 مئتي لل علاج):**

انتفاخ في الرجليين والكاحلين.

اضطرابات في النوم (أرق).

دوار، إحساس بالوخز والتتميل، إحساس بالغثاس.

إحساس بالدوار (فيرتيجو).

تغيرات في فحوص الدم (نقص وظائف الكبد).

طفح جلدي، طفح ذو نتوءات (شرى) وحكة جلدية.

شعور غير عادي جيد (توتك) وانعدام الطاقة.

**أعراض جانبية نادرة (تؤثر على مئتي 1 نلتق 1,000 مطلقاً لل علاج):**

مشاكل في الجهاز المنوي مثل الانخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء أو الصفائح مما قد يسبب الضعف، ظهور الكدمات أو تطور التلوثات بسهولة أكبر.

قد تسبب منخفضة للصوديوم في الدم والتي قد تسبب الضعف، التقيؤ والتقلصات.

إحساس بالعصبية، الارتباك، أو الاكتئاب.

تغيرات في حسنة النوم.

مشاكل في الرؤية مثل الرؤية المشوشة.

• ظهور فجائي لأزيز تنفسي أو لضيق التنفس (تقصص الشعب الهوائية).

• جفاف الفم، التهاب في جوف الفم.

• ثلوث فطري في الفم قد يؤثر على الأمعاء. تساقط الشعر (صلع).

• التهاب عند التعرض لضوء الشمس. الآلام في المفاصل (أرترالوجيا) أو آلام في العضلات (ميالوجيا).

• مشاكل خطيرة في الكلية (Interstitial Nephritis).

• **أعراض جانبية نادرة جداً (تؤثر على مئتي 1 نلتق 10,000 مطلق لل علاج):**

• تغيرات في العد المنوي بما في ذلك ندرة الميغيات (نقص في خلايا الدم البيضاء).

• عدوانية.

• هلواس – رؤية، إحساس أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع.

• مشاكل خطيرة في الكبد تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ.

• حماسي متعددة الأشكال.

• ضعف العضلات.

• تضخم الشفتين لدى الرجال.

**أعراض جانبية مدى شوبوعها غير معروف (أعراض جانبية لا يمكن تقدير مدى شوبوعها من المعلومات المتوفرة):**

• التهاب في الأمعاء (يسبب الإسهال).

• إذا كنت تستعمل لوسك لفترة تزيد عن 3 أشهر، فقد يطرأ انخفاض على مستوى المغنيزيوم في دمك. يمكن أن تتمثل المضبوطات المنخفضة للمغنيزيوم بالتعب، التقلصات اللاإرادية في العضلات، الارتباك، التشنجات، الدوار أو الارتفاع في وتيرة القلب. إذا كان لديك أحد هذه الأعراض فطليكَ إبلاغ الطبيب بأسرع وقت.

قد تسبب المستويات المنخفضة للمغنيزيوم أيضاً انخفاضاً في مستويات اليوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. قد يقرر طبيبك إجراء فحوص دم منتظمة من أجل تتنّع مستويات المغنيزيوم في دمك.

• مصحوب أحياناً بالألم المفاصل.

• في حالات نادرة جداً قد يؤثر لوسك على خلايا الدم البيضاء ويسبب نقصاً ماعياً (تضرر الجهاز المناعي). إذا كان لديك ثلوث مصحوب بأعراض مثل الحمى مع البيهوش الخطير في وقت مبكر، مصحك الصحي العام، أو الحمى مع أعراض التلوث الموسمي مثل الالتهاب في الرقبة، أو الحلق أو في الفم أو الصعوبات في التنول، فطليكَ استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن من أجل فني نقص خلايا الدم البيضاء (ندرة المحيحات) بواسطة فحص الدم. في هذه الحالة من المهم إعلام الطبيب بذلك.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فطليكَ استشارة الطبيب.**

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il).

والذي يوجه إلى الامتارعة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الإدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، مع تسليطه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن الدوار، رطوبة، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• يجب تخزين هذا الدواء في مكان جاف، فيما دون 25°C. يجب حفظه في العبوة الأصلية للمعالجة من الضوء.

• يجب إغلاق الغطاء جيداً بعد كل استعمال.

• يمكن استعمال الدواء حتى 3 أشهر بعد فتح القنتينة لأول مرة، لكن ليس بعد تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

محتوى الكبسولة:

Mannitol, methacrylic acid copolymer, lactose anhydrous, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, disodium phosphate dihydrate, sodium lauril sulfate, magnesium stearate.

تريكية الكبسولة:

Gelatin, red iron oxide, titanium dioxide, water.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

الكبسولة مكونة من جزء وردي معتم مطبوع على المعد "20" وجزء بني ضارب إلى الحمرة مطبوع عليه "A Losec".

تحتوي الكبسولات في داخلها على كريات ذات طلاء معوي لونها أبيض ضارب إلى الصفرة بعض الشيء.

أحجام العبوة: 7، 14، 28 و30 كبسولة. قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

**اسم المصنّع وصاحب الامتياز وعنوانه:**

تيفع إسرائيل م.ض، شارع دفوره هاديغية 124، تل أبيب.

**تم تحرير النشرة في تموز/يوليو 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.**

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

050.66.26256

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

Losec20Cap-Rx-PL MW0723

© 2023 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

جميع الحقوق محفوظة.

تفصّل المعلومات في الملصق المرفق مع الدواء.

لا يجوز إعادة طباعة أو توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

لا يجوز إعادة توزيع هذا الدواء أو أي جزء منه في أي بلد آخر دون إذن مسبق من Teva Pharmaceutical Industries Ltd.