

## עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה  
פלובנגל 5% וטרינרי  
אבקה להגשה בתערובת

2. חומר פעיל  
פלובנדזול 5%  
Flubendazole 5%  
לרשימת החומרים הלא פעילים ראה סעיף 13

### 3. למה מיועדת התרופה

לטיפול בתולעים עגולות ושטוחות במערכת העיכול כמו: *Ascaridia galli*, *Cappilaria* spp.  
*Heterakis Gallinarum*, *Railletina* spp. בתרנגולות ותרנגולות מטילות.

קבוצה תרפויטית:  
תכשיר אנטי-הלמנטי ממשפחת ה-Benzimidazoles

4. התוויות נגד :  
לא ידוע

5. תופעות לוואי  
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על  
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות  
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  
או ע"כניסה לקישור: [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה: תרנגולות ותרנגולות מטילות

7. מינון ואופן המתן  
600 גרם פלובנגל (30 ppm פלובנדזול) לטון תערובת. יש לערבב תחילה עם 5 ק"ג של  
התערובת ולאחר מכן יש לערבב את היתרת התערובת להשלמת 1 טון.  
יש לערבב היטב את התכשיר לתוך התערובת.  
יש להגיש את התערובת המכילה את התכשיר במשך 7 ימים רצופים.

8. אופן השימוש בתכשיר  
להגשה בתערובת בהתאם להנחיות בסעיף 7.

### 9. זמן המתנה

לשחיטה לבשר: 14 ימים  
לשיווק ביצים: 1 יום

## 10. אזהרות

- אסטרטגיות שיש להימנע מהן מכיוון שהן עלולות להוביל לסיכון מוגבר של התפתחות עמידות לתרופות נוגדות תולעים כוללות:
  - שימוש תכוף מדי וחוזר מדי בתרופות נוגדות תולעים מאותה קבוצה למשך פרק זמן ממושך
  - תת מינון

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
  - מגע עם תכשיר זה עלול לגרום לרגישות בעור וגירוי בעור ובעיניים.
  - אנשים עם רגישות יתר ידועה (אלרגיה) לפלובנדזול צריכים להימנע ממגע עם התכשיר הווטרינרי.
  - בזמן ערבוב התכשיר בתערובת, על העובד להימנע ממגע התכשיר בעור ובעיניים ומשאיתו וזאת על ידי שימוש באמצעי מיגון מתאימים. לכן יש להשתמש בכפפות, מסיכת מגן ומשקפי מגן בעת הטיפול בעת הטיפול במזון עם תכשיר זה.
  - אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן המגע בתכשיר.
  - יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתכשיר זה ולאחר מגע בתערובת עם החומר הרפואי. במקרה של מגע עם עור ו/או עין, יש לשטוף מיד בהרבה מים.
  - אם מופיעים תסמינים לאחר חשיפה, כגון פריחה בעור, התייעץ עם רופא וקח איתך את העלון או את התווית. דלקת של הפנים, השפתיים והעיניים או מצוקה נשימתית הם סימנים חמורים יותר הדורשים טיפול רפואי דחוף.

## 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C

## 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

## 13. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה לקטוז  
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה : אבקה בגוון לבן-צהבהב

התכולה 600 גרם בשקית למינט ו 3 ק"ג בשקית למינט

**יצרן ובעל הרישום:** ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30 איזור תעשייה צפוני, אור עקיבא, 3060000

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות : 082-83-92321

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות