

אוקטובר 2023

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

FENTA Injection - עדכון עלון לרופא

מעבדות רפא מבקשת להביא לידיעתכם כי עודכן העלון לרופא של התכשיר

המרכיב הפעיל: Fentanyl (as citrate) 0.05 mg/ml

התוויה:

Fenta Injection is indicated:

- For analgesic action of short duration during anesthetic periods (premedication induction and maintenance) and in the immediate postoperative period as need arises.
- As a narcotic analgesic supplement in general or regional anesthesia.
- For administration with neuroleptics (such as droperidol) as an anesthetic premedication for the induction of anesthesia and as an adjunct in the maintenance of general or regional anesthesia.
- For use as an anesthetic agent with oxygen in selected high-risk patients (open heart surgery or certain neurological or orthopedic procedures).
- By the epidural route for the postoperative management of pain following general surgical procedures and cesarean sections and as adjunct to general anesthesia.

מיכון יתר:

Symptoms and signs:

The manifestations of fentanyl overdosage are generally an extension of its pharmacological action. Depending on the individual sensitivity, the clinical picture is determined primarily by the degree of respiratory depression, which varies from bradypnoea to apnoea. **Toxic leukoencephalopathy has been observed with fentanyl overdose.**

סעיף 6.2:

Incompatibilities

The product is chemically incompatible with the induction agents thiopentone and methohexitone because of the wide differences in pH.

For immediate use after **first opening and** dilution.

העלון לרופא מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), וניתן גם לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת מעבדות רפא בע"מ בטל' או במייל: RA@rafa.co.il, 02-5893939.

בכבוד רב,
מגר' חנה הירש
רוקחת ממונה