



## تعليمات إستعمال منشقة أولتييرو بريزهارل الرجاء إقرأ كامل تعليمات الإستعمال قبل إستعمال أولتييرو بريزهارل.



تأكد من أن الكبسولة فارغة



تأكد من أن الكبسولة فارغة

إفتح المنشقة لتري فيما إذا تبقى مسحوق داخل الكبسولة.

- ألق المنشقة إذا تبقى مسحوق داخل الكبسولة:
- كدر المراحل 3 حتى 3ج.



فارغة تبقى مسحوق



إستنشق بعقم



المرحلة 3:

أزفر نحو الخارج بشكل تام

لا يجوز الأثر لداخل المنشقة.



المرحلة 3:

إستنشق الدواء عميقاً

أسك المنشقة كما هو في النموذج الذي في الرسم. ضع الفوهة داخل الفم وأشق شفطك حولها جيداً. لا يجوز الضغط على الزرين الجانبيين.

إستنشق نحو الداخل بسرعة، عميقاً ما أمكن. خلال الإستنشاق تسمع صوت خشخشة.

قد تشعر بطعم الدواء خلال الإستنشاق.



المرحلة 3ج:

حبس التنفس

إحس تنفسك لمدة 5 ثوان.



ألقب وحرر



المرحلة 2:

ألقب الكبسولة مرة واحدة

إسك المنشقة بوضع عمودي.

ألقب الكبسولة بواسطة الضغط بقوة على الزرين الجانبيين في نفس الوقت. من المفترض أن تسمع شجيج عند إلقاء الكبسولة. ألقب الكبسولة مرة واحدة فقط.



المرحلة 2:

حرر الزرين الجانبيين



أدخل



المرحلة 1:

إسحب الغطاء نحو الأعلى



المرحلة 1:

إفتح المنشقة



المرحلة 1ج:

أخرج الكبسولة

إفصل جزء من الوبحة الحاوي على كبسولة واحدة من الوبحة الكاملة.

قشر الرفافة عن شريط الوبحة من أجل إخراج الكبسولة.

لا يجوز دفع الكبسولة إلى الخارج عبر الرفافة.

لا يجوز بلع الكبسولة.



المرحلة 1:

أدخل الكبسولة

لا تضغط أبداً الكبسولة مباشرة داخل الفوهة.



المرحلة 1:

ألق المنشقة

تحتوي علبة واحدة من أولتييرو بريزهارل على:

• منشقة أولتييرو بريزهارل واحدة

• لويحة واحدة أو أكثر التي تحتوي كل واحدة على 10 كبسولات من أولتييرو بريزهارل، للإستعمال داخل المنشقة.



غطاء

فوهة الكبسولة

منشقة

الزرين الجانبيين

قاعدة

لويحة

### تنظيف المنشقة

يجب مسح الفوهة من الداخل ومن الخارج بمساحل تنظيف وجاف خلال من الزغب، وتلك لإزالة بقايا المسحوق. يجب الحفاظ على بقاء المنشقة جافة.

أبداً لا تغسل المنشقة بواسطة الماء.

### رعي المنشقة بعد الإستعمال

يجب رعي المنشقة بعد 30 يوماً من الإستعمال.

إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ومناقش لقد تعد ضرورية بعد.

### أسئلة شائعة

لمآذا لم تصغر المنشقة ضجيجاً بينما أستنشق الدواء؟

من الجائز أن الكبسولة عقلت في حجرة الكبسولة. إذا حدث هذا الأمر، حرر الكبسولة بعذر بواسطة الطرق على قاعدة المنشقة. يجب إستنشاق الدواء ثانية بتكرار المراحل 3 حتى 3ج.

إذا تبقى مسحوق داخل الكبسولة، ماذا علي أن أفعل؟

لم تلتقي ما يكفي من الدواء ألق المنشقة وكرر المراحل 3 حتى 3ج.

سعدت بعد إستنشاق الدواء هل هذا هام؟

قد يسهب هذا إنطالما الكبسولة فارغة، فأنت تطعم ما يكفي من الدواء.

شعرت بقطع صغيرة من الكبسولة على لساني. هل هذا مهم؟

قد يحدث هذا إنه أمر غير ضار. زياد إمشاتلات كسر الكبسولة إلى قطع صغيرة إذا تم ثقب الكبسولة أكثر من مرة واحدة.

### معلومات هامة

- دائماً يجب تخزين كبسولات أولتييرو بريزهارل داخل الوبحة وإخراجها فقط مباشرة قبل الإستعمال.

- لا يجوز دفع الكبسولة عبر الرفافة من أجل إخراج الكبسولة.

- لا يجوز بلع الكبسولة.

- لا تستعمل كبسولات أولتييرو بريزهارل مع منشقة أخرى.

- لا تستعمل منشقة أولتييرو بريزهارل لإستعمال كبسولات أخرى.

- لا تضع أبداً الكبسولة في فمك أو في فوهة المنشقة.

- لا تضغط على الزرين الجانبيين أكثر من مرة واحدة.

- لا تزرر لداخل فوهة المنشقة.

- لا تضغط على الزرين الجانبيين بينما تستنشق عبر الفوهة.

- لا تستعمل كبسولات وينديك ميلتيزن.

- أبداً لا تغسل منشقتك بواسطة الماء.