

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسُوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

برينتكس، أقراص مغلفة 5 ملغ، 10 ملغ، 15 ملغ، 20 ملغ

التركيز: المادة الفعالة وكميته:

برينتكس 5 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على 5 ملغ من الفورتيكسيتين (كميدروبروميد)،
برينتكس 10 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على 10 ملغ من الفورتيكسيتين (كميدروبروميد)،
برينتكس 15 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على 15 ملغ من الفورتيكسيتين (كميدروبروميد)،
برينتكس 20 ملغ: كل قرص مغلف يحتوي على 20 ملغ من الفورتيكسيتين (كميدروبروميد)،

قائمة المواد غير الفعالة: أنظر البند 6.

- اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمال هذا الدواء. هذه النشرة تحتوي على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كان لديك أسئلة إضافية، اتصل بطبيبك أو الصيدلي.

- هذا الدواء قد وصف لعلاج مرضك. لا تعطه لأخرين. قد يضرهم حتى لو كان يبدو لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1. لماذا يستعمل هذا الدواء؟

برينتكس ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مضادات الاكتئاب، وقد أعطي لك هذا الدواء لعلاج الاكتئاب لديك.

يستخدم برينتكس لعلاج نوبات الاكتئاب (Major depressive episodes) عند الكبار.

أثبتت أن برينتكس يخفف مجموعة واسعة من أعراض الاكتئاب، بما في ذلك الحزن والتوتر الداخلي (الشعور بالتوتر)، اضطرابات النوم، انخفاض الشهية، صعوبة في الترکيز، الشعور بعدم القيمة، فقدان الاهتمام في الأنشطة المفضلة، الشعور بالبطء.

2. قبل استعمال الدواء

لا تستعمل الدواء إذا:

- كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (أنظر قائمة المواد غير الفعالة في البند 6).

- كنت تأخذ أدوية أخرى لعلاج الاكتئاب معروفة باسم مثبطات المونوأمين أو كسيذار الغير انتقائية أو مثبطات المونوأمين أو كسيذار الانتقائية من نوع MAO-A. اسأل الطبيب إذا كنت غير متأكد.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء.

قبل استعمال برينتكس، أخير طيبك:

- إذا كنت تأخذ أدوية لها تأثير على السيروتونين، مثل:

- ترامادول وأدوية مشابهة (مسكن آلام قوي)

- سوماتريبتان وأدوية مشابهة مع مركب فعال ينتهي اسمه بـ "تربيتان" (تستخدم لعلاج الصداع النصفي).

تناول هذه الأدوية جنباً إلى جنب مع برينتكس قد يسبب متلازمة السيروتونين. قد تتفاقم هذه المتلازمة مع الهلوسة والتشنج غير الطوعي، تسارع دقات القلب، ارتفاع ضغط الدم، حمى، غثيان واسهال.

- إذا كان لديك نوبات (تشنجات)

سوف يقوم طبيبك بمعالجتك بحذر إذا كان لديك تاريخ من نوبات أو اضطراب غير مستقر من التشنجات أو صرع غير مستقر. إن التشنجات هي مخاطر محتملة من الأدوية التي تستخدم لعلاج الاكتئاب. يجب التوقف عن العلاج في أي مريض تتطور لديه نوبات أو عندما يكون هناك زيادة في وتيرة النوبات.

- إذا كان لديك هوس.

- إذا كان لديك ميل للنزيف أو تتقى الكدمات بسهولة. إذا كنت حاملاً (أنظر البند "حمل، إرضاع وخصوصية").

- إذا كان لديك انخفاض في مستوى الصوديوم في الدم.

- إذا كان عمرك 65 عاماً أو أكثر.

- إذا كنت تعاني من مرض الكلى الحاد.

- إذا كنت تعاني من مرض الكبد الحاد أو أمراض الكبد التي تسمى تليف الكبد (cirrhosis).

-إذا كان لديك الآن أو كان لديك في السابق ارتفاع في الضغط داخل العين أو جلوكوما. إذا ظهرت آلام في العينين أو إذا تطور لديك خلال العلاج تشوش في الرؤية، توجه إلى الطبيب.

عندما تعالج بأدوية مضادة للاكتئاب، يشمل فورتياكسيتين، قد تعايش كذلك مشاعر من العدائية، قلة الهدوء، غضب وهيجان. إذا شعرت بذلك، بلغ الطبيب بذلك.

التفكير في الانتحار وتفاقم الاكتئاب

إذا كنت مكتئباً وأو تعاني من اضطرابات القلق، أحياناً، قد يكون لديك أفكار في إيذاء النفس أو أفكار انتحارية. هذه الأفكار قد تزيد في بداية العلاج بمضادات الاكتئاب، لأن فاعلية الدواء تبدأ بالتأثير بعد مرور بعض الوقت: عادة يبدأ التأثير بعد أسبوعين من بدء العلاج، وفي بعض الأحيان في وقت لاحق ومتاخر.

- إذا كانت لديك في السابق أفكار انتحارية أو إيذاء لنفسك.
- إذا كنت من شاب بالغ.

أظهرت المعلومات المستفادة من التجارب السريرية زيادة في خطورة السلوك الانتحاري لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة والذين يعانون من حالات نفسية وتتناولوا دواء مضاد للاكتئاب.

إذا كان لديك أفكار انتحارية أو أفكار لإيذاء نفسك في أي وقت كان، عليك الاتصال بطبيبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور. من المستحسن إخبار أحد أقاربك أو صديق تثق به، أنك تعاني من الاكتئاب أو لديك اضطرابات القلق، أطلب منهم قراءة هذه النشرة. قد يطلب منهم أن يخبروك إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو القلق يزداد سوءاً عندك، او قلقون بشأن تغيرات طرأت على سلوكك.

الأطفال والمراهقون

لا ينصح بإعطاء برينتكس لأطفال ومبراهقين دون جيل 18، لأنه لا توجد معلومات عن مدى فعالية وسلامة هذا الدواء لدى فئة الجيل هذه.

إذا كنت تتناول، أو تناولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي. خاصة إذا كنت تتناول:

- فينيزرين، إيبرونيازيد، إيزوكروكسازيد، نيليميد، تراناسيرورومين (أدوية لعلاج الاكتئاب من مجموعة مثبطات المونوامين

أوكسيدارز غير الانقائية). لا يجوز تناول أي من هذه الأدوية سوية برينتكس.

إذا كنت قد تناولت أي من هذه الأدوية المذكورة سابقاً، عليك الانتظار 14 يوماً قبل البدء بتناول برينتكس. بعد توفرك عن تناول برينتكس، عليك الانتظار 14 يوماً قبل البدء بتناول أي من الأدوية المذكورة أعلاه.

- موكلوبimid (دواء لعلاج الاكتئاب).

- سيليجيلين، رازاجيلين (أدوية لعلاج مرض الباركنسون (الرعاش))

- لينزوليد (دواء لعلاج التلوث الجرثومي).

- مستحضرات طيبة ذات تأثير سيروتوني جي مثل ترامادول وأدوية مشابهة (مسكنت ألم قوية) وكذلك سوماتريبتان وأدوية مشابهة تحتوي على مواد فعالة التي ينتهي اسمها بـ "تربيتان" (تستعمل لعلاج الصداع النصفي). تناول هذه الأدوية سوية مع برينتكس قد يزيد من احتمال ظهور متلازمة السيروتونين (أنظر الفصل "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء")

- ليثيوم (دواء لعلاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية) أو التريبتوفان.

- الأدوية التي تعرف بأنها تسبب انخفاض مستوى الصوديوم.

- ريفامبيسين (دواء لعلاج السل وغيره من الأمراض المعدية الأخرى).

- كاربامازين، فينيتوين (أدوية لعلاج الصرع أو أي أمراض أخرى)

- وارفارين، ديبيريدامول، فينوبروكومون، جرعة منخفضة من حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين) (أدوية تمبيع الدم).

الأدوية التي تزيد من خطر نوبات الصرع (الختلajات):

- سوماتريبتان وأدوية مماثلة مع مركبات فعالة ينتهي اسمها بـ "تربيتان".

- ترامادول (وهو مسكن ألم قوي).

- ميفلوكوين (لمنع وعلاج الملاريا).

- بوپروبيون (دواء لعلاج الاكتئاب يستخدم كذلك للفطام من التدخين).

- فلوكسيتين، باروكسيتين وغيرها من الأدوية لعلاج الاكتئاب من مجموعة SSRI/SNRI ثلاثة الحلقات.

- نبتة العرن المتقوب (St John's wort) (لعلاج الاكتئاب)

- كوبيندين (دواء لعلاج اضطرابات بنظم القلب)

- كلوربرومازين، كلوربروتوكسيفين، هالوبيريدول (أدوية لعلاج اضطرابات النفسية التي تتنمي لمجموعات تسمى الفينوثيازين، الشيوكسانيت، والبوتيرفينون).

يرجى منك أخبار طبيبك إذا كنت تستخدم أي من هذه الأدوية أعلاه، لأنه على الطبيب أن يعرف إذا كنت عرضة لخطر التوبيات.

إذا كنت تخضع لفحص بول للكشف عن المخدرات، بطرق فحص معينة قد يؤدي تناول برينتلكس إلى ظهور نتائج إيجابية للميثادون رغم أنك قد لا تكون تتناول ميثادون. إذا حدث ذلك، يمكن اجراء فحص محدد أكثر.

استعمال الدواء والطعام:
يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

تعاطي المخدرات واستهلاك الكحول
من المستحسن عدم شرب الكحول عند استعمال هذا الدواء.

الحمل والإرضاخ والخصوبة

إذا كنت حامل أو مرضعة أو تعقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

الحمل
لا تستخدمي برينتلكس خلال الحمل إلا إذا أخبرك الطبيب أنه من الضروري جدًا تناوله.

إذا كنت تستعملين أدوية لعلاج الاكتئاب، يشمل برينتلكس خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حملك، عليك أن تدرك أنك قد تظہر اعراض جانبية في طفلك مثل: صعوبة في التنفس، جلد يميل إلى الزرقة، اختلالات، تغيرات في حرارة الجسم، صعوبات في الأكل، تقيؤ، سكر دم منخفض، تصلب العضلات أو ارتخاء العضلات، ارتكاسات حادة، رجفة، عصبية، توتر، وهن، بكاء من دون توقف، نعاس وصعوبات في النوم. يجب الاتصال على الفور بطبيبك إذا ظهر أي من هذه الأعراض لدى طفلك.

تأكدي بأن القابلة أو طبيبك يعرفون بأنك تستعملين برينتلكس. عند الاستعمال خلال الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، قد تزيد الأدوية مثل برينتلكس خطر حالة وخيمة في الأطفال، تسمى ضغط دم رئوي مرتفع ومقاومة لدى المولود (PPHN)، يجعل الطفل يتفسّد بوتيرة أسرع ويبعد أزرق اللون. عادة ما تبدأ هذه الأعراض خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة. في حال حدث هذا مع طفلك، عليك الاتصال على الفور بالقابلة أو طبيبك.

تناول برينتلكس بالقرب من موعد انتهاء الحمل، قد يؤدي إلى ارتفاع في خطر ظهور نزيف مهبلي ثقيل بعد الولادة بفترة قصيرة. خاصة إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات نزيف. على الطبيب أو المولدة خاصتك أن يكونا على علم بأنك تتناولين برينتلكس ليتمكنوا من تقديم المشورة لك بخصوص ذلك.

الإرضاخ

يتوقع بأن تنتقل مركبات برينتلكس لحليب الأم. لا يجوز استعمال برينتلكس خلال الإرضاخ. سوف يقرر طبيبك إذا كان يتوجب عليك التوقف عن الإرضاخ، أو وقف استعمال برينتلكس وفقاً لفائدة من إرضاخ الطفل، والفائدة من العلاج بالنسبة لك.

السيافة واستعمال الآلات

لا يؤثر برينتلكس، أو أنه ذو تأثير هامشي على قدرة القيادة واستعمال الآلات، مع ذلك حيث أنه تم التبليغ عن أعراض جانبية مثل الدوار. يوصى بتوكيد الحذر عند القيام بهذه النشاطات في بداية العلاج بواسطة برينتلكس وعند تغيير الجرعة.

برينتكس يحتوي صوديوم

هذا الدواء يحتوي أقل من 1 مليمول صوديوم (23 مليغرام) بالقرص، ولذلك يعتبر "حالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا الاستعمال وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الجرعة وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية هي:

10 ملغ مرة في اليوم في الكبار دون بجيبل 65 سنة. يمكن لطبيبك أن يزيد الجرعة لحد أقصى من 20 ملغ للاليوم أو خفضها حتى حد أدنى يقدر 5 ملغ للاليوم حسب استجابتك للعلاج.
للكبار بجيبل 65 سنة فما فوق، الجرعة الابتدائية هي 5 ملغ مرة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع قرص واحد مع كأس ماء. يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.

لا تتوفر معلومات عن سحق أو شطر القرص.

مدة العلاج:

خذ برينتلوكس طوال المدة الزمنية التي يوصي بها الطبيب.
استمر بتناول برينتلوكس حتى لو استغرقك بعض الوقت قبل أن تشعر بأي تحسن في حالتك.
 يجب الاستمرار بتناول الدواء حتى يشير عليك الطبيب بالتوقف.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك. عليك التصرف بهذا النحو حتى لو لم تشعر بأي تأثير أو مضاعفة. علامات الجرعة المفرطة هي دوار، غثيان، إسهال، مضايقة في البطن، نزف في كل الجسم، نعاس ونورد الوجه.

عقب تناول جرعات أعلى بعدة أضعاف من الجرعة الموصى بها، بلغ عن حالات اختلالات وحالة نادرة تسمى متلازمة السير وتوترين.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، يجب تناول الجرعة التالية في الوقت المعتمد. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسيّة.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء
لا تتوقف عن تناول الدواء من دون استشارة طبيبك حتى لو شعرت بتحسن.

قد يقرر طبيبك تقليل جرعتك قبل أن تترافق عن تناول هذا الدواء كلباً.

بعض المتعالجين الذين توّفوا عن تناول برينتلوكس عايشوا أعراض مثل دوخة، صداع، مشاعر نزف مثل نزف البر ودبابيس أو شعور يشبه التيار الكهربائي (خاصة في الرأس)، عدم القدرة على النوم، شعور بالغثيان أو التقيؤ، شعور بالقلق، عدم الهدوء أو قلة الراحة، تعب أو ارتجاف. قد تظهر هذه الأعراض خلال الأسبوع الأول بعد وقف تناول برينتلوكس.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

كأي دواء، قد يسبب استعمال برينتلوكس أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي واحدة منها.
 بشكل عام، الأعراض الجانبية التي شوهدت كانت بدرجة وخامنة متعددة إلى متوسطة وحدثت خلال أول أسبوعين من العلاج. كانت الأعراض مؤقتة عادة ولم تؤدي إلى وقف العلاج.
 تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية بحسب الشيوع المفصل:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) أعراض تظهر في أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة - غثيان

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض جانبية تظهر في 10-1 مستخدمين من بين 100

- إسهال، إمساك، تقيؤ
- دوار
- نزف في كل الجسم
- أحلام شاذة
- تعرق زائد
- صعوبات هضم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض جانبية تظهر في 1-10 مستخدمين من بين 1,000

- نورد
- تعرق في الليل

- رؤية مشوشة
- رجفة لا إرادية (رجفان)

اعراض جانبية نادرة (rare) اعراض تظهر في 1-10 مستخدمين من بين 10000 توسيع الحدقات، ما قد يزيد الخطر للجلوكوما (أنظر البند 2).

- اعراض جانبية شيوعها غير معروفة (اعراض لا يمكن تقييم شيوعها من المعطيات الموجودة)
- مستوى منخفض من الصوديوم في الدم (تشمل الاعراض شعور بالدوار، وهن، بلبلة، نعاس أو تعب شديد، شعور بالغثيان، اعراض وخيمة أكثر من اغماء، اختلالات أو سقوط)
- متلازمة سيروتونين (أنظر البند 2)
- ردود فعل تحسسية، التي قد تكون وخيمة، تسبب انتفاخا في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق، صعوبات في التنفس أو البلع، وأو انخفاض فجائي في ضغط الدم (يجعلك تشعر بالدوار)
- شرى (طفح)
- نزف زائد أو نزف غير مبرر (يشمل ظهور كدمات، نزف من الأنف، نزف من جهاز الهضم ونزيف مهبلي)
- طفح
- اضطرابات في النوم
- قلة الهدوء والعدائية. في حال شعرت بهذه الاعراض الجانبية، توجه إلى الطبيب (أنظر البند 2).
- صداع
- ارتفاع في مستويات هرمون يسمى برولاكتين. حاجة متواصلة وخارجية عن السيطرة للتحرك (تململ حركي)
- صرير الأسنان (صك الأسنان)
- عدم القدرة على فتح الفم (فك "مقل")
- متلازمة الرجل عديمة السكون (رغبات بتحرIk القدمين بغية وقف مشاعر مؤلمة أو غريبة، التي تحدث غالبا في الليل)
- افراز حليبي غير طبيعي من الصدر (ثر الحليب)

شوه خطر زائد لكسور في العظام في متعالجين يستعملون أدوية من هذا النوع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الابلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه للاستماراة الإنترنطية للتبلغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب! لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 30 °C.

لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

mannitol (E421), microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate, hypromellose, Macrogol 400 5 mg: titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172), 10 mg: titanium dioxide (E 171), iron oxide yellow (E 172), 15 mg: titanium dioxide (E171),

iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E 172), **20 mg**: titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

5 ملغ: قرص مطلي وردي بشكل لوزة وبحجم 8.4 x 5 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و "5" في الجهة الأخرى.

10 ملغ: قرص مطلي وردي بشكل لوزة وبحجم 8.4 x 5 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و "10" في الجهة الأخرى.

15 ملغ: قرص مطلي وردي بشكل لوزة وبحجم 8.4 x 5 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و "15" في الجهة الأخرى.

20 ملغ: قرص مطلي وردي بشكل لوزة وبحجم 8.4 x 5 ملم، مع علامة "TL" في جهة واحدة و "20" في الجهة الأخرى.

الأقراص بعبوة بليستر 7 ، 14 و 28 قرصاً. قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

لوندباك إسرائيل م.ض، چلچالي هبلادا 11، ص.ب. 13105، هرتسليا 4672211

عنوان البريد الإلكتروني: Israel@lundbeck.com

اسم المنتج وعنوانه: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark

تم تحرير النشرة في تشرين الأول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

Brintellix 5 mg: 153 72 34152

Brintellix 10 mg: 153 73 34155

Brintellix 15 mg: 153 74 34156

Brintellix 20 mg: 153 75 34157

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.
