

# אמלה 5% קרם

**החומרים הפעילים וריכוזם:**  
הרכב:  
Lidocaine 2.5%  
Prilocaine 2.5%

חומרים בלתי פעילים ואלרגיים בתכשיר - ראה סעיף 2 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה וסעיף 6 מידע נוסף.

**קרא בעיון את העלון עד סופו טטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע המציע על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם.  
עליו להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקם אם הינך זקוק למידע נוסף.

## 1. למה מיועדת התרופה?

אמלה 5% משמשת לאלחוש מקומי על פני העור, לשיכוך כאבים לפני פעולות הרכוזה בהחדרת מחט (לדוגמה: עירוי, בדיקות דם) וניתוחי עור שטחיים.

קרם אמלה 5% פועל על ידי אלחוש פני העור באופן זמני, ובכך מקדם לשיכוך כאב, אך עדיין קיימת שחחוש מגע לוחץ באזור.

**קבוצה תרופתית:** מאלחש מקומי מקבוצת אמידים.

## 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה:

אם אתה גרש (אלרגי) לחומרים הפעילים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, או למאלחש מקומי דומה אחר (ראה סעיף 6).

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בקרם אמלה 5% ספר לרופא אם:

- לך או לילדך יש מחלה תורשתית נדירה המשפיעה על הדם, שקראת "מחסור בגלוקוז-6-פוספט דהידרוגנאז" (אנזים G6PD, רגישות לפול).
- לך או לילדך יש בעיה ברמות פיגמנט הדם הנקראת "טתהמוגלובינמיה" (כחלת).
- אין להשתמש בקרם אמלה 5% באזורים בהם יש פריחה בעור, לחכיבים, שפשושים, שריוט או פצעים פתוחים אחרים, פרט לכזה. ברגל. אם אתה מבטית אלו קיימת, בדוק עם הרופא או הרוקם לפני השימוש בתרופה.
- אתה או ילדך תופת סובלים ממצב של גירוי בעור הנקרא "אטופיק דרמטיטיס". ייתכן שמעך השתייה קצרה יותר על העור יספיק. השארת הקרם על העור למשך יותר מ-30 דקות יכולה לגרום לעלייה בשיעור שכיחות של תגובות עוריות מקומיות (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- הינך נוטל תרופות מסוימות להפרעות בקצב הלב (אנט-אריטמיות מקבוצת class III, כגון אמידארון). במקרה זה הרופא ינסה את תפקוד הלב שלך.

עקב הפוטנציאל של ספיגה מוגברת בעור שגולה לאחרונה, חשוב לעקוב אחר המינון המומלץ, אזורי העור ומשך השארת הקרם המרוח על פני העור.

יש להימנע מכניסה קרם אמלה 5% לתוך העיניים. מאחר שזה יכול לגרום לגירוי. אם בטעות קרם אמלה 5% כנס לעיניים, יש לשטוף מיד היטב את העיניים במים פושרים או בתמיסת מים מלח (סודיום כלוריד). היזהר על מנת להימנע מכניסת כל דבר לעין עד לחזרת התחושה.

אין לרוח קרם אמלה 5% על עור תוף פגום.

כאשר הינך משתמש בקרם אמלה 5% לפני שהינך מתחשב עם חיסונים חיים (לדוגמה חיסון שחפת), עליך לחזור לרופא או לאחות לאחד תופעת הזמן המבוטשת לצורך מעקב אחר תוצאות החיסון. בילדים - אין להשתמש על איברי המין הריניים (ראה גם בסעיף 3).

**במצבים הבאים יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:**

- בתגובות מחמת גיל שנה המטופלים במקביל תרופות משרות טתהמוגלובינמיה כגון סולפונאמידים ("תרופות סולפה").
- בפגים עד הגיעם לגיל כרונולוגי של 37 שבועות הריון.

### איתור אקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, זאת משרת תזונה ותרופות מצחיות, ספר על כך לרופא או לרוקם. תוסף שקרם אמלה 5% יכול להשפיע על האופן בו תרופות מסוימות פועלות וחלק מהתרופות יכולות להשפיע על קרם אמלה 5%.

### ספר לרופא או לרוקם במידה אם אתה לוקח:

- תרופות המשמשות לטיפול ביריחיים, הנקראות "סולפונאמידים" וניטרופוטואין.
- תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה, הנקראות פניטואין ופנוברביטל.
- מאלחשים מקומיים אחרים.
- תרופות לטיפול בקצב לב לא סדיר, כגון אמידארון.
- סימטודין או חוסמי בטא, אשר עולים לגרום לעלייה ברמות הלידוקאין בדם. לתגובה בין תרופתית זו אין לזנוטטיק קלינית בטיפול קצר-טווח עם קרם אמלה 5% במינונים המומלצים.

### הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, התייעץ עם רופא או רוקם טרם השימוש בתרופה זו. שימוש מדידות בקרם אמלה 5% במהלך הריון לא אמור לגרום לתופעות לוואי בעובר.

החומרים הפעילים בקרם אמלה 5% (לידוקאין ופרילוקאין) מופיעים לחלב האם. אולם, הכמות היא קטנה מאוד כך שבדרך כלל אין סיכון לילד.

נסיים בבעלי חיים לא הראו פגיעה בפוריות הזכר או הנקבה.

### נהיגה ושימוש במכונית

לקרם אמלה 5% אין השפעה כלל או יש השפעה זניחה על יכולת הנהיגה והשימוש במכונית כאשר משתמשים במינון המומלץ.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים בתרופה

קרם אמלה 5% מכיל Macroglyglycerol hydroxystearate (מקרוגליגליצ'רול הידרוקסיסטארט) שעלול לגרום לתגובות עוריות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבודק עם הרופא או הרוקם אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

### ראה בתמשך: "מידת הכמות הנכונה של הקרם"

אין להשתמש בקרם אמלה 5% ברקמות ריריות או על עור פגוע ללא התייעצות עם רופא. במקרים אין לזנוטטיק את זמן השתייה של הקרם.

### מינון מקובל בהעדור הוראה אחרת מהרופא

**מינון מבוגרים (מעל גיל 12):**  
פלורצדורות ניתוחיות/עזירות (כדוגמת החדרת מחט לעורף עירוי תוך ורידי או בליקחת בדיקות דם, או גירוד נגעים ויראליים

בעור (molluscum contagiosum):

כ-1.5-2 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם, לכסות בכיסוי אטום, כגון ניילון נצמד, ולהמתין 1-5 שעות.

פלורצדורות ניתוחיות הדורשות אלחוש מקומי עמוק יותר: כ-1.5-2 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם, לכסות בכיסוי אטום, כגון ניילון נצמד, ולהמתין 2-5 שעות.

מינון מקסימאלי: ניתן למרוח עד 60 גרם ליממה (2 שפופרות של 30 גרם). אין להשאיר את הקרם על האזור המטופל למשך יותר מ-3 שעות.

באזורי עור שעברו גילוח לאחרונה, אין למרוח קרם אמלה 5% על שטח שגדול יותר מ-600 סמ"ר (20 X 30 סמ"מ).

להסרת כיבים ברגליים (leg ulcers) - יש למרוח 1-2 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם על שטח הכיב, אך לא יותר מ-10 גרם לכל טבלה. לכסות בכיסוי אטום ולהשמיח את יתרת הקרם שנותרה בשפופרות. זמן השתייה: לפחות 30 דקות. במקרים של רקמות עם דיפרות קשה במיוחד, ניתן להאריך את זמן השתייה למקסימום 60 דקות.

הסרת הכיב צריכה להתחיל תוך 10 דקות לאחר שהוסר הקרם. אמלה 5% כולה לשמש עד 15 טיפולים במהלך חודש-חודשיים ללא הפחתה באפקט או עלייה במספר התגובות המקומיות.

על איברי עור (בגרים בלבד) - לפני הורקת מאלחשים מקומיים - יש למרוח כ-1 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש לכסות בכיסוי אטום למשך 15 דקות.

על איברי עור (נשים) - לפני הורקת מאלחשים מקומיים - יש למרוח כ-1-2 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש לכסות בכיסוי אטום למשך 60 דקות.

על איברי עור יריים (מבוגרים בלבד) - לפני ניתוחי עור זעירים כגון ניתוח הסרת קונדילומות: יש למרוח 5-10 גרם, חלי בגודל השטח המטופל. יש לכסות את כל השטח, כולל הקפלים בריריות. אטימה אינה הכרחית. זמן השתייה: 5-10 דקות.

יש להתחיל את הניתוח ביד לאחר הסרת הקרם.

### מינון בילדים:

לשימוש על העור לפני פעולות רפואיות כגון החדרת מחט או ניתוחי עור זעירים. יש למרוח שכבה עבה לפני הפעולה.

**אין לעבור על המנה המומלצת (ראה טבלת מינון).** בשימוש בתינוקות עד גיל 3 חודשים יש לבודק מטהמולובין לפני ואחרי השימוש.

בילדים, אין להשתמש באמלה 5% לקמת ריריות של איברי המין.

### טבלת מינון בתינוקות וילדים:

גיל / משקל גוף	כמות מקסימלית של אמלה 5% קרם	שטח מריחה מקסימלי	זמן השתייה המקסימלי על העור
עד 3 חודשים / עד 5 ק"ג	1 גרם	10 סמ"מ <sup>2</sup>	1 שעה
3-12 חודשים / 5-10 ק"ג	2 גרם	20 סמ"מ <sup>2</sup>	4 שעות
1-6 שנים / 10-20 ק"ג	10 גרם	100 סמ"מ <sup>2</sup>	4 שעות
7-12 שנים / מעל 20 ק"ג	20 גרם	200 סמ"מ <sup>2</sup>	4 שעות


בילדים עם אטופיק דרמטיטיס יש להסיר את הקרם 15-30 דקות לאחר המריחה.

### מחן מנות נוספות:

בתינוקות עד לגיל 3 חודשים - אין לתת מנה נוספת במשך 24 שעות.

בתינוקות וילדים מעל לגיל 3 חודשים - יש להמתין לפחות 12 שעות עד לתחילת מרוח חוזר של אמלה 5%. אין לתת יותר מ-2 מנות תוך 24 שעות.

**מידת הכמות הנכונה של הקרם (לשימוש בילדים ובמבוגרים):**  
על מנת למדוד 1 גרם של קרם אמלה 5%, יש לחוץ בעדינות על השפופרת והואצת פס צר של קרם באורך 3.8 סמ"מ וברוחב 5 מ"מ. פס הקרם צריך להיות בגבולות של השרטוט שלהלן:



**אין לעבור על המנה המומלצת.** ראה בסוף עלון זה הנחיות מפורטות בנוגע לאופן השימוש.

אין לבלוע/לרפוח תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים, ריריות הוויניים. במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במים. יש להגן על העין עד שחחוושה חוזרת לעין.

**אם מרחת כמות גדולה יותר מהמומלץ ייתכן שתחוה:** עור בגוון אפור-כחלחל, תחושת נמנום או סחרחורת, טשטוש ריחה או צלצולים באוזניים, שיעוים בתחושת הטעם, לבלול, תחושת חום/לדוק או נימול, תחושת קצקוץ בעור מסביב לפה וחוסר תחושה בלשון. במקרים מורשים מן מינון יתר ייתכנו: עייפות, רידת לחץ דם, האטה בקצב הנשימה, הפסקת שימה שיעוניים בקצב הלב - יש לפנות את המטופל לחדר מיון מיד!

**אם מרחת קרם אמלה 5% בכמות גדולה מהמומלץ או אם בטעות בעלי ילד או מישהו אחר את התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מעילי של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אין ליטול תרופה בחושיך בדוק תהוית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** הרכב משפטיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקם.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקרם אמלה 5% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות לוואי. ייתכן שיש סתבול מאך אחת מהן.

פנה לרופא שלך או לרוקם אם תופעת לוואי כלשהי מבין תופעות הלוואי הבאות מטרידה אותך או שלא נראה שעתידת לחלוף. ספר לרופא על כל דבר אחר הגורם לך לחוש לא טוב בזמן טוחה משתמש בקרם אמלה 5%.

אם הינך חווה אחת מהתופעות הבאות במהלך השימוש בקרם אמלה 5%, הפסק את השימוש בו ובדוק עם הרופא שלך או הרוקם בהקדם האפשרי:

- תגובות אלרגיות, השימוש בקרם אמלה 5% עלול להתפתח לשוק אפילקטי (פריחה בעור, חום, קשיי נשימה ועיפוף)
- במהלך הטיפול בעור, בריריות איברי המין או בכיבים ברגליים.
- טתהמוגלובינמיה (בעיה בדם), שבמקרים נדירים עלולה להתפתח במהלך הטיפול בעור, ועלולה לגרום לסימנים ותסמינים של היפוקסיה (רמות נמוכות חריגות של המצן בדם). טתהמוגלובינמיה נפצתה בתדירות גבוהה יותר, לעיתים קרובות בקרם למינון יתר. בתינוקות שזה עתה נולדו ובתינוקות מגיל 0 עד 12 חודשים.

תגובה קלה (חיוורון או אדמוניות של העור, נפיחות קלה, תחושת צריבה ראשונית או גירוי) עלולה לקרות באזור מריחת קרם אמלה 5%. אלו תגובות תקינות לקרם ולחומרים מאלחשים והן ייעלמו תוך זמן קצר ללא צורך בשימוש באמצעים נוספים.

אם הינך חווה השפעות מטרידות או יוצאות דופן כשאתה משתמש בקרם אמלה 5%, הפסק את השימוש בקרם ובדוק עם הרופא שלך או הרוקם מוקדם ככל שניתן.

**תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 100):**

• תגובות עוריות מקומיות חולפות (חיוורון, אדמוניות, נפיחות) במקום המטופל במהלך הטיפול בעור, בריריות של איברי המין או בכיבים ברגליים.

• תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול ברירית איברי המין או בכיבים ברגליים.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10 ל-100 משתמשים מתוך 1,000):**

• תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול בעור.

• חוסר תחושה (עקצוץ) באזור המטופל במהלך הטיפול ברירית איברי המין.

• גירוי העור המטופל במהלך הטיפול בכיבי רגליים.

**תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-10 ל-10 משתמשים מתוך 10,000):**

• דימום בצורת נקודות קטנות באזור המטופל (במיוחד אצל ילדים עם אקזמה לאחר זמני השארה ממושכים יותר של הקרם) במהלך הטיפול בעור.

• גירוי של העיניים אם קרם אמלה 5% בא במגע עימן בטעות במהלך הטיפול בעור.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או נאכשה אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:** על ההורים לדווח לרופא המפגל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לכתב פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: [Padagis.co.il](mailto:Padagis.co.il)

### 5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרפול! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לתרופה יש וטווח אריזתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הריחה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• תנאי אחסון: יש לאחסן את התרופה מתחת ל-30°C. אין להקפיא.

• ניתן להשתמש בקרם אמלה 5% עד 4 שבועות לאחר פתיחת האשפופרת הראשונה, אך לא יאחר מתאריך התפוגה.

• אין להשליך את התרופה לפשכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקם כיצד יש להסיר מטרפות שאינן משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו לשמור על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

#### נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Macroglyglycerol hydroxystearate, Carbomer 974P, sodium hydroxide, purified water.

#### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

קרם אמלה 5% הינו קרם לבן רך הארוז באריחה המכילה שפופרת אלומיניום יחידה של 30 גרם.

**בעל הרישום וכתובתו:** פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.

**היצרן וכתובתו:** רסיפאר, קארלסקוגה איי. בי, שבדיה, עבור אספן.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 4325.25706

לשם הפשטות ולהקלת ההקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

### אופן השימוש:


1. לחץ על שפופרת של אמלה 5% להוצאת כמות מוספקת (ראה הוראות המינון) ומרח שכבה עבה של הקרם על העור. אין לשפשף את המקום.



2. כסה את העור עליו נמרחת אמלה 5% בעזרת כיסוי אטום, כגון ניילון נצמד. הצמד היטב, ודא שהקרם כולו מכוסה.



3. המתן את פרק הזמן הנדרש (ראה מידע לגבי זמן השתייה בסעיף 3) עד לביצוע הטיפול הנדרש.



4. הסר את הכיסוי, נב את קרם אמלה 5% והכך לטיפול הנדרש. האזור שוטפל באמלה 5% יישאר מואחש במשך 30 דקות לפחות ועד מספר שעות.

