

إملاً 5% كريم

المواد الفعالة وتركيزها:

Lidocaine 2.5%
Prilocaine 2.5%
بويوكاين وبروكائين
المواد غير الفعالة ومواد التحسس في المستحضر - انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إنراشر الشرة تتغصن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تجتبي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسلطة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك استخدام الدواء بشكل صحيح. إنسرث الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستعمل إملاً 5% تدبير الموضعى على سطح الجلد، لتسكين الآلام قبل الإجراءات التي يتطلبها على إدخال إبرة (على سبيل المثال، التسريب، فحوص الدم) وجرحات الجلد السطحية.

يُعمل كريم إملاً 5% عن طريق تدبير سطح الجلد بشكل مؤقت، وبذلك يساعد على تسكين الألم، ولكن لا يزال بإمكانك أن تشعر بالملمس والضغط في المنطقة.

الفضيلة العلاجية: مخدر موضعى من مجموعة الأميدات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استخدام الدواء:
إذا كنت حساساً (الergicy) للمواد الفعالة، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، أو أي محتوى متشابه آخر (انظر الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:
قد تسبب حكة الجلد التأنيث. من الجائز أن تكتفي ببقاء أصبع على الجلد التي تسمى "التهاب الجلد التأنيث".

• وجذل إدراك أو لدى طفل ينتمي إلى الدم، الذي يسمى "نقص وجذل جلد المغذية".

• وجذل إدراك أو لدى طفل مشكلاً في نسب صياغ الدم التي تسمى "ميتهوموغوبيننة الدم".

• لا يجوز استخدام كريم إملاً 5% في المناطق التي يزور بها طفح جلدي، شفوق.

وُجدت إحدى هذه المشاكل، تخفق مع الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

• كثت تعانى أنت أو كان طفلك عانى من حالة تهيج في الجلد التي تسمى "إيقاع الكلم في الجلد الموضعية" (انظر أيضاً الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

ردو تتناول أدوية معينة لاصطربات نظم القلب (مضادات اضطرابات الذهن)، مثل أموبوراين. في هذه الحالة سيقوم

الطبب برقابة وظيفة قلبك.

عف امكانية الإمتصاص المتزايد في الجلد الملوحق مؤخراً، من مهمن اتباع الدوائي الصيغة به، مناطق الجلد وهذه إيقاع الكلم المدهون على سطح الجلد.

يجيب تجنب دخول كريم إملاً 5% إلى داخل المينا، وذلك لأن هذا يمكن أن

يعيش في العين حتى تختفي.

لا يجوز دخول كريم إملاً 5% إلى طبلة آدنضررة.

عندما تستعمل كريم إملاً 5% قبل أن يتم تطبيقه على سطح الجلد، يجب تجنب دخوله إلى العين حتى تختفي.

يُسبب تهيجاً. إذا دخل كريم إملاً 5% من طريق الخطأ إلى العين، يجب شطف العين بالماء حتى تختفي.

العنين قد تؤثر على الفور جيداً بما في ذلك الماء.

كن حذراً من دخول أي شيء في العين حتى تختفي.

لا يجوز دخول كريم إملاً 5% إلى طبلة آدنضررة.

المثال لفاصيل، يجب عليك الانتباه، وذلك لأن هذا يمكن أن

يعيش في العين حتى تختفي.

يُسبب تهيجاً. إذا دخل كريم إملاً 5% إلى داخل العينين، يجب شطف العينين بالماء حتى تختفي.

العنين قد تؤثر على الفور جيداً بما في ذلك الماء.

كن حذراً من دخول أي شيء في العين حتى تختفي.

لا يجوز دخول كريم إملاً 5% إلى طبلة آدنضررة.

مقدار مخصوص من الماء حتى تختفي.

أدوية تستعمل لعلاج الطلق، التي تسمى "سولوفاندينات" وفينوباربital.

• أدوية تستعمل لعلاج الطلق، التي تسمى "سولوفاندينات" وفينوباربital.

• مقدار مخصوص من الماء حتى تختفي.

• أدوية لعلاج عدم انتظام القلب، مثل أموبوراين.

• بيميتيدين أو ساكيات بيتا، والتي قد تسبب ارتفاعاً في نسب الليدووكائين في الدم، ليس لهذا التفاعل بين الأدوية أهمية سريرية في علاج قصور الأداء مع كريم إملاً 5% في المقابل الدوائية الموصى بها.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:
إذا كنت تستلم، أو إذا استعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية

بدون وصفة طبية، إضافات غذائية وأدوية باتباعية، احتج إلى الطبيب أو الصيدلي

عند ذلك، وذلك لأن كريم إملاً 5% يمكن أن يؤثر على كفاءة عمل أدوية معينة

ويعض الأدوية يمكن أن تؤثر على كريم إملاً 5%.

احتج إلى الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت مستعمل.

• أدوية تستعمل لعلاج الطلق، التي تسمى "سولوفاندينات" وفينوباربital.

• مقدار مخصوص من الماء حتى تختفي.

• أدوية لعلاج عدم انتظام القلب، مثل أموبوراين.

• بيميتيدين أو ساكيات بيتا، والتي قد تسبب ارتفاعاً في نسب الليدووكائين في الدم، ليس لهذا التفاعل بين الأدوية أهمية سريرية في علاج قصور الأداء مع كريم إملاً 5% في المقابل الدوائية الموصى بها.

السيادة واستعمال الماكنتات:
لا يوجد لكمي إملاً 5% تأثير على الإطلاق أو له تأثير ضئيل على القدرة على

السيادة واستعمال الماكنتات بعد استعمال مقدار دوائي موصى به.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوى كريم إملاً 5% على macrogolglycerol hydroxystearate (مايكروجليسيل هيدروستيرات) الذي قد يسبب ردود فعل جدية.

يجيد دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضار من

الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة

العلاج بالمستحضر.

• إذا كنت تقاسى من إحدى الأعراض التالية خلال استعمال كريم إملاً 5%، توقف

عن استخدامه وأوقفينه على طبيب أو الصيدلي عن أسباب وفاتك.

• ردود فعل تحسسي، حيث أنها في حالات نادرة قد تؤدي إلى صدمة تلقائية (نفخ)

في الجلد، إنفاخ، خسونة، صعوبات في التنفس وإغماء خلال علاج الجلد.

• ميتيهوموغوبيننة الدم (مشكلة في الدم)، حيث أنها في حالات نادرة قد تتطور

خلال علاج الجلد، وقد تسبب علامات وأعراض تقصّ تأسف الدم (تبس

منخفضة وشدة للالكتسين في الدم)، لوحظت حالة ميتيهوموغوبيننة الدم

بوئية أعلى، في أوّلات تقاريرها بما يتعلّق بفقط المقدار الدوائي، لدى الرضيع

الذين ولدوا ولو ولد الرضع عن عمر 0 حتى 12 شهراً.

رد فعل طيفي (شحوب أو إحرار الجلد، إنفاخ طيفي، شعور بحرق أوّلى أو ثانية) قد يحدث في منطقة دهن كريم إملاً 5%. هذه هي ردود فعل سلية للكريم وللمواد المختبرة وتختلف في غضون وقت قصير بدون الحاجة لإستعمال سائل إضافي.

إذا كنت تقاسى من تأثيرات مزعجة أو شديدة عندما تستعمل كريم إملاً 5%، يجب دهن طبقة سميكه من الكريم، التقطيع بخطوات متساوية، مثل التأليلون اللاصق، والإنتظار 5-15 ساعات.

ما يقارب 1.5-2 غرام لكل مساحة جلد ذات 10 سم². يجب دهن طبقة سميكه للإجراءات الجراحية التي تتطلب تدبيراً موسيماً أكثر عما:

ما يقارب 1.5-2 غرام لكل مساحة جلد ذات 8 سم². يجب دهن طبقة سميكه من الكريم، التقطيع بخطوات متساوية، مثل التأليلون اللاصق، والإنتظار 2-5 ساعات.

المقادير الدوائية المختبرة: يمكن دهن حتى 60 غرام في 24 ساعة (300 تبويبين ذات 30 غرام). لا يجوز إبقاء الكريم على المنطقة المعلجة لمدة تزيد عن 5 ساعات.

في منطقة الجلد التي تم حلتها مؤخراً، لا يجوز دهن كريم إملاً 5% على مساحة

أكبر من 600 سم² (30 x 20 سم²). يجب دهن 1-2 غرام لكل مساحة جلد

قرها 10 سم². يجب دهن طبقة سميكه من الكريم على سطح التقرير، لكن ليس

المتبقي في الأدوية. زمن الإنقاء: 30 دقيقة على الأقل، في حالات فيها الانسجة

صعبة الاختراق بشكل خاص، يمكن تمديد زمن الإنقاء لعدّ أقصى 60 دقيقة.

إزالة التقرير يجب أن تبدأ خلال 10 دقائق بعد إزالة الكريم، يمكن

أيام 5% حتى ملأ علاجاً على غضونه شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

أيام 5% على دهن بعد ردور الفعل الموضعى.

أيام 5% على دهن بعد إزالة الأدوية بعد انتهاء العلاج بخطوة بخطوة.

أعراض جانبية شائعة تظهر في 10-15% من المستعملين من بين 100):

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شحوب، إحرار، إنفاخ) في المكان المعلج

أثناء علاج الجلد، خاصة الأعضاء التناسلية أو القرحة في الرجلين.

• شعور بعمر طيفي أولي، تهيج أو دفع في المنطقة المعلجة أثناء علاج

الأعضاء التناسلية أو القرحة في الرجلين.

• شعور بحرق طيفي أولي، تهيج أو دفع في المكان المعلج أثناء علاج الجلد.

• أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 1-10% من المستعملين من بين 1,000):

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين حتى 12 شهراً - شهرين دون إختلاط في التأثير

على الأعضاء التناسلية (الرجال فقط) - قبل حفظ المقدار الموضعى.

• رد فعل جلدي موضعى عابرة (شهرين