

# פרודאודופה (PRODUODOPA®)

(פוסלבודופה/פוסקרבידופה)  
לטיפול במחלת פרקינסון בשלב מתקדם

מדריך זה למטופל מפרט מידע בטיחות חשוב שכדאי לדעת.

אנא ודא שמדריך זה יהיה בהישג ידך בעת  
ההכנה לשימוש בתרופה זו.

abbvie

# מדוע כדאי לקרוא את המדריך למטופל?

פרודוזאדופה (PRODUODOPA®) היא תרופה לטיפול בתסמינים של מחלת פרקינסון בשלב מתקדם.

משתמשים בה כאשר תרופות אחרות כבר אינן פועלות כפי שפעלו בעבר לטיפול בתסמיני המחלה.

תרופה זו ניתנת מתחת לעור באמצעות צינורית פלסטיק קטנה (קנולה), באזור שסביב הטבור. אזור זה הוא מקום העירוי.

התרופה ניתנת בעירווי באמצעות צינורית זו באופן רציף במשך 24 שעות ביממה.

**חלק מהאנשים המשתמשים בתרופה זו עלולים לחוות בעיות בעור סביב המקום שבו הקנולה נכנסת לגוף.**

בעיות אלו בעור יכולות לכלול את המצבים הבאים:

- **זיהום בעור.**  
זיהום בעור יכול להחמיר כאשר הוא נכנס לדם ומתפשט בכל הגוף. מצב זה נקרא אלח דם (sepsis).
- **תגובה בעור.** במצב זה יופיעו גירוי בעור / דלקת בעור.

# מדריך זה למטופל יעזור לך ולמטפל שלך ללמוד על הדברים הבאים:

איך לבחור את מקום העירווי



איך לזהות זיהום במקום העירווי, או תגובה במקום העירווי



מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הסיכוי לזיהום במקום העירווי, או לתגובה במקום העירווי



מה עליך לעשות אם יהיו לך זיהום במקום העירווי, או תגובה במקום העירווי



היכן ניתן למצוא מידע נוסף על התרופה שלך



# איך לבחור את מקום העירו



חשוב לשנות את מקום העירו בקביעות. כך תוכל לשמור על בריאות העור ולהבטיח מתן תקין של התרופה.

מקום העירו שלך יכול להיות הבטן, אלא אם הרופא שלך ינחה אותך לבחור מקום אחר. יש לוודא שהמקום הנבחר נמצא במרחק של לפחות 5 ס"מ (אורך הזרת בקירוב) מהטבור שלך.

- יש להימנע מבחירת אזור קו החגורה כיוון שאזור זה עלול להיות מגורה מהמגע ההדוק של החגורה על העור.
- יש להימנע מאזורים בהם העור מצולק, נוקשה, או שיש בו סימני מתיחה
- הימנע מאזורים עם קפלים או קמטים בעור במקומות שבהם יש קיפול רב באופן טבעי.
- יש להשתמש בערכת עירו (קנולה/צינוריות) חדשה, בכל פעם שתשנה את מקום העירו.


החלף את מקום העירו כל 3 ימים, או קודם, בהתאם לשינויים בעור שלך (כגון אדמומיות, נפיחות וכאב).

מקום העירו החדש צריך להיות במרחק של לפחות 2.5 ס"מ (מרווח של רוחב שתי אצבעות לערך) מהמקום הקודם בו השתמשת.

לאחר שהשתמשת במקום עירו מסוים, אין לחזור אליו במשך 12 ימים. זה יאפשר לעור להחלים באופן מלא.

תוכל להיעזר בכמה דרכים על מנת לזכור מהם אזורי העירוי שכבר השתמשת בהם לאחרונה. דרך אחת היא לדמיין את הבטן שלך בצורת כוכב. ניתן לעקוב אחר הצורה באמצעות מספרים, וכך תאפשר למקום ההזרקה הקודם להחלים בזמן שתבחר מקום הזרקה חדש מרוחק.

יש לרשום את התאריך ואת המקום של העירוי שלך לצורך מעקב.




# איך לזהות זיהום במקום העירווי או תגובה במקום העירווי



חפש שינויים בעור במקום החדרת הקנולה לעור. יתכן שהשינויים בעור יהיו מלווים בחום וייתכן שלא, ויכללו את התסמינים הבאים:

- אדמומיות
- עור חם למגע
- נפיחות
- רגישות/כאב
- שינויים בצבע העור בעת לחיצה על העור



# מה תוכל לעשות כדי להפחית את הסיכוי לזיהום במקום העירוני, או לתגובה במקום העירוני



ייתכן שתחווה זיהום במקום העירוני, או תגובה במקום העירוני. להלן נושאים שיש להתייחס אליהם בעת הטיפול בעירוני.

יש לשמור על ניקיון וחיטוי מקום העירוני וערכת העירוני בעת הכנת העירוני.



יש לבחור באזור מואר היטב, ובמשטח נקי וישר (כגון שולחן) לצורך הכנת העירוני.



יש להקפיד שקצה המזרק, מתאם הבקבוקון, הצינורית או המחבר למקום העירוני, לא יהיו במגע עם משטח כלשהו שאינו נקי.



תמיד יש לשטוף ידיים עם מים וסבון, ולייבשן עם מגבת נייר. לאחר מכן, אין לגעת באף חפץ או דבר שאינו נקי.



לאחר בחירת מקום העירוני, יש לנגב את העור עם ספוגית או מגבון אלכוהול. יש לנגב את העור בכיוון אחד כדי שלא תזהם את האזור לאחר ניקיונו. יש לאפשר לאזור להתייבש במשך דקה לפחות.



יש להשליך בזהירות כל חומר שהשתמש בו, ושעלול היה להזדהם.



**יש לשנות את מקום העירוני כל 3 ימים, או מוקדם יותר, בהתאם לשינויים בעור שלך (כגון אדמומיות, נפיחות וכאב)**

יש לשמור תמיד על מרחק של 2.5 ס"מ (מרווח ברוחב שתי אצבעות לערך) ממקום העירוני הקודם שבו השתמשת.



כאשר תשתמש במקום עירוני חדש, אין לבחור את אותו מקום עירוני במשך 12 ימים. כך העור יוכל להחלים באופן מלא.



יש לגזור שערות סביב מקום העירוני באמצעות מספריים. פעולה זו תסייע למדבקת הקנולה להידבק לעור. אם עליך לגלח את העור, יש לחכות יום אחד לפני בחירת מקום עירוני זה.



יש להשתמש תמיד בקנולה חדשה ובצינוריות חדשות בעת מתן העירוני במקום חדש.



יש ללבוש בגדים נוחים שלא יגרו את העור במקום העירוני.



## מה מומלץ לעשות אם יש לך זיהום במקום העירוני או תגובה במקום העירוני



יש לשנות את מקום העירוני – אל תחכה שיחלפו 3 ימים. יש להתקשר לרופא, לאחות, או לרוקח שלך אם תחוזה את התסמינים הבאים:

- אדמומיות
- עור חם למגע
- נפיחות
- רגישות/כאב
- שינויים בצבע העור בעת לחיצה על העור

אין להשתמש שוב במקום עירוני שהזדהם במשך 12 ימים לפחות, או עד שיחלים.

## היכן ניתן למצוא מידע נוסף על התרופה שלך



למידע נוסף על התרופה שלך, אנא עיין בעלון לצרכן ובהוראות לשימוש המצורפים לתרופה (פוסלבודופה/פוסקרבידופה).

לצורך דיווח על תופעות לוואי כלשהן מהשימוש בתרופה, אנא צור קשר עם הרופא, האחות או הרוקח שלך. תוכל לפנות גם לחברת AbbVie (באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [pvisrael@abbvie.com](mailto:pvisrael@abbvie.com)) כדי לדווח על תופעות לוואי מהשימוש בתרופה.

מדריך זה למטופל ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בחודש יולי 2023, גרסה 1.0.