

עלון לצריך לפני תקנות הרווחחים (תקנירים) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

נבלביןTM 20 מ"ג כמוסה רכה

החומר הפעיל וכמותו:

כל כמוסה רכה מכילה: וינורלבין (כטרטרט) 20
מ"ג
Vinorelbine (as tartrate) 30 mg

מ"ג
Vinorelbine (as tartrate) 20 mg

לרשימת החומרים הבלטי פיעלים ואלרגניים בתכשיר, أنا ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם **תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוק.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

נבלבין מיועדת לטיפול בסרטן ריאות (cell small-non), טיפול בסרטן השד במצב מתקדם.

קבוצה תרפואיית: נבלבין שייכת למשפחת התרופות לטיפול בסרטן המופקות מצמח הוינקה (וינקהALK). אלקלואידים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל וינורלבין, או לכל חומר אחר משפחת התרופות לטרטט הנקרואת וינקהALK.
- אתה רגיש (אלרגי) לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה נבלבין ("מידע נוסף" أنا ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
- הינך בהריון או חושבת שהינך בהריון.
- את מניקה.
- אתה סובל ממחלתCBD חמורה.
- עברת ניטוח בקיבה או בעיני הדק או אם הנrk סובל מבעיות במעי המשפיעות על ספייגת האוכל. זה עלול להשפיע על אופן ספיגת הנבלבין בגוף.
- ספירת תא הדם הלבנים (לויוקוציטים, ניטרופילים) הינה נמוכה, או במקרה של זיהום חמור קיים או שאירוע עד שבועיים לפני מועד ליקיחת התרופה.
- ספירת טסיות הדם נמוכה (תרומובוציטופניה).
- קיבלת לאחרונה או שבכונתך לקבל חיסון נגד קדחת צהובה (Yellow Fever).
- אתהzekוק לטיפול ארוך טווח בחמצן.
- בכל מקרה של ספק, היוזץ ברופא או ברוקח.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בנבלבין, ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מהתקף לב או מכאבים עזים בחזה.
- יכולת לבצע פעילויות יומיומיות פחתה מאוד.
- יש לך בעיות בכבד או עברת הקרנות (דיותרפיה) כאשר אחר הטיפול כלל את הכבד.
- הרופא שלך אמר לך כי הנrk סובל מאין סבירות לסוכרים מסוימים; היוזץ ברופא שלך לפני נטילת התרופה חזן.
- הנrk מגלה סימנים של זיהום (כגון חום, צמרמות, כאבי מפרקים, שיעול).
- אתה נוטל או נטلت לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם.
- בכונתך לקבל חיסון או קיבלת חיסון לאחרונה.

ילדים ומתבגרים

הכמוסות אינן מומלצות לטיפול ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

בדיקות ומעקב

יש לעורר בדיקות ספירת תאי דם לפני ובמהלך תקופת הטיפול בנבלבן, על מנת לוודא שבתו עברך ליטול את התוּרָפָה. אם תוצאות בדיקות הדם אינן תקין, יתכן שהטיפול יידחה ויהי צריך ביצוע בדיקות נוספות עד שתוצאות בדיקות הדם שלך יראו ערכיים תקין.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות

אם אתה לוקה, או אם לך חת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח. שילוב נבלבן יחד עם תרופות אחרות, המשפיעות על מה העצם, עלול להחמיר תופעות לוואי מסוימות. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה:

על רופא לשים לך אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- תרופות לדילול הדם (נוגדי קריישה)
- תרופה לטיפול באפלפסיה בשם פניטואין
- תרופות לטיפול בחיזום פטריאתי כגון איטראקונזול וקטוקונזול
- תרופה לטיפול בסרטן בשם מיטומיצין C
- תרופות המדכאות את מערכת החיסון כגון ציקלוספורין וטאקROLימוס חיסונים רבים (חיסון מוחלש ח') לא מומלצים במהלך הטיפול. יש לידע את הרופא שלך אם אתה מדרש לקבל חיסונים.

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלווע את הכמוסה של נבלבן בשלמותה עם מים, אין ללעוס או למצוץ את הכמוסה. מומלץ ליטול את התוּרָפָה ביחד עם ארוחה קלה. אין לשות משקה חם עם התוּרָפָה, כי הוא עלול לגרום להמסה מהירה מדי של הכמוסה.

הריוון, הנקה ופוריות

פוריות

פוריות בגברים: אם הנך מטופל בנבלבן, המליצה עבורך היא שלא להכנס נשים להריוון במהלך הטיפול ובמשך 4 חודשים אחרי נטילת הכמוסה האחרונה. עליך להתייעץ עם הרופא שלך בנוגע לשימור זרע לפני תחילת הטיפול מכיוון שנבלבן יכולה להשפיע על הפוריות שלך. עליך להשתמש באמצעות מניעה ייעלים במהלך הטיפול ובמשך 4 חודשים לאחר סיום הטיפול.

נשים בעלות פוטנציאל להרות: אם הנך איש בעל פוטנציאל להרות, עליך להשתמש באמצעות מנעה ייעלים בתקופת הטיפול ובמשך 7 חודשים מסיום הטיפול.

הריוון

אין ליטול נבלבן אם הנך בהריוון או שאת חושבת כי הנך בהריוון. אם הנך חיית להתחילה את הטיפול בנבלבן והנך בהריוון, או במקרה של כניסה להריוון בתקופת הטיפול בתוּרָפָה, אל תפסיק ליטול את התוּרָפָה. יש לפנות מיד לרופא ולשאול אותו על סיכונים אפשריים לעובר.

הנקה

אין ליטול נבלבן אם הנך מניקה. יש להפסיק את ההנקה אם נחוץ טיפול בתוּרָפָה נבלבן. יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופות.

נהיגה ושימוש במכוונות

לא סביר כי הטיפול בנבלבן ישפייע על יכולת נהוג או להפעיל מכוניות. אולם חלק מתופעות הלוואי האפשריות של נבלבן עלולות להשפיע על יכולת נהוג או להפעיל מכוניות. לפירוט ראה סעיף 4 "תופעות לוואי". לפיכך, מומלץ לא נהוג אם הנך חש לא טוב או אם הרופא שלך יעץ לך להימנע מנהיגה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התוּרָפָה

התרופה מכילה סורביטול, אלכוהול ונטרן.
אם הרופא אמר לך כי הנך סובל מאי סבלות לסתוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת התרופה.
נבלבן 20 מ"ג מכילה 5.36 מ"ג סורביטול בכל כמותה.
נבלבן 30 מ"ג מכילה 8.11 מ"ג סורביטול בכל כמותה.

נבלבן 20 מ"ג מכילה 5 מ"ג אלכוהול (אתנול) בכל כמותה.
נבלבן 30 מ"ג מכילה 7.5 מ"ג אלכוהול (אתנול) בכל כמותה.
כמות האלכוהול בכל כמותה של תרופה זו (נבלבן 20 מ"ג, נבלבן 30 מ"ג) שווה לפחות מ-1 מ"ל בירה או 1 מ"ל יין. לכמות האלכוהול המועטה בתרופה זו, לא יהיו השפעות ניכרות.

תרופה זו (נבלבן 20 מ"ג, נבלבן 30 מ"ג) מכילה לפחות מ-23 מ"ג נטרן בכמותה, ולפיכך נחשבת "נטולת נטרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

נבלבן צריכה להינתן תחת פיקוח רפואי של רופא מוסמך המנוסה בטיפול במחלת הסרטן.
התרופה מיועדת לנטילה דרך הפה.

יש להשתמש בתכשיר תמיד להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין
בטוח בונגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. לפניו ובמשך הטיפול בנבלבן, הרופא שלך יבודק את
ספירת תאי הדם שלך, על מנת לקבוע מתי קיבל את הטיפול ואיזו mana מתאימה לך. הרופא יורה לך
כמה כמותות ובאיזה חזק תצטרכ לך בחחת כל שבוע. זה יקבע בהתאם למשקל גופך ולגובהך.
רופאך יחשב את שטח הפנים של גוףך במטר רבוע (מ"ר). המנה השבועית המקובלת נלקחת במנה
אחד ותוחשב לפי 60 מ"ג למטר רבוע של שטח הפנים של גוףך עבור 3 המנות הראשונות של
الטיפול. לאחר המנה השלישית רופאך יחליט אם להעלות את המנה ולהשך את המנה לפי 80 מ"ג
למטר רבוע של שטח הפנים של גוףך. ככל מקרה, יתכן שרופאך ישנה את המנה של נבלבן.
במידה והן מקבלו מוקדם נבלבן עם תרופה אחרת לטיפול במצב הרופאי, רופאך יחליט מה תהיה
הmana המתאימה עבורך.
אין לעבר על המנה הכלולית של 160 מ"ג לשבוע.
אין לקחת נבלבן יותר מפעם אחת בשבוע.

תדירות מtan התרופה

נבלבן ניתנת פעם בשבוע בדרך כלל. תדירות המtan תיקבע על ידי רופאך.

התכשיר הינו ציטוטוקס.
אין לעבר על המנה המומלצת.

משך הטיפול

משך הטיפול יקבע על ידי רופאך.

אם אתה נוטל תרופה נגד בחילות/הקאות
נבלבן עלולה לגרום להקה: ראה סעיף 4 "תופעות לוואי". אם הרופא שלך רשם לך תרופה נגד
הקה/בחילה, יש ליטול תרופה זו בהתאם להוראות הרופא.
נטילת נבלבן עם ארוחה קלה עשויה להקל על תחושת הבחילה.

דרך מtan התרופה
לפניהם פתיחת הבליסטר (מגשית) המכיל את נבלבן, ודא שהכמות לא נזקקה, שכן הנוזל שבתוכו
הכמות גורם לגידוי ועלול לגרום לנזק בוגע עם העור, העיניים או הריריות. אם נוצר מגע, שטוף את
האזור הנגע מיידית וביסודיות עם מים.

אין לבלווע כמוסה שניזוקה: יש להחזירה לרופא שלך או לרוקח.

הוראות לפתיחת אריזת הבליסטר (מגשית):

- יש לגזר את הבליסטר בעזרת מספריים לאורך קו הסימן (קו מקווקו שחור).
- יש לקלף את כיסוי הפלסטיκ הרך.
- יש לדחוף את הכמהה דרך רדייד האלומיניום.

אופן השימוש בתרופה

- יש לבלוע את הכמהה בשלמותה עם מים, רצוי ליטול את התרופה עם ארוחה קלה. אין לשות משקה חם עם התרופה, כי הוא עלול לגרום להמסה מהירה מדי של הכמהה.
- אין ללעוס או למצוץ את הכמהה.
- אם לעסת או מצצת את הכמהה בטיעות, יש לשטוף את הפה ביסודות עם מים ולפנות מיד לרופא.
- אם הקאתה בתוך מספר שעות מלכחת התרופה, צור קשר עם הרופא שלו; אין לחזור על נטילת אותה mana.

אם נטלת בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטلت יותר נבלבן מהמנה שהרופא רשם, יש לפנות מיידית לרופא. הרופא שלך והרופא מבצעים מעקב ופיקוח צמוד אחר מנת הנבלבן הניתנת לך, אולם גם אם קיבלת את המינון הנכון של הכימותרפי, הגוף עדיין עלול להגיב עם תסמינים חמורים. חילק מהתסמים עלולים להתפתח כתסמינים של זיהום (כגן חום, צמרמות, שיעול, כאבי מפרקים). עלולה להתפתח גם עצירות חמורה. אם מופיעים תסמינים חמורים אלו, יש לפנות לרופא מיד.

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אין לקחת מנת כפולה על מנת לפצות על המנה ששכחת. יש לפנות לרופא שלך שיקבע זמן חדש להקחת המנה. יש להתميد בטיפול כפי שהוא ממלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

חופאר יחליט מתי להפסיק את הטיפול. אולם, אם אתה רוצה להפסיק את הטיפול מוקדם יותר, عليك להתייעץ עם הרופא לגבי אפשרויות אחרות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעע** שהנр נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זזוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בנבלבן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם הנר חש באחד מהתסמים הבאים בזמן הטיפול בנבלבן:

- כאב בchnerה, קוצר נשימה והתעלפות, אשר יכולם להיות תסמינים של קרייש בכלי דם בריאות (אוטם ריאתי / תסחיף ריאתי).
- כאבי ראש, שינוי במצב המentalי אשר יכול להוביל לבלבול ותרדמת, עוויתות, ראייה מטושטשת ולחץ דם גבוה, אשר עלולים להיות סימן להפרעה נירולוגית כגון תסמנות אנטיפלופטיה אחוריית הפיכה.
- שיעול, חום וצמרמות אשר יכולים להיות סימנים לחזיותם חמור או זיהום כללי (ספטיסמיה) אשר יכול להיות חמור.
- עצירות חמורה המלווה בכאב בטן, ללא הטרוקנות במשך מספר ימים.
- סחרחות חמורה או סחרחות בעת קימה, סימן לירידה חמורה בלחץ הדם.
- כאב עד בחזה שאינו רגיל עבורי. התסמן עלול להיות בשל הפרעה בתפקוד הלב עקב זרימת דם בלתי מספקת, הנקרא התקף לב (לעתים עלול לגרום למומות).
- קושי בנשימה, פריחה מפושטת בכל הגוף, התנפחות העפעפים, השפטים או הגרון אשר עלולים להיות סימנים של תגובה אלרגית.

תופעות לוואי שכיחות מודג' (תופעות שטחיות ביותר משמשים אחד מעשרה זיהומיים באזוריים שונים; הפרעות במערכת העיכול; שלשול, עצירות, כאב בטן, בחילה והקאות; דלקת בפה; ירידה בספירת תאי דם אדומים העוללה לגרום לחיוורון, לחולשה או לקוצר נשימה; ירידה בספירת טסיות הדם העוללה להגביר סיכון לדימומים או לחבות; ירידה בספירת תאי הדם הלבנים, שהופכת אתך לחשוף יותר לזרימות; אובדן של תగובות רפלקס מסוימות, לעיתים שינוי בתוחנות המגע; נשירת שיער, בדרך כלל מתונה; עייפות; חום; תוחנות חוסר נוחות; ירידה במישקף, אובדן תיאבון

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שטחיות ב 10-1 מעתמשים מתוך 100)
קשהים בתיאום של תנועת שריריהם;
שינויים בראש;
קוצר נשימה, שיעול;
קשה במתן שתן; תס敏ים נוספים במערכת המין-שתן;
קשהamina;
כאב ראש; סחרחות; שינוי בתוחנות הטעם;
דלקת בלוע, קשה בבליעת מזון או נזלים;
תגבות בעור;
צמרמות;
עליה במישקף;
כאב במפרקים, כאב בלסת, כאב שרירים;
כאב בחולקי גוף שונים ובאזור הגידול;
לחץ דם גבוה;
הפרעות בכבד (תוצאות לא תקין של בדיקות כבד)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שטחיות ב 1-1 מעתמשים מתוך 1000)
אי ספיקת לב שעשויה להתבטא בקוצר נשימה וונפיחות בקריסולים, דפוקות לב לא סדרות;
chosor שליטה על שרירים העשויה להתבטא בהליכה לא תקינה, שינויים בדיבור ותונעות עיניים בלתי רגילות (אטקסיה)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)
זיהום בדם (אלח דם) המתבטא בתסמינים כגון חום גבוה והידרדרות במצב הבריאות הכללי;
התקף לב (אטם שריר הלב);
דימום במערכת העיכול;
ירידה בכמויות הנתרן בדם, ובחולק מהמקרים עלולה להיות כתוצאה מייצור יתר של הורמון הגורם לצבירה נזלים, ועשויו להתבטא בתסמינים כגון חולשה, התכווצות שרירים, עייפות, בלבול או חוסר הכרה (SIADH – תסמנת הפרשה לא תואמת של הורמון ADH)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעת לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>
www.Padagis.co.il

בנוסף, ניתן לדוח לחברת פאדג'יס באמצעות הכתובת הבאה:

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה והבליסטר (מגשית). תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקERR (2°C-8°C). יש לאחסן באזינה המקורית.
- אין להשליך תרופות למי השפכים או לפסולת הביתית. מסיבות בטיחותיות לצורך השמדה יש להחזיר לרופא או לרוקח כמוסות שלא נעשו בהן שימוש. נקיטת אמצעים אלו תעוזר לשמר על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Macrogol 400; Gelatine; Glycerol 85%; Purified water; Dry substance of ANIDRISORB 85/70 (sorbitol, sorbitan-1,4, superior polyols, mannitol); Ethanol anhydrous; Glycerol; Titanium dioxide E171; Yellow iron oxide E172 (in Navelbine 20mg); Red iron oxide E172 (in Navelbine 30mg); Triglycerides, Medium chain; Triglycerides Medium chain and Phosal 53 MCT (standardized phosphatidylcholine concentrate);

Edible printing ink: E120, Hypromellose, Propylene glycol.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

נבלבין 20 מ"ג: כמוסה רכה בצלב אDEM, המכילה נוזל בצלב צהוב בהיר עד כתום-צהוב, עליה מודפס N20 בצלב אDEM. האזינה היא של כמוסה אחת בבליסטר (מגשית).

נבלבין 30 מ"ג: כמוסה רכה בצלב ורוד, המכילה נוזל בצלב צהוב בהיר עד כתום-צהוב, עליה מודפס N30 בצלב אDEM. האזינה היא של כמוסה אחת בבליסטר (מגשית).

- בעל הרישום, היובאן וכתובתו: פאדג'יס ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.
- נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
נבלבין 20 מ"ג: 130-90-30910
נבלבין 30 מ"ג: 130-91-30911

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.