

עלון לצרкан לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוננקס תמייסה להזרקה תמייסה במזרק/עט מוכן להזרקה

רכיב:

כל מזרק/עט של 0.5 מ"ל מכיל 50 μg אינטרפרון בטא 1α
וגם Interferon beta-1a 30 μg

*ראה חומרים בלתי פעילים בסעיף 6 (מידע נוסף) בעلون זה

קרא בعين את העلون עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשותה לטיפול במקרים מסוימים. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

אוננקס תמייסה להזרקה אינו מיועד לשימוש ילדים ובתבגרים מתחת לגיל 16.

1. הקדמה:

הרכיב הפעיל באוננקס תמייסה להזרקה הינו חלבון שנקרו אינטרפרון בטא 1α. אינטרפרונים הם חומרים שנוצרים באופן טבעי בגוף האדם במטרה להגן עליו מפנים ומחלוות. החלבן שנמצא באוננקס תמייסה להזרקה עשוי מאותם רכיבים מהם מורכב אינטרפרון בטא 1α המופיע בגוף האדם.

למה מיועדת התרופה?

אוננקס תמייסה להזרקה מיועד לטיפול בסימפטומים של טרשת נפוצה התקפית. אוננקס תמייסה להזרקה יכול לשיער בהפחחת שכיחות ההתקפים ובاهattת ההשפעות המגבילות של המחלת. התרופה עובדת בצורה הטובה ביותר כאשר היא מוזרקת באותו שעה, אחת לשבע על בסיס קבוע. אל תפסיק את הטיפול באוננקס תמייסה להזרקה מבלתי להיעזץ תחילתה עם הנירולוג.

קבוצה רפואיית: אינטרפרוניים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיס (אלרגי) לאינטרפרון בטא או לכל אחד מרכיביו אוננקס תמייסה להזרקה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- הינך סובל מדיכאון חמור או שיש לך מחשבות אובדניות.

اذירות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:

יש להיעזץ עם רופא אם הינך סובל או סבלת בעבר מ:

- דיאוון או בעיות המשפיעות על מצב הרוח
- מחשבות אובדניות
- אפילפסיה או הפרעות פרכוס אחרות שלא נשלטו באמצעות טיפול רפואי
- בעיות חמורות בצלות או בכבד
- ספירה נמוכה של תאי דם לבנים או טסיות (עלול להගביר סיכון לדיזיומ, דימום או אנמיה)
- בעיות לבבות המבטאות בסימפטומים כגון כאב בחזה בעקבות פעילות (אנגינה), נפיחות בקרסולים, קוצר נשימה (Congestive Heart Failure) או בעיות בקצב הלב (אריתמיה).

- ג'רוי באזרור ההזרקה, שעלול להוביל לנזק לעור ולרקמות (נקראזה באטר הזרקה). כאשר אתה מוקן להזריק, עקוב בקפידה אחר ההוראות בסעיף 6 "כיצד להזריק אונונקס תמייסה להזרקה? בסוף עلون זה. זאת כדי להפחית את הסיכון לתגובה באזרור ההזרקה.

דוחה מיידית לרופא אם הינך חווה שינויים במצב הרוח, מחשבות אובדיניות, או תחושות לא רגילות של עצבות, חרדה או חוסר ערך.

דוחה לרופא אם הינך לוקה באחד מהמצבים המפורטים לעיל או אם הם החמירו בעת השימוש **באונקס תמייסה להזרקה.**

במהלך הטיפול עשויים להיווצר קרישי דם בכל דם קטנים. קרישי דם אלו עלולים להשפיע על קליותיך. תופעה זו עשויה להתרחש תוך שבועות ספורים ועד שניים ספורות לאחר התחלת הטיפול **באונקס תמייסה להזרקה**.

יתכן שהרופא ירצה שתעביר בדיקת לחץ דם, בדיקת דם (ספירת טסיות) ותפקוד הכליזות.

אם הינך נוטל כרגע תרופות העולות לגרום לך לכאב או שהinic שותה כמויות מופרזות של אלכוהול, יתכן שרופאך ירצה שתעביר בדיקות דם על מנת לוודא שהכבד שלך אכן מתפרק richtigות.

לפני בדיקת דם יש לדוח לרופא או ל佐ות הרפואי על **נטילת אונקס תמייסה להזרקה** משום שהתרופה עלולה להשפיע על תוצאות הבדיקה.

יש לעדכן את הוצאות הרפואי על **נטילת אונקס תמייסה להזרקה** באמ נרשותם עבור תרופות נוספות.

ילדים ומתבגרים:
אונקס תמייסה להזרקה אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16.

בדיקות ומעקב:
בתקופת הטיפול יתכן שתופנה גם לספירה מלאה ודיפרנציאלית של תאי דם לבנים, לבדיקה דם – כימיה כולל תפקודי כבד.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות:
אם אתה לוקח או אם **לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק**. במיוחד אם אתה לוקח:

- **תרופות לטיפול באפילפסיה או בדיכאון.**

שימוש בתרופה וזמן:
הטיפול **באונקס תמייסה להזרקה** אינו מושפע מאוכל או ממועד האכילה.

הירין והנקה:
אם אתה בהירין או עשויה להיכנס להירין או מתכונת להיכנס להירין, היועצץ עם הרופא או הרוקח לפני **נטילת התרופה**. לא צפויות להיות השפעות מיוחדות על הלוד היונק. ניתן **להשתמש באונקס תמייסה להזרקה** במהלך ההנקה.

נהיגה ושימוש במכונות:

אם הינך חש סחרחוות, אל ת נהג. **אונקס תמייסה להזרקה** עלול לגרום לשחרחוות באנשים מסוימים.
אם אתה חווה תגובה מסווג זה או תגובה אחרת שעולמה להשפיע על יכולותיך, אל ת נהג או **תפעיל מכונות**.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה:
אונקס תמייסה להזרקה הינו למעשה 'נטולת נתן'. **אונקס תמייסה להזרקה** מכיל פחות מ-23 מ"ג (1 מילימול) נתן בכל מנת שבועית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש **להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרפואי**.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנסיבות מינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל עבר מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 16 הינו דרישה אחת של אונקоз תמייסה להזרקה, פעם בשבועו.
- אין לעבר על המנה המומלצת.
- מומלץ להשתמש באונקוז תמייסה להזרקה באותו יום בשבוע ובאותה שעה.
- הרופא/האחות עשויים להעלוות בהדרגה את מינון האונקוז תמייסה להזרקה בתחילת הטיפול, על מנת לסייע בהפחחת סימפטומים דמיי שפעת.
- לא לשימוש בילדים - אין להשתמש בתרופת ילדים מתחת לגיל 16.
- **הזרקה עצמית** – אתה יכול להזריק לעצמך אונקוז תמייסה להזרקה ללא עזרה רפואי אם הוכשרת לכך. ההוראות להזרקה עצמית מצוויות בסוף עליון זה (ראה סעיף 6).
- אם הינך מתקשה בהליך ההזרקה, פנה לרופא והיוועץ עמו بما תוכל להסתייע.

משך השימוש:

הרופא ינחה אותך lagiי משך הטיפול הדרוש לך בתroppה זו. חשוב להמשיך להשתמש באונקוז תמייסה להזרקה באופן סדר. אין לבצע שינויים כלשהם אלא בהנחיית הרופא.

אם הזרקת בטעות מינון יתר – יש להשתמש במנת אחת של אונקוז תמייסה להזרקה פעם בשבועו. אם השתמשת ביוטר מזרקה אחת בתוך תקופה של שלושה ימים, צור קשר באופן מיידי עם הרופא או הרוקח. אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלILD מין התroppה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התroppה איתך.

אם שכחת הזרקה שבועית של אונקוז תמייסה להזרקה – אם החמצת את ההזרקה השבועית, הזרק מנה בהקדם האפשרי והמתן שבוע לפני הזרקה נוספת של התroppה. מעטה ולהלאה המשך להזריק באופן שבועי ביום החדש.

אל תשתמש במנת כפולה על מנת לפצות על ההזרקה שהוחמזה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתroppה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח. אם אתה מפסיק את נטילת התroppה השפעתה המיטיביה תפוג. טיפול לא רציף עלול לגרום לאו קבלת התוצאה הרצויה. אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תroppה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתroppה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תroppה, השימוש באונקוז תמייסה להזרקה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו; יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא, אם הינך חווה אחת מהתופעות הבאות שיכולה להעיד על תגונה אלרגית:

- התנפחות בפנים, שפתיים או לשון
- כאים בנשימה
- פריחה

פנה לרופא מיידית. אל תשתמש במנת נוספת של אונקוז תמייסה להזרקה עד שתיוועץ ברופא.

יש להיוועץ ברופא באופן מיידי אם הינך חשים:

- **תסמיינים של דיכאון – עצובות לא מוסברת, חרדה או תחושת חוסר ערך.**
- **בעיות בכבד – הצהבה של העור או של לבון העין (צהבת), גירוד בכל הגוף, בחילה, הקאה, שטפי דם מחבלים קלות בעור. סימפטומים אלו עלולים להציג עלייה אפשרית בכבד.**

תופעות לוואי נוספות:

טופעות לוויאי שכיחות מודד (מופיעות ביוטר משתמש אחד מעשרה)

- סימפטומים דמיי שפעת: כאב ראש, כאבי שרירים, צמרמות או חום.
 - סימפטומים אלו אינם שפעת אמיתית. הם נפוצים יותר בתחילת הטיפול באונקוז תמייה להזרקה. כדי להימנע מהופעתם הוצאות הרפואית עשוי להעלות את מינון התרופה באופן הדרגתי בהתאם לטיפול. בהמשך סימפטומים אלו ילכו ויפחתו.
 - כאב ראש.

דרכי להתמודדות עם סימפטומים דמיי שפעת:

1. להזירק את התרופה לפני השינה.
 2. לקחת פראצטמול או איבופורון כחץ שעה לפני הזרקת התרופה ולהמשיך לקחת במהלך היום. יש להיוועץ ברופא או הרוקח לגבי המינון המתאים.
 3. אם יש לך חום, הרבה בשתיות מים למניעת התקibusות.

טופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100)

אובדן תיאבון, חולשה ועיפות, קשיים בשינה, דיכאון, הסמקה, אף "דולף", שלשול, בחילות, הקאות, חוסר תחושה או עקצוץ בעור, פריחה, שטפי דם בעור, הצעה מוגברת, הצעות לילה, כאבים בשרירים/
מפרקים/רגליים/צואר, התכווצויות שרירים, נזקנות שרירים ומפרקים, כאב ואדמנויות במקום ההזרקה.
שוניים בבדיקה דם, שיכולים להתבטא בסימפטומים של עייפות, זיהומים חזוריים, חבללה או דימום.

תופעות לוואי שאין שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)
נשירת שיער, שינויים במוחזר החודשי, תחושת שריפה במקום ההזרקה.

טופעות לוגאי נדירות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000)

- בנסיבות מוגברת של חבות, דימום, חום, חולשה חמומה, כאב ראש או סחרחות עשויה לקרות כתוצאה מקישי דם בכלי הדם הקטנים שפגעו בклיות (thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) (or haemolytic uremic syndrome).

תופעות לוואי ששייכותן אינה ידועה (תופעות שלא ידועות טרם נקבעו)

- תחת פעילות או פעילות יתר של בלוטת התריס
 - עצבנות יתר או חרדה, אי-יציבות רגשית, מחשבות לא הגיוניות או היזיות, בלבול או מחשבות אובדןיות
 - עמעום חשובים סחרחרת עוויות ומיגראנה
 - פעימות לב מואצות או אי סדרות או בעיות לבביות המתבטאות בירידה ביכולת להתעמל, אי-יכולת לשכב פרקן במיטה, קוצר נשימה או עקבים נפוחים
 - בעיות כבד, כפי שתוארו לעיל
 - סרףדת או פריחה הנראית כמו שלפוחיות, גרוד, החמרה של פסורייזיס
 - נפיחות או דימום במקום ההזרקה, הרס רקמות (נקרזה) או כאב חזה אחרי ההזרקה
 - עליה או ירידת במשקל
 - שניים בבדיקות מעבדה כולל תפוקדי כבד
 - יתר לחץ דם עורקי ריאתי (מחלה של היצרות חמורה בכל הדם בריאות, כתוצאה מלחץ דם גבוה בכל הדם המובילים דם מהלב אל הריאות). יתר לחץ דם עורקי ריאתי נצפה במהלך הטיפול בכמה נקודות זמן כולל מספר שנים לאחר תחילת טיפול בתכשירים המכילים אינטראפרון בטא.

השפעת פעולת הזרקה:

- זריקת האונקס **תמייסה להזקה** הראשונה תניתן לך ע"י איש צוות רפואי. הזירה עלולה לגרום לתחושת עליפון בפעם הראשונה. סביר להניח שזה לא יקרה שנית.
 - לאחר ההזרקה אתה עלול לחוש מתח או רפיען שרירים בדומה להתקף. זה קורה רק בזמן ההזרקה ויחלוף במהרה אחרת.

- אם הינך מבחין בගירוי או בעקבות עוריות לאחר ההזרקה, דוח לרופא.

אם הופיעה תופעת לואו, אם אחת מתופעות הלואו מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לואו שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואו למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לואו עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (il. www.health.gov) המפנה לטופס המופיע לדוח על תופעות לואו או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גביה האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסון בקירור (2°C-8°C): טווח בטמפרטורת זה שורר על פי רוב במקדר ביתי. יש להוציא את המזרק המוקן מקיור כחצי שעה לפני ההזרקה. אין להקפיו, יש להגן מאור. ניתן לאחסן עד שבוע בטמפרטורה של 30°C-15°C, לאחר מכן, אין להשתמש.

אין להשתמש באונקס תמייסה להזרקה אם הינך מבחין באחד מהסימנים הבאים:

- הנזול במזרק אינו שקוֹף ללא צבע או שינוי לראות בו חלקיים.
- המכסה הלבן של המזרק פתוח או נראה שנפתח.
- העט שבור.
- מגש פלסטייק האטום פגום או נפתח.

אין להשליך שרירות תכשיר לביב. שאל את הרוקח כיצד להפטר משאריות תכשיר שלא היה בהן שימוש.

6. מידע נוספת:

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Sodium acetate trihydrate, glacial acetic acid, arginine hydrochloride, polysorbate 20, water for injection.

- כיצד נראה תרופה ומה תוכן הארץזה:
 - **אונקס תמייסה להזרקה במזרק –** קופסה המכילה ארבע או שתים עשרה מנוק. כל מנת ארצה במגש פלסטייק נפרד הסגור הרטיטית ובתוכו מזרק מוקן לשימוש המכיל 0.5 מ"ל נוזל שקוֹף ומחתט בנפרד.
 - **אונקס תמייסה להזרקה בעט –** קופסה המכילה ארבע או שתים עשרה מנוק. כל מנת ארצה בנפרד ומיכלה עט, מחט וכיסוי לעט. העט מכיל מזרק מוקן לשימוש ובו 0.5 מ"ל נוזל שקוֹף. יתכן שלא כל הארץזות משוווקות.

- שם היצרן וכתובתו: Biogen (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Allé 1, DK-3400 Hillerød, Israel
- בעל הרישום וכתובתו: מדיסון פארמה בע"מ, השילוח 10, ת.ד 7090 פ"ת
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך מרץ 2016 ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך דצמבר 2019
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות : 00-33434-95-148
- לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.


כיצד להזריק אוננקס תמייסה להזרקה?

באפשרותך להזריק לעצמך את התרופה ורק אם עברת הדרכה נאותה בטכניית ההזרקה. ההסבירים המובאים בהמשך הינם בוגדר הדרכה, אם אין לך מרגיש בטוח אנא בדוק עם הרופא או הרוקח.

- **אוננקס תמייסה להזרקה** מיועד להזרקה תוך שרירית, למשל שריר הירך העליון. הזרקה לישבן אינה מומלצת.
- מומלץ להחליף את אתר ההזרקה בכל שבוע על מנת להפחית סיכון לגירוי של העור או השפיר.
- הימנע מהזריק בשטхи עור פגועים, מגורדים או מזוהמים או באזורי פצעים פתוחים.

אוננקס תמייסה להזרקה בمزרק

Contents of the plastic tray



שלב הכנה מוקדם

1. **הוצא את המגש מתוך הקופסה.**
בדוק את תאריך התפוגה שעל המגש עצמו, אין להשתמש אם פג.
משורך את הכיסוי ובודק שהבליסטר מכיל:
 - מזרק אחד
 - מחט ההזרקה אחת
2. השאיר את המזרק מחוץ למקרר חצי שעה.
ההזרקה נוחה יותר וכך מאשר להזריק ישר מהמקרר.
3. רחץ את ידיך היטב עם מים וובן ויבש אותן.
4. הנק ספוגיות אלכוהול ופולסטרים (אין מסופקים בערכה) אם הינך זקוק להם. מצא משטח נקי וקשייח להניח על גביו את הפריטים הדרושים להזרקה. הניח את המגש על המשטח.

הכנה להזרקה


1. בדיקת הנוזל שבمزרק – הנוזל צריך להיות שקוף. אין להשתמש אם התמייסה עכורה, איינה שקופת או מכילה חלקיקים.	
2. הסרת מכסה המזרק הלבן – ודא שהמכסה שלם ואין עדות שנפתח. אם נראה שהמכסה נפתח אל תשתחש במזרק. החזק את המזרק כך שהמכסה הלבן פונה למעלה. עקב את המכסה בחווית של 90 מעלות עד לניטוק. אל תיגע בנקודות החיבור, אל תלחץ על הבוכנה.	
3. חיבור המחט – פתח את המחט על מנת לחשוף את נקודות החיבור. השאר את המכסה על המחט. לחץ את המכסה על המזרק, סובב עם כיוון השעון עד לנעילה. טיפ: ודא שהמחט מחוברת בחזקה למזרק אחרת היא עלולה לדלוף. cut משוך את מכסה המחט. אל תסובב אותו. טיפ: אם תסובב את מכסה המחט כדי להסיר אותו אתה עלול בטעות להסיר גם את המחט.	

מתן ההזרקה

1. נקה את אזור ההזרקה (במידת הצורך השתמש במגבות אלכוהול), הנח לעור להתייבש. בעזרה יד אחת מתח את העור סביב את ההזרקה. הרפה את הגוף.



2. החדר את מחט ההזרקה בתנועת דקירה מהירה בזווית של 90 מעלות דרך העור ולתוך הגוף. יש להכניס את מחט ההזרקה פנימה לכל אורכה. לחץ באיטיות על הבוכנה להזרקת התמייה, עד להתרוקנות המזרק.



3. שמור על העור מתח בחזקה או לחץ על העור סביב את ההזרקה ומשורק את המחט החוצה. אם יש צורך להשתמש בספוגית אלכוהול, הצמד אחת לאות ההזרקה. במידת הצורך הדבק פלסטיר על מיקום ההזרקה.




4. לאחר שסימנת את ההזרקה, הנח את המחט, המזרק והבקבוקון מכל מתאים המועד לאחסון בטיחותי של מחטים משומשים. ניתן לשילך פסולות נייר וספוגיות משומשות לפחות אשפה רגילה.




אוננקס תמייה להזרקה בעט

תכולת האריזה: עט, מחט וכייסוי לעט



�ט לאחר הכנה להזרקה



עט לאחר ההזרקה



שלב הכנה מוקדם

1. הוציא אריזת עט אחת מתוכה הקופסה.
בדוק את תאריך התטוגה שעל אריזת העט, אין להשתמש אם פג.
בדוק שהאריזה מכילה:
- עט
- מחט
- כיסוי לעט
2. השאיר את העט מחוץ למקרר כחצי שעה. ההזרקה נוחה יותר כך מאשר להזריק ישר מהמקרר.
3. רחץ את ידייך היטב עם מים וסבון וייבש אותם.
4. הכנ ספוגיות אלכוהול ופוליטרים (אינם מסווגים בערכה) אם הינך זקוק להם. מצא משטח נקי וקשייח להניח על גביו את הפריטים הדרושים להזרקה.

הכנות העט

1. הסרת המכסה - וודא שהמכסה שלם ואין עדות שנפתח, אם נראה שהיא נפתחה אל תשתמש בעט.

- החזק את העט כך שהמכסה פונה למעלה.
- עקם את המכסה בזווית של 90 מעלות עד לניתוק.
- אל תיגע בקצהה הזקוכית.

טייפ: הניח את העט על השולחן לפני התחלת שלב 2.



2. חיבור המחט –

- העט מתוכנן לפעול יחד עם המחט המצורפת בלבד.
 - קלף את הרדייד שבתחתית CISIO המחט.
 - לחבר את המחט ע"י לחיצתה לתוך קצה הרצוקית של העט.
 - החזק את העט ישר עם המחט למעלה.
 - אל תסיר את CISIO המחט.
 - בעדינותות סובב את המחט עם כיוון השעון עד לנעילה חזקה,
 - אחרת המחט עלולה לדלוף. אם יש דליפה אתה עלול לא לקבל את כל המנה.
- טייפ: CISIO המחט ירד אוטומטית במהלך שלב 3.



3. הארכת מגן ההזרקה –

- אחוז בಗוף העט בחזקה עם יד אחת. כוון את CISIO המחט הרחק מפרק ומכל אדם אחר.
- השתמש ביד השנייה, בתנועהacha מהירה משורטט לעלה את מגן ההזרקה (האזור המחווץ) מעל המחט עד שהמחט מכוסה לגמרי.
- CISIO הפלסטייק של המחט יינתק ויפול.
- אל תלחץ על כפטור ההפעלה הכחול.



4. בדוק ש מגן ההזרקה מוארך לגמרי. תוכל לראות איזור מלכני קטן לצד חלונית התצוגה האובלית. זה מנגן בטיחות.




5. בדוק את הנוזל. הסתכל דרך חלונית התצוגה האובלית. הנוזל צריך להיות שקוף. אין להשתמש אם התמיisha עכורה, אינה שקופת או מכילה חלקיקים. זה נורמלי לראות בועות אויר.




מתן ההזרקה

1. נקה את אזור ההזרקה (במידת הצורך השתמש במגבות אלכוהול), הנח לעור להתיבש. בעזרת יד אחת מתח את העור סביב אחר ההזרקה. הרפה את השリー.



2. הצמדת העט לעור –

- החזק את העט מאונך לאזור ההזרקה ביד אחת. ודא שאתה יכול לראות את החלוניות של העט.
- לחץ את גוף העט אל העור על מנת לשחרר את מנגן הבטיחות.
- בדוק שמנגן הבטיחות משוחרר. המלבן הקטן יעלם. העט מוכן להזרקה.



3. הזרקת התוropa –

- לחץ על כפתור הפעלה הכחול עם האגדול על מנת להתחיל את ההזרקה. תשמעו 'קליק' המצין שתהlixir ההזרקה החל. אל תזיז את העט מן הגוף.
- המשך להחזיק את העט צמוד לעור וספור לפחות 10 שניות מלאות.
- לאחר 10 שניות משוך את העט בaczורה ישירה על מנת להוציא את המחט מאשרו ההזרקה.
- הפעל לחץ לאזורי ההזרקה למשך מספר שניות. אם יש דם, נגב את האזורי.



4. אישור ביצוע ההזרקה –

- בדוק את חلونיות התצוגה העגולה. הchlונית תהפוך לצהובה כאשר מנה מלאה הזרקה.
- אל תשתמש שוב בעט. זה חד פעמי בלבד.



5. הכנה להשלכה –

- הנח את CISI העט על משטח שטוח וקשייח.
- טיפ: אל תחזיק את CISI העט, אתה עלול להיפצע מהמחט.
- הכנס את העט ישירות לתוך CISI העט.
- לחץ בחזקה עד למשמע 'קליק' הנועל את המחט. יתכן שתצטרך להשתמש בשתי הידיים. ברגע שהעט נעול אין סכנת פציעה.
- השלים את הפסולת למכל המועד לכך.