

داساتينيب ساندوز® 70 ملغ أقراص مطالية	داساتينيب ساندوز® 50 ملغ أقراص مطالية	داساتينيب ساندوز® 20 ملغ أقراص مطالية
التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 70 ملغ dasatinib 70 mg	التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 50 ملغ dasatinib 50 mg	التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 20 ملغ dasatinib 20 mg
داساتينيب ساندوز® 140 ملغ أقراص مطالية	داساتينيب ساندوز® 100 ملغ أقراص مطالية	داساتينيب ساندوز® 100 ملغ أقراص مطالية
التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 140 ملغ dasatinib 140 mg	التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 100 ملغ dasatinib 100 mg	التركيب: يحتوي كل قرص على: داساتينيب 100 ملغ dasatinib 100 mg

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.  
داساتينيب ساندوز غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال ولدى المراهقين دون عمر 18 سنة. هناك تجربة محدودة بالنسبة لاستعمال داساتينيب لدى هذه الفئة من العمر.

## 1. لم أعد هذا الدواء؟

- أبيضاض الدم النقفي المزمن (CML) مع صبغي فيلادلفيا إيجابي في المرحلة المزمنة الذي تم تشخيصه مؤخرا.
- أبيضاض الدم النقفي المزمن (CML) في المرحلة المزمنة، المتسارعة أو الأرومية مع مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق، بما في ذلك imatinib mesilate.
- أبيضاض الدم الليمفاوي الحاد (ALL) مع صبغي فيلادلفيا إيجابي وأبيضاض الدم النقفي المزمن (CML) الأروماني الليمفاوي المنتشر مع مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق.

الفصيلة العالجية: مثبطات بروتين كيناز.

## 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة (dasatinib) أو لكل واحد من مركيبات الدواء الأخرى (انظر الفصل 6 "معلومات إضافية").

إذا كان هناك احتمالاً في كونك حساساً، فتوجه إلى الطبيب للحصول على المشورة.

## تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يجب اعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل العلاج بـ داساتينيب ساندوز إذا:

- كنت تتناول أدوية لتميم اللحم أو لمنع تخثرات الدم (انظر البند "تفاعلات/رود فعل بين الأدوية").

• كنت تعاني أو عانيت من مشكلات في الكبد أو في القلب.  
علامة لاحتياجات السوائل في الترثين أو في الصدر (الذي يمكن أن يكون أكثر شيوعاً لدى متعالجين بعمر 65 عاماً وما فوق) أو بسبب تغيرات في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى الرئتين.

• كان لديك أو يوجد لديك التهاب الكبد الفيروسي من نوع B (Hepatitis B). وذلك لأن داساتينيب ساندوز يمكن أن يجعل التهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis B) نشطاً مرة أخرى، وما قد يكون معيلاً في حالات معينة. سيتم فحص المرضى بدقة من قبل الطبيب للكشف عن علامات لهذه العدوى قبل بدء العلاج.

• ظهرت كدمات، نزيف، سخونة، إرهاق وارتكاك أثناء العلاج بـ داساتينيب ساندوز، راجع الطبيب. من المحتمل أن تكون هذه علامات ضرر في الأوعية الدموية، المعروف باسم اعتلال الأوعية الدقيقة الخالي [thrombotic microangiopathy (TMA)].

## الأطفال والمرأهقون

داساتينيب ساندوز ليس معذراً لاستعمال الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً. توجد تجربة محدودة بخصوص استعمال داساتينيب في هذه الفئة العمرية.

## الفحوصات والمتتابعة

سيقوم الطبيب بمتابعة حالتك بصورة منتظمة من أجل الشخص فيما إذا كان داساتينيب ساندوز يؤدي إلى التأثير المرغوب.

بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوصات دم بشكل ثابت لمتابعة تقدم العلاج.

تفاعلات/رود فعل بين الأدوية  
إذا كنت تتناول أو إذا تناولت موزعاً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

يتم التخلص من داساتينيب ساندوز بشكل رئيسي من قبل الكبد. قد تتدخل بعض الأدوية مع تأثير داساتينيب ساندوز إذا تم تناولها سوية.

لا يجوز تناول الأدوية التالية سوية مع داساتينيب ساندوز:

- كيتوكونازول وابيراكونازول – هذه أدوية مضادة للفطريات

- أريثروميسين، كلارايرثروميسين وتيليرثروميسين – هذه مضادات حيوية

- ريتونافير – هذا دواء مضاد للفيروسات

- فينيتوبين، كاربامازيبين، فينوبارباريتال – لعلاج الصرع

- ريفامبيسين – هذا علاج للسل

- فاموتيندين وأومبيرازول – هذه أدوية مضادة للمحموضة في المعدة

St. John's wort – مستحضر على أساس نباتي لمعالجة الاكتئاب (المعروف أيضاً باسم عرق منقوب) لا يجوز تناول أدوية مضادة للمحموضة في المعدة (مضادات المحموضة في المعدة) في الساعتين التي تسبق أو التي تلي تناول داساتينيب ساندوز.

أخبر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية لتميم الدم أو مضادات التخثر.

## استعمال الدواء والغذاء

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام.

لا يجوز تناول الدواء مع الچريپ-فروت أو عصير الچريپ-فروت.

## الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تعتدين بأنك قد تكونين حاملاً، أخبري الطبيب فوراً.

لا يجوز تناول داساتينيب ساندوز خلال الحمل إلا إذا كان ذلك ضروريّاً بصورة واضحة. سيناقش معك الطبيب حول الخطورة الممحتلة من تناول داساتينيب ساندوز خلال الحمل.

يجب على الرجال والنساء الذين يتناولون داساتينيب ساندوز استشارة الطبيب حول استعمال وسائل منع حمل ناجحة، خلال فترة العلاج.

إذا كنت مرضعة، أخبري الطبيب. يجب عليك التوقف عن الإرضاع أثناء تناول داساتينيب ساندوز.

## السيارة واستعمال الماكينات

يجب توخي الحذر بشكل خاص أثناء السيارة أو استعمال الماكينات في حال كنت تشعر بأعراض جانبية مثل دوار ورؤبة مشوша.

معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء

يعتني داساتينيب ساندوز على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم قدرة تحمل لسكريات معينة، تشاور مع الطبيب قبل تناول الدواء.

يعتني هذا الدواء على أقل من 1 مليمول صوديوم (23 ملغم) في القرص، وبالتالي يعتبر "حال من الصوديوم".

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

سيتم وصف داساتينيب ساندوز لك فقط من قبل طبيب من ذوي الخبرة في علاج أبيضاض الدم (اللوكيميما). يجب استعمال داساتينيب ساندوز دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الحصول على الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. داساتينيب ساندوز معد للبالغين.

الجرعة وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء بموجب الجرعة والفترقة الزمنية التي حدّدت من قبل الطبيب. يحسب استجابتكم للعلاج، سيقوم الطبيب بتلقيعك

إذا كانت هناك ضرورة لجرعة أعلى أو أقل من داساتينيب ساندوز أو حتى إيقاف العلاج لفترة زمنية قصيرة. لجرعات أعلى أو أقل، من المحتمل أن تحتاج إلى تناول مزيج من أقراص بتركيزات مختلفة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

## مدة العلاج

يجب تناول داساتينيب ساندوز يومياً إلى أن يعطيك الطبيب تعليمات بالتوقف. يجب عليك التأكد من أنك تتناول داساتينيب ساندوز.

يجب تناول الدواء في وقت محدد كل يوم.

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز سحق، شطر أو مضنه الأقراص (من أجل الحفاظ على ثبات الجرعة وتقليل خطر التعرض الجلدي). يُمنع إذابة الأقراص (لأن التعرض لدى المعالجين الذين حصلوا على قرص مذاب أقل مقارنة بالمعالجين الذين بليوا القرص بأكمله).

ليس بإمكانك أن تكون متاكداً بأنك ستحصل على الجرعة الصحيحة إذا سحقت، شطرت، مضنت أو أذنت الأقراص.

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام. لا يجوز تناول الدواء مع الچريپ-فروت أو عصير الچريپ-فروت.

إذا كنت تتناول أيقراصاً معدلاً بـ Hydroxide أو هيدروكسيد المغنيزيوم (Magnesium Hydroxide) فيجب تناول مضادات المحموضة مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومينيوم (Aluminum Hydroxide) - ساعتين قبل أو ساعتين بعد داساتينيب ساندوز.

تعليمات علاجية خاصة لـ داساتينيب ساندوز.

من غير المحتمل أن تكسر أقراص داساتينيب ساندوز. لكن إذا حدث ذلك، فيجب على الأشخاص الآخرين غير الشخص المتعالج باستعمال الفرازات أثناء تناول الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عليه الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. قم بتناول الجرعة التالية في وقتها العادي، واستشر الطبيب.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

في حال توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! يجب فحص ملصق الدواء والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات

الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، إن استعمال داساتينيب ساندوز قد يسبب أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدش عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أن أي منها.

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية التي يمكن أن تكون علامات لأعراض جانبية خطيرة:

- ظهور آلم في الصدر، صعوبات في التنفس، سعال وإغماء

- نزف غير متوقع أو يوجد لديك كدمات من دون أن تصاب

- ظهور دم بالقيء، في البراز أو في البول، أو ظهور براز أسود

- ظهور علامات عدوى مثل سخونة وتشعيرية شديدة

- ظهور سخونة، الم في الحنجرة أو الفم، حويصلات أو تقرش الجلد وأو الأغشية المخاطية

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):

- حالات عدوى (وهذا يشمل عدوى من مصدر جرثومي، فيروسي وفطري)

- القلب والرئتين: ضيق تنفس

- مشاكل هضم: حالات إسهال، غثيان، تقيؤات

- الجلد، الشعر، العيون، عام: طفح في الجلد، سخونة، انتفاخ حول الوجه، اليدين والقدمين، صداع، الشعور بارهاق أو ضعف، نزف

- ألم: ألم في العضلات (انتفاء العلاج أو بعد إيقاف العلاج)، ألم في البطن

- من شأن الفحوصات أن تبيّن: انخفاض تعداد الصفائح الدموية، انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (neutropenia)، فقر الدم، سوائل حول الرئتين

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):

- حالات عدوى: التهاب رئوي (pneumonia)، عدوى فيروس البريس (بما في ذلك عدوى الفيروس المضخم للخلايا - CMV)، عدوى في مجرى التنفس الطوعي، عدوى خطيرة في الدم أو في الأنسجة (وهذا يشمل حالات غير شائعة مع نتائج مميتة)

- القلب والرئتين: خفقان القلب، اضطرابات بنظام القلب، قصور القلب، ضعف عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، سعال

- مشاكل في الهضم: اضطرابات في الشهية للطعام، اضطراب في حاسة التذوق، توسيع أو انتفاخ في البطن، التهاب القولون، إمساك، حرق، تقرحات في المعدة، زيادة الوزن، انخفاض الوزن، التهاب المعدة

- الجلد، الشعر، العيون، عام: وخز في الجلد، حكة، جفاف الشفاه، حب الشباب، حب الشباب في الجلد، ضرج مع متواصل في الأذنين، تساقط الشعر، تعرق زائد، دوار، كدمات، فلة الشهوة للطعام، نعاس، وذمة شاملة

- ألم: ألم في المفاصل، ضعف العضلات، ألم في الصدر، ألم في منطقة اليدين والقدمين، حالات قشريرية، تصلب العضلات والمفاصل، تقلصات عضلية

- من شأن الفحوصات أن تبيّن: سوائل حول القلب، سوائل في الرئتين، اضطرابات في نظم القلب، قلة العدارات الخُمُوية، نزف في الجهاز الهضمي، ارتفاع نسب حمض البيريك في الدم

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):

- القلب والرئتين: نوبة قلبية (وهذا يشمل نتائج مميتة)، التهاب الغشاء المخاطي (fibrous sack) الذي يحيط بالقلب، عدم انتظام نظم القلب، تقرحات في المعدة، زيادة الوزن، انخفاض الوزن، التهاب المعدة

- ممكن أن تؤدي إلى صعوبات تنفس، ربو، ضغط دم متزايد في شرايين الرئتين، تخثرات دموية

- مشاكل في الهضم: التهاب البنكرياس، فقرحة معدية، التهاب في المريء، انتفاخ البطن، تمزق في جلد القناة الشرجية، صعوبة

- في البالع، التهاب المراراة، انسداد القنوات الصفراوية، ارتداد معدى مريري (reflux) (وهي حالة التي تعود فيها الأحشاء

- وبقي محتويات المعدة إلى داخل الحلق)

- الجلد، الشعر، العيون، عام: رد فعل حساسية يشمل كتل حمراء وحساسية على الجلد (حمامي عقدة - erythema nodosum)، فلق، ارتياب، تغيرات في المزاج، انخفاض في الرغبة الجنسية، إغماء، رحقة، التهاب العين الذي يسبب أحمراناً أو الماء، مرض جلدي يتميز بقع حمراً، حساسة، واضحة جدًا تترافق بظهور بقع على الجلد، ضرج مع متواصل في الأذنين،

- مرض جلدي يتميز بقع حمراً، ارتفاع الصدر لدى الرجال، تضخم الصدر لدى النساء، ارتفاع في الرؤية، افزار زائد للدم، تغير لون الجلد، التهاب النسيج الشحمي تحت الجلد، تقرح الجلد، حويصلات في الجلد، تغير في الأظافر، تغير في الشعر، متلازمة يد - رجل (hand-foot disorder)، قصور كلوي، تكرار التبول، تضخم الصدر لدى الرجال، اضطراب في الطمث، ضعف وانزعاج عام،

- قصور الغدة الدرقية، فقدان التوازن أثناء المشي، نخر عظمي (osteonecrosis) - مرض تدفق دم منخفض للعظام، الذي

- يمكن أن يؤدي إلى فقدان وموت العظم)، التهاب المفاصل، انتفاخ الجلد بأماكن مختلفة من الجسم

- الدماغ: فقدان الذاكرة

- من شأن الفحوصات أن تبيّن: نتائج فحوصات دم غير سليمة ومن المحتمل أن يكون هناك خلل في الأداء الوظيفي للكلية نتيجة

- لإبعاد فحوصات الورم: تضخم البطين الأيمن للقلب، التهاب عضلة القلب، التهاب العين الذي يسبب أحمراناً أو الماء،

- (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترون في الدم، انتفاخ الغدد الملفاوية، نزف دماغي، عدم انتظام

- النشاط الكهربائي للقلب، تضخم القلب، التهاب الكبد، بروتين في البول، ارتفاع إنزيم كرياتين فوسفوكيناز (enzym موجود بشكل

- رئيسي في القلب، في الدماغ، وفي عضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع التروپينين (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الأنسجة

- مثل عضلة القلب وعضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع جاما - چلوتاميل - ترانسفيزان (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الكبد)،

- ظهور سوائل حليبية المظهر حول الرئتين (chylothorax)

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):

- القلب والرئتين: تضخم البطين الأيمن للقلب، التهاب عضلة القلب، التهاب العين الذي يسبب أحمراناً أو الماء،

- (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الأوردة العميقية)، خثرات دموية في الرئتين

- مشاكل في الهضم: فقدان مواد مغذية ضرورية مثل جهاز الهضم، انسداد الأمعاء، ناسور في فتحة الشرج (فتحة

- غير سليمة في فتحة الشرج باتجاه الجلد المحيط لفتحة الشرج)، تضرر وظائف الكلية، سكري

- • الأزرق، التهاب الأوعية الدموية في الجلد، نوبة لينية في الجلد، إجهاض، احتلال مؤقت في الأداء الوظيفي العصبي نتيجة خلل في تدفق الدم، شلل في عصب الوجه، خرف (dementia)

- • الدماغ: سكتة، احتلال مؤقت في الأداء الوظيفي العصبي نتيجة خلل في تدفق الدم، شلل في عصب الوجه، خرف (dementia)

- • جهاز المناعة: رد فعل حساسية وخيم (عدوى في الكبد)

- رد فعل مصحوب بسخونة، حويصلات على الجلد، وتقرح الأغشية المخاطية

- مرض كلوي مع أعراض تشمل وذمة ونتائج فحوصات مخبرية شديدة مثل وجود بروتين في البول ومستوى بروتين منخفض

- في الدم

- ضرر في الأوعية الدموية المعروفة باسم اعتلال الأوعية التاليفي الخثاري [thrombotic microangiopathy] (TMA)،

- الذي يشمل انخفاض في تعداد كريات الدم الحمراء، انخفاض في الصفائح وتكوين خثرات دموية

- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبية غير مذكور في النشرة، عليك

- استشارة الطبيب.

بالإمكان الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "إبلاغ عن أعراض جانبية عقب علاج

دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك لاستماره عبر الإنترنت للإبلاغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى

اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يمنع إقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد هناك حاجة إليها. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

شروط التخزين:

• يجب التخزين تحت  $-25^{\circ}\text{C}$ .

#### 6. معلومات إضافية

### يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

Tablet core: lactose monohydrate, cellulose, microcrystalline (E460), croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose (E463), magnesium stearate (E470b)  
Film-coating: poly (Vinyl Alcohol) (E1203), titanium dioxide (E171), talc (E553b), glyceryl monostearate (E471), sodium laurilsulfate

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

داساتينيب ساندوز 20 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-سوایت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا

الجانبين مع ختم "20" على جانب واحد.

عيوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصًا مطلية.

داساتينيب ساندوز 50 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-سوایت (أبيض مائل للرمادي)، بيضاوية، محدبة على كلا

الجانبين مع ختم "50" على جانب واحد.

عيوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصًا مطلية.

داساتينيب ساندوز 70 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-سوایت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا

الجانبين مع ختم "70" على جانب واحد.

عيوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصًا مطلية.

داساتينيب ساندوز 100 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-سوایت (أبيض مائل للرمادي)، بيضاوية، محدبة على كلا

الجانبين مع ختم "100" على جانب واحد.

عيوة بليستر (شريحة) تحتوي على 30 قرصًا مطلية.

داساتينيب ساندوز 140 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-سوایت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا

الجانبين مع ختم "140" على جانب واحد.

عيوة بليستر (شريحة) تحتوي على 30 قرصًا مطلية.

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه:

نوفرليس إسرائيل.م.ض، ص.ب. 7126، تل أبيب، إسرائيل.

تم التحرير في حزيران 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

داساتينيب ساندوز 20 ملغ أقراص مطلية: 99-36528-07-173

داساتينيب ساندوز 50 ملغ أقراص مطلية: 99-36529-99-173

داساتينيب ساندوز 70 ملغ أقراص مطلية: 99-36530-99-173

داساتينيب ساندوز 100 ملغ أقراص مطلية: 99-36531-99-173

داساتينيب ساندوز 140 ملغ أقراص مطلية: 99-36532-99-173

من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.