

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תשס"ו - 1986**
התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>
<b>20 מ"ג</b>	<b>50 מ"ג</b>	<b>50 מ"ג</b>	<b>70 מ"ג</b>
<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>
<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 20 מ"ג dasatinib 20 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 50 מ"ג dasatinib 50 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 50 מ"ג dasatinib 50 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 70 מ"ג dasatinib 70 mg</div>

<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>	<b>דסטיניב סנדוז®</b>
<b>100 מ"ג</b>	<b>140 מ"ג</b>	<b>140 מ"ג</b>	<b>140 מ"ג</b>
<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>
<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 100 מ"ג dasatinib 100 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 140 מ"ג dasatinib 140 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 140 מ"ג dasatinib 140 mg</div>	<b>הרכב:</b> <div>כל טבלייה מכילה: דסטיניב 140 מ"ג dasatinib 140 mg</div>

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים:
ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" פרק 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון על העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

דסטיניב סנדוז אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. קיים ניסיון מצומצם לגבי שימוש בדסטיניב בקבוצת גיל זו.

### 1. למה מיעינת התרופה?

דסטיניב סנדוז הינה תרופה המיועדת לטיפול במבוגרים עם:

- לוקמיה מיאלוגית כרונית (CML) עם כרומוזום פילדלפיה חיובי בשלב הכרוני שאובחנה לאחרונה.
- לוקמיה מיאלוגית כרונית (CML) בשלב כרוני, מואץ או בלסטי עם עמידות או אי-סבילות לטיפול קודם, כולל imatinib mesilate.

- לוקמיה לימפובלסטית חריפה (ALL) עם כרומוזום פילדלפיה חיובי ולוקמיה מילוגנית כרונית (CML) בלסטית לימפואידית עם עמידות או אי-סבילות לטיפול קודם.

**קבוצה תרפויטית:** מעכבי פרואטיין קינאז.

### 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (dasatinib) או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים. (ראה פרק 6 "מידע נוסף").
- אם ייתכן שאתה אלרגי, פנה לרופא לייעוץ.**

<b>אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (dasatinib) או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים. (ראה פרק 6 "מידע נוסף").</b>
<b>אם ייתכן שאתה אלרגי, פנה לרופא לייעוץ.</b>

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

**יש לידע את הרופא המטפל או הרוקח לפני הטיפול בדסטיניב סנדוז אם:**

- אתה נוטל **תרופות לדילול הדם** או למניעת קרישי דם (ראו סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- יש לך או היו לך בעיות בכבד או בבלב.

- אתה מתחיל לסיבול מקשיי נשימה, כאב בחזה או ישעוץ** בזמן הטיפול בדסטיניב סנדוז, פנה לרופא. אתה עלול להיות סובל לאצירת נוזלים נזילים במעיך בריאות (אשר יכול להיות נפוץ יותר בטופולים בגיל 65 ומעלה) או עקב שינויים בכלי הדם המובילים דם לריאות.

- הייתה לך או יש לך דלקת כבד נגיפית מסוג B (הפטטיס B). זאת כיוון

שדסטיניב סנדוז עלולה לגרום להפטטיס B להפוך שוב לפעילה, מה שעלול להיות קטלני במקרים מסוימים.

- מטופלים יבדקו בקפידה על ידי הרופא לאיתור סימנים של זיהום זה לפני התחלת הטיפול.

- הופיעו בחבורות, דימום, חום, תשישות ובלבול בזמן הטיפול בדסטיניב סנדוז, פנה לרופא. ייתכן שמדובר בסימנים של נזק לכלי דם, הידוע כמיקרואנגיופתיה תרומבוטית (TMA) [thrombotic microangiopathy].

#### ילדים ומתבגרים

דסטיניב סנדוז אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. קיים ניסיון מצומצם לגבי שימוש בדסטיניב בקבוצת גיל זו.

#### בדיקות ומעקב

הרופא יעקוב באופן סדיר אחר מצבך על מנת לבדוק אם דסטיניב סנדוז גורמת להשפעה הרצויה. בנוסף, בתקופת הטיפול בתרופה זו תעבור בדיקות דם באופן סדיר בכדי לעקוב אחרי התקדמות הטיפול.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות**
**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**
דסטיניב סנדוז מפונה בעיקר על ידי הכבד. תרופות מסוימות עלולות להפריע להשפעתה של דסטיניב סנדוז אם ניטלות יחד.

**אין ליטול את התרופות הבאות יחד עם דסטיניב סנדוז:**

- קטוקונאזול ואיטרקונאזול - אלו תרופות אנטי פטרייתיות
- אריטרומיצין, קלריתרומיצין וטליטרומיצין - אלו אנטיבייטיקות
- ריטונאביר - זו תרופה אנטי-ישראלית
- פניטואין, קרבמזפין, פנוברביטל - לטיפול באפילפסיה
- ריפמפיצין - זהו טיפול לשחפת
- פוסמידין ואומפרזול - אלו תרופות נוגדות חומצה בקיבה
- St. John's wort - תכשיר על בסיס צמחי ל**דיכאון** (ידוע גם בשם היפריקום פרפרוטום)

**אין ליטול** תרופות שסותרות את החומצה בקיבה **(נוגדי חומצה** כגון אלומיניום הידרוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד **לטיפול בצרבת) בשעתיים שלפני או בשעתיים שאחרי נטילת דסטיניב סנדוז.**

**ספר לרופא** אם אתה לוקח **תרופות לדילול הדם** או נוגדי קרישה.

#### שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת את התרופה עם אוכל או ללא אוכל.

אין ליטול את התרופה עם אשכוליות או מיץ אשכוליות.

#### היריון והנקה

**אם את בהריון** או חושבת שאת עשויה להיות בהריון, **ספרי לרופא באופן מיידי**.
**אין ליטול דסטיניב סנדוז במהלך ההיריון** אלא אם הכרחי באופן מפורש. הרופא ידון איתך לגבי הסיכון האפשרי בבנטילת דסטיניב סנדוז במהלך ההיריון.

על גברים נושם הנטלים סנדוז להיוועץ ברופא כאשר לשימוש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול.
**אם את מניקה, ספרי לרופא.**
עלייך להפסיק את ההנקה בזמן נטילת דסטיניב סנדוז.

#### נהיגה ושימוש במכוונת

יש להיזהר במיוחד בנהיגה או בשימוש במכוונת במקרה שאתה חווה תופעות לוואי כגון סחרחורת וראייה מטושטשת.

#### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ברופא לפני נטילת התרופה.
ברופא זו מכילה פחות מ–1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבלייה, ולפיכך נחשבת "נטולת נתרן".

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

דסטיניב סנדוז תירשם לך רק על ידי רופא שמנוסה בטיפול בלוקמיה. יש להשתמש בדסטיניב סנדוז תמיד לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
דסטיניב סנדוז מיועדת למבוגרים.

**המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.**

יש ליטול את התרופה בהתאם למינון ופרק הזמן שקבעו על ידי הרופא. בהתאם לתגובתך לטיפול, הרופא יעדכן אותך אם נדרש מינון גבוה יותר או נמוך יותר של דסטיניב סנדוז או אף הפסקה של הטיפול לפרק זמן קצר.
למינונים גבוהים יותר או נמוכים יותר, ייתכן שתצטרך ליטול שלובים של טבליות בחזקים שונים.
**אין לעבור על המנה המומלצת.**

#### משך הטיפול -

יש ליטול דסטיניב סנדוז כל יום עד שהרופא ינחה אותך להפסיק. עליך לוודא שאתה נוטל דסטיניב סנדוז למשך כל הזמן שנרשם עבורך.

יש ליטול את התרופה בזמן קבוע כל יום.

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אין לכתוש, לחצות או ללעוס את הטבליות (על מנת לשמור על עקביות המינון ולהפחית את הסיכון לחשיפה עורית).
אין להמייס את הטבליות (כיוון שבמטופלים שקיבלו טבלייה שהומסה החשיפה נמוכה לעומת מטופלים שבלעו את הטבלייה בשלמותה).

אינך יכול להיות בטוח שתקבל את המנה הכנונה אם תכתוש, תחצה, תלעס או תמיס את הטבליות.

ניתן לקחת את התרופה עם אוכל או ללא אוכל. אין ליטול את התרופה עם אשכוליות או מיץ אשכוליות.
אם אתה נוטל גם תרופות סותרות חומצה (לטיפול בצרבת) כגון תרופות המכילות אלומיניום הידרוקסיד או מגנזיום הידרוקסיד - יש ליטול את סותרי החומצה לא פחות משעתיים לפני או שעתיים אחרי דסטיניב סנדוז.

#### הוראות טיפול מיוחדות לדסטיניב סנדוז

לא מכיר טבליות של דסטיניב סנדוז יישברו. אך אם זה קורה, על אנשים אחרים שאינם המטופל להשתמש בכפפות בזמן מגע דסטיניב סנדוז.

**אם נטלת מנת יתר** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריות התרופה איתך.

**אם שכתה ליטול תרופה זו** בזמן המיועץ, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### אם אתה מטופק את נטילת התרופה

גם אם חל שינוי במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך!**
**בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה,השימוש בדסטיניב סנדוז עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש לפנות מייד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות אשר יכולות להיות סימנים של תופעות לוואי חמורות:**

- הופעת כאב בחזה, קשיי נשימה, שיעול והתעלפות
- דימום בלתי צפוי או שיש לך חבלות** מבלי שנפצעת
- הופעת דם בקיא, בצואה או בשתן, או הופעה של צואה שחורה
- הופעת **סימני זיהום** כמו חום וצמרמורת חמורות
- הופעת חום, כאב גרון או פה, שלפוחיות או קילוף של העור ו/או הריעות

תופעות לוואי נוספות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר מ-1 מתוך 10 משתמשים):

- זיהומים** (כולל זיהומים ממקור חיידקי, יוראלי ופטרייתי)
- לב וריאות:** קוצר נשימה
- בעיות עיכול:** שלשולים, בחילות, הקאות
- עור, שיער, עיניים, כללי:** פריחה בעור, חום, נפיחות סביב הפנים, הידיים וכפות הרגליים, כאב ראש, תחושת עייפות או חולשה, דימום
- כאב:** כאב בשרירים (בזמן הטיפול או אחרי הפסקת הטיפול), כאבי בטן
- בדיקות עשיות להראות:** ספירת טסיות דם נמוכה, ספירת תאי דם לבנים נמוכה (נויטרופניה), אנמיה, נוזלים סביב הריאות

**תופעות לוואי שכיחות** (מופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשים):

- זיהומים:** דלקת ריאות (pneumonia), זיהום של וירוס ההרפס (כולל ציטומגלו-וירוס -CMV), זיהום בדרכי הנשימה העליונות, זיהום חמור בדם או ברקמות (כולל מקרים לא שכיחים עם תוצאות קטלניות)
- לב וריאות:** דפיקות לב, הפרעות בקצב הלב. אי ספיקת לב, חולשה בשריר הלב, לחץ דם גבוה, יתר לחץ דם ריאתי, שיעול
- בעיות עיכול:** הפרעות בתיאבון, הפרעה בחוש הטעם, התרחבות או נפיחות בטון, דלקת של המעי הגס, עצירות, צרבת, כיבים בפה, עלייה במשקל, ירידה במשקל, דלקת הקיבה
- עור, שיער, עיניים, כללי:** עקצוץ בעור, גירוד, עור יבש, אקנה, דלקת בעור, רעש מתמשך באוזניים, נשירת שיער, הזעה מוגברת, הפרעה בראייה (כולל ראייה מטושטשת וראייה משושבת), עין יבשה, חבורה, דיכאון, נדודי שינה, הסמקה, סחרחורת, חבלות, אנוקסיה, ישנוניות, בצקת כללית
- כאב:** כאב במפרקים, חולשת שרירים, כאב בחזה, כאב באזור הידיים וכפות הרגליים, צמרמורת, נוקשות שרירים ומפרקים, התכווצות שרירים
- בדיקות עשיות להראות:** נוזלים סביב הלב, נוזלים בריאות, הפרעות בקצב הלב, נויטרופניה פיברילית, דימום במערכת העיכול, רמות חומצה אורית גבוהות בדם

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (מופיעות בעד 1 מתוך 100 משתמשים):

- לב וריאות:** התקף לב (כולל תוצאות קטלניות), דלקת הררית (fibrous sack) המקיפה את הלב, קצב לב לא סדיר, כאב בחזה בשל חוסר אספקת דם ללב (אנגינה), לחץ דם נמוך, היצרות דרכי הנשימה אשר עלולה לגרום לקשיי נשימה, אסתמה, לחץ דם מוגבר בעורקי הריאות, קרישי דם
- בעיות עיכול:** דלקת של הבלבד, כיב פפטי, דלקת בוששט, בטן נפוחה, קרע בעור של התעלה האנאלית, קושי בבליעה, דלקת של כיס המרה, חסימה של תעלות כיס המרה, החזר קיבתי ושטי (ריפלוקס) (מצב שבו החומצה ושאר תוכן הקיבה חוזרים אל תוך הגרון)
- עור, שיער, עיניים, כללי:** תגובה אלרגית כולל צברים אדומים ורגישים על העור (erythema nodosum), חרדה, בלבול, שינויים במצב הרוח, ירידה בדחף המיני, עילפון, רעד, דלקת של העין שגורמת לאדמומיות, או לכאב, מחלת עור המתאפיינת בכתמים אדומים, רגישים, מוגדרים היטב המלווים בהתפרצות פתאומית של חום וספירת תאי דם לבנים גבוהה (neutrophilic dermatosis) אובדן שמיעה, רגישות לאור, ליקוי ראייה, הפרשה מוגברת של דמעות, שינוי בצבע העור, דלקת ברקמת השומן מתחת לעור, כיב בעור, שלפוחיות בעור, שינוי בציפורניים, שינוי בשיער, חסמונת יד-רגל (hand-foot syndrome), אי ספיקת כליות, תכיפות במתן שתן, הגדלת חזה אצל גברים, הפרעה בוסת, חולשה ואי נוחות כללית
- תת פעילות בלוטת התריס, איבוד שיווי משקל בזמן הליכה, נמק העצם (osteonecrosis - מחלה של זרימת דם מופחתת לעצמות, אשר עלולה לגרום לאובדן ולומות העצם), דלקת מפרקים, נפיחות בעור במקומות שונים בגוף
- כאב:** דלקת ורידית העלולה לגרום לאדמומיות, רגישות ונפיחות, דלקת של הגיד

**מוח:** אובדן זיכרון

- בדיקות עשיות להראות:** תוצאות בדיקת דם לא תקינות וייתכן תפקוד כליות לקוי הנגרם מפינוי חומרי הפסולת של הלידול (tumour lysis syndrome), רמות נמוכות של אלבומון בדם, רמות נמוכות של לימפוציטים (סוג של תאי דם לבנים) בדם, רמה גבוהה של כולסטרול בדם, בלוטות לימפה נפוחות, דימום במוח, אי סדירות בפעילות החשמלית של הלב, לב מוגדל, דלקת של הכבד, חלבון בשתן, עלייה באזנים קריאטין פוספורינאז (אזנים שנמצא בעיקר בלב, במוח ובשרירי השלד), עלייה בטרופונין (אזנים שנמצא בעיקר ברקמת כונו שריר הלב ושריר השלד), עלייה בגאמא-גלוטמיל-טרנספראז (אזנים שנמצא בעיקר בכבד), הופעת נוזלים במראה חלבי מסביב לריאות (chylothorax)

**תופעות לוואי נדירות** (מופיעות בעד 1 מתוך 1,000 משתמשים):

- לב וריאות:** הגדלה של חדר הלב הימני, דלקת של שריר הלב, מצבים שונים הנוצרים כתוצאה מחסימה של אספקת דם לשריר הלב (acute coronary syndrome), דום לב (הפסקה של זרימת הדם מהלב), מחלת לב כללית, דלקת של הרקמה המכסה את הלב והריאות, קרישי דם (בוורידים עמוקים), קרישי דם בריאות
- בעיות עיכול:** אובדן של חומרי תזונה חיוניים כמו חלבון ממערכת העיכול, חסימת מעיים, פיסטולה בפי הטבעת (פתח לא תקין מפי הטבעת אל העור שמסביב לפי הטבעת), פגיעה בתפקודי כליות, סוכרת
- עור, שיער, עיניים, כללי:** עוויתות, דלקת של עצב הראייה העלולה לגרום לאובדן מלא או חלקי של הראייה, גוון כחלחל-סגולגל של העור, פעילות יתר של בלוטת התריס, דלקת בלוטת התריס, אטקסיה (הפרעה בקואורדינציה), קושי בהליכה, הפלה, דלקת של כלי דם בעור, צלקת פיברוטית בעור
- מוח:** שבץ, חוסר תפקוד נוירולוגי זמני כתוצאה מזרימת דם לקויה, שיתוק בעצב הפנים, שטייון (דמנציה)
- מערכת החימום:** תגובה אלרגית חמורה
- מערכת השלד, שרירים, ורקמות חיבור:** עיכוב באיחוי הקצוות היוצרים מפרקים (אפיפיזות); האטה או עיכוב בגדילה

**תופעות לוואי נוספות ששכיחותן אינה ידועה** (לא ניתן להערך המיידע הקיים):

- דלקת ריאות
- דימומים בקיבה או במעיים העלולים לגרום למוות
- שינוים (ריאקטיביצה) של זיהום בנגיף הפטיטיס B, אם היה לך הפטיטיס B בעבר (זיהום בכבד)
- תגובה עם חום, שלפוחיות על העור והתכייבות רקמות ריריות
- מחלת כליות עם תסמינים הכוללים בצקת ותוצאות בדיקות מעבדה חריגות כגון חלבון בשתן ורמת חלבון נמוכה בדם
- נזק לכלי דם הידוע כמיקרואנגיופתיה תרומבוטית [thrombotic microangiopathy (TMA)] כולל ירידה בספיקת כדוריות דם אדומות, ירידה בטסיות והיווצרות של קרישי דם

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי במשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב תופעות לוואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על" כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות על-ידי כיל תינוק העור, פעילות יתר של בלוטת התריס, דלקת בלוטת התריס, אטקסיה

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך איך להיפטר מתרופות שאינן נחוצות עוד. זה יסייע להגן על הסביבה.

### תנאי האחסון:

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Tablet core: lactose monohydrate, cellulose, microcrystalline (E460), croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose (E463), magnesium stearate (E470b)

**Film-coating:** poly (Vinyl Alcohol) (E1203), titanium dioxide (E171), talc (E553b), glyceryl monostearate (E471), sodium laurilsulfate

#### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

דסטיניב סנדוז 20 מ"ג: טבליות מצופות בצבע לבן עד אוף וויט (לבן אפרפר), עגולות, קמורות משני הצדדים עם הטבעה של "20" בצד אחד.

אריזת בליסטר (מגשית) מכילה 60 טבליות מצופות.

דסטיניב סנדוז 50 מ"ג: טבליות מצופות בצבע לבן עד אוף וויט (לבן אפרפר), אליפטיות, קמורות משני הצדדים עם הטבעה של "50" בצד אחד.

אריזת בליסטר (מגשית) מכילה 60 טבליות מצופות.

דסטיניב סנדוז 70 מ"ג: טבליות מצופות בצבע לבן עד אוף וויט (לבן אפרפר), אליפטיות, קמורות משני הצדדים עם הטבעה של "100" בצד אחד.

אריזת בליסטר (מגשית) מכילה 30 טבליות מצופות.

דסטיניב סנדוז 140 מ"ג: טבליות מצופות בצבע לבן עד אוף וויט (לבן אפרפר), עגולות, קמורות משני הצדדים עם הטבעה של "140" בצד אחד.

אריזת בליסטר (מגשית) מכילה 30 טבליות מצופות.

#### בעל הרישום והיבואן וכתובות:

נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב, ישראל.

נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

#### מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

**דסטיניב סנדוז 20 מ"ג** טבליות מצופות: 173-07-36528-99

**דסטיניב סנדוז 50 מ"ג** טבליות מצופות: 173-08-36529-99

**דסטיניב סנדוז 70 מ"ג** טבליות מצופות: 173-09-36530-99

**דסטיניב סנדוז 100 מ"ג** טבליות מצופות: 173-10-36531-99

**דסטיניב סנדוז 140 מ"ג** טבליות מצופות: 173-11-36532-99