

### داساتينيبي ساندوز®

**20 ملغ**  
**أقراص مطلية**

التركيب:  
يحتوي كل قرص على:

داساتينيبي 20 ملغ  
dasatinib 20 mg

### داساتينيبي ساندوز®

**100 ملغ**  
**أقراص مطلية**

التركيب:  
يحتوي كل قرص على:

داساتينيبي 100 ملغ  
dasatinib 100 mg

### داساتينيبي ساندوز®

**50 ملغ**  
**أقراص مطلية**

التركيب:  
يحتوي كل قرص على:

داساتينيبي 50 ملغ  
dasatinib 50 mg

### داساتينيبي ساندوز®

**140 ملغ**  
**أقراص مطلية**

التركيب:  
يحتوي كل قرص على:

داساتينيبي 140 ملغ  
dasatinib 140 mg

### داساتينيبي ساندوز®

**70 ملغ**  
**أقراص مطلية**

التركيب:  
يحتوي كل قرص على:

داساتينيبي 70 ملغ  
dasatinib 70 mg

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: أنظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بنتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

داساتينيبي ساندوز غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال ولدى المراهقين دون عمر 18 سنة. هناك تجربة محدودة بالنسبة لاستعمال داساتينيبي لدى هذه الفئة من العمر.

### 1. لم أعد هذا الدواء؟

داساتينيبي ساندوز هو عبارة عن دواء مخصص لمعالجة الكبار مع:

- ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) مع صبغي فيلادلفيا إيجابي في المرحلة المزمنة الذي تم تشخيصه مؤخرًا.
- ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) في المرحلة المزمنة، المتسارعة أو الأرومية مع مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق، بما في ذلك imatinib mesilate.
- ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد (ALL) مع صبغي فيلادلفيا إيجابي و ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML) الأرومي الليمفاوي المنشأ مع مقاومة أو عدم تحمل لعلاج سابق.

الفصيلة العلاجية: مثبطات بروتين كيناز.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (ألرجي) للمادة الفعالة (dasatinib) أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى (انظر الفصل 6 "معلومات إضافية").

إذا كان هناك احتمالًا في كونك حساسًا، فتوجه إلى الطبيب للحصول على المشورة.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

يجب اعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل العلاج بداساتينيبي ساندوز إذا:

- كنت تتناول أدوية لمتبيح للدم أو لمنع تخثرات الدم (انظر البند "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").
- كنت تعاني أو عانيت من مشاكل في الكبد أو في القلب.
- بدأت تعاني من صعوبات في التنفس، ألم في الصدر أو سعال أثناء العلاج بداساتينيبي ساندوز، راجع الطبيب. قد تكون هذه علامة لاحتباس السوائل في الرئتين أو في الصدر (الذي يمكن أن يكون أكثر شيوعًا لدى متعالجين بعمر 65 عامًا وما فوق) أو بسبب تغيرات في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى الرئتين.
- كان لديك أو يوجد لديك التهاب الكبد الفيروسي من نوع B (Hepatitis B). وذلك لأن داساتينيبي ساندوز يمكن أن يجعل التهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis B) نشطًا مرة أخرى، ومما قد يكون مميتًا في حالات معينة. سيتم فحص المرضى بدقة من قبل الطبيب للكشف عن علامات لهذه العدوى قبل بدء العلاج.
- ظهرت كدمات، نزيف، سخونة، إرهاق وارتباك أثناء العلاج بداساتينيبي ساندوز، راجع الطبيب. من المحتمل أن تكون هذه علامات ضرر في الأوعية الدموية، والمعروف باسم اعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري [thrombotic microangiopathy (TMA)].

الأطفال والمراهقون

داساتينيبي ساندوز ليس معدًا لاستعمال الأطفال والمراهقين دون سن 18 عامًا. توجد تجربة محدودة بخصوص استعمال داساتينيبي في هذه الفئة العمرية.

الفحوصات والمتابعة

سيقوم الطبيب بمتابعة حالتك بصورة منتظمة من أجل الفحص فيما إذا كان داساتينيبي ساندوز يؤدي إلى التأثير المرغوب. بالإضافة إلى ذلك، خلال فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوصات دم بشكل ثابت لمتابعة تقدم العلاج.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

يتم التخلص من داساتينيبي ساندوز بشكل رئيسي من قبل الكبد. قد تتداخل بعض الأدوية مع تأثير داساتينيبي ساندوز إذا تم تناولها سوية.

لا يجوز تناول الأدوية التالية سوية مع داساتينيبي ساندوز:

- كيتوكونازول وإيتراكونازول – هذه أدوية مضادة للفطريات
- إريثروميسين، كلاريثروميسين وتليثروميسين – هذه مضادات حيوية
- ريتونافير – هذا دواء مضاد للفيروسات
- فينيبتين، كاربامازيبين، فينوباربيتال – لعلاج الصرع
- ريفامبيسين – هذا علاج للسلس
- فاموتيدين وأوميرازول – هذه أدوية مضادة الحموضة في المعدة
- St. John's wort – مستحضر على أساس نباتي لمعالجة الاكتئاب (معروف أيضًا باسم عرن مقوب)

لا يجوز تناول أدوية مضادة للحموضة في المعدة (مضادات الحموضة مثل هيدروكسيد الألومنيوم أو هيدروكسيد المغنيزيوم لمعالجة الحرقة) في الساعتين التي تسبق أو التي تلي تناول داساتينيبي ساندوز.

أخبر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية لمتبيح الدم أو مضادات التخثر.

استعمال الدواء والغذاء

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام.

لا يجوز تناول الدواء مع الجريب-فروت أو عصير الجريب-فروت.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو تعتدين بأنك قد تكونين حاملاً، أخبري الطبيب فوراً.

لا يجوز تناول داساتينيبي ساندوز خلال الحمل إلا إذا كان ذلك ضرورياً بصورة واضحة. سيتناقش معك الطبيب حول الخطورة المحتملة من تناول داساتينيبي ساندوز خلال الحمل.

يتوجب على الرجال والنساء الذين يتناولون داساتينيبي ساندوز استشارة الطبيب حول استعمال وسائل منع حمل ناجعة، خلال فترة العلاج.

إذا كنت مرضعة، أخبري الطبيب. يجب عليك التوقف عن الإرضاع أثناء تناول داساتينيبي ساندوز.

السياقة واستعمال الماكينات

يجب توخي الحذر بشكل خاص أثناء السياقة أو استعمال ماكينات في حال كنت تشعر بأعراض جانبية مثل دوام ورؤية مشوشة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي داساتينيبي ساندوز على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم قدرة تحمل لسكريات معينة، تشاور مع الطبيب قبل تناول الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملغ) في القرص، وبالتالي يعتبر "خال من الصوديوم".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

سيتم وصف داساتينيبي ساندوز لك فقط من قبل طبيب من ذوي الخبرة في علاج ابيضاض الدم (اللوكيميا). يجب استعمال داساتينيبي ساندوز دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. داساتينيبي ساندوز معدّ للبالغين.

الجرعة وطريقة العلاج بحدان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول الدواء بموجب الجرعة والفترة الزمنية التي حددت من قبل الطبيب. بحسب استجابتك للعلاج، سيقوم الطبيب بتبليغك إذا كانت هناك ضرورة لجرعة أعلى أو أقل من داساتينيبي ساندوز أو حتى إيقاف العلاج لفترة زمنية قصيرة. لجرعات أعلى أو أقل، من المحتمل أن تحتاج إلى تناول مزيج من أقراص بتركيزات مختلفة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج –

يجب تناول داساتينيبي ساندوز يوميًا إلى أن يعطيك الطبيب تعليمات بالتوقف. يجب عليك التأكد من أنك تتناول داساتينيبي ساندوز طيلة المدة التي وُصفت لك.

يجب تناول الدواء في وقت محدد كل يوم.

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز سحق، شطر أو مضغ الأقراص (من أجل الحفاظ على ثبات الجرعة وتقليل خطر التعرض الجلدّي). يُمنع إذابة الأقراص (لأن التعرض لدى المتعالجين الذين حصلوا على قرص مذاب أقل مقارنة بالمتعالجين الذين بلعوا القرص بأكمله).

ليس بإمكانك أن تكون متأكدًا بأنك ستحصل على الجرعة الصحيحة إذا سحقته، شطرت، مضغته أو أذبت الأقراص.

بالإمكان تناول الدواء مع طعام أو بدون طعام. لا يجوز تناول الدواء مع الجريب-فروت أو عصير الجريب-فروت.

إذا كنت تتناول أيضًا أدوية مضادة للحموضة (لعلاج الحرقة) مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم (Aluminium Hydroxide) أو هيدروكسيد المغنيزيوم (Magnesium Hydroxide) - فيجب تناول مضادات الحموضة بما لا يقل عن ساعتين قبل أو ساعتين بعد داساتينيبي ساندوز.

تعليمات علاجية خاصة لداساتينيبي ساندوز

من غير المحتمل أن تنكسر أقراص داساتينيبي ساندوز. لكن إذا حدث ذلك، فيجب على الأشخاص الآخرين غير الشخص المتعالج باستعمال القفازات أثناء ملامسة داساتينيبي ساندوز.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد، واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

في حال توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! يجب فحص مُلصق الدواء والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، إن استعمال داساتينيب ساندوز قد يسبب أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

**يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية التي يمكن أن تكون علامات لأعراض جانبية خطيرة:**

- ظهور ألم في الصدر، صعوبات في التنفس، سعال وإغماء
- نزف غير متوقع أو يوجد لديك كدمات من دون أن تصاب
- ظهور دم بالقيء، في البراز أو في البول، أو ظهور براز أسود
- ظهور علامات عدوى مثل سخونة وقشعريرة شديديتين
- ظهور سخونة، ألم في الحنجرة أو الفم، حويصلات أو تقشر الجلد و/أو الأغشية المخاطية

أعراض جانبية إضافية:

**أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):**

- **حالات عدوى (وهذا يشمل عدوى من مصدر جرثومي، فيروسي وفطري)**
- **القلب والرتنان:** ضيق تنفس
- **مشاكل هضم:** حالات إسهال، غثيان، تقيؤات
- **الجلد، الشعر، العيون، عام:** طفح في الجلد، سخونة، انتفاخ حول الوجه، اليدين والقدمين، صداع، الشعور بارهاق أو ضعف، نزف
- **ألم:** ألم في العضلات (أثناء العلاج أو بعد إيقاف العلاج)، آلام في البطن
- **من شأن الفحوصات أن تُبين:** انخفاض تعداد الصفيحات الدموية، انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (neutropenia)، فقر الدم، سوائل حول الرنتنين

**أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):**

- **حالات عدوى:** التهاب رئوي (pneumonia)، عدوى فيروس الهربس (بما في ذلك عدوى الفيروس المضخم للخلايا - CMV)، عدوى في مجاري التنفس العلوية، عدوى خطيرة في الدم أو في الأنسجة (وهذا يشمل حالات غير شائعة مع نتائج مميّنة)
- **القلب والرتنان:** خفقان القلب، اضطرابات بنظم القلب، قصور القلب، ضعف عضلة القلب، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، سعال
- **مشاكل في الهضم:** اضطرابات في الشهية للطعام، اضطراب في حاسة التذوق، توسع أو انتفاخ في البطن، التهاب القولون، إمساك، حرقة، تفرحات في الفم، زيادة الوزن، انخفاض الوزن، التهاب المعدة
- **الجلد، الشعر، العيون، عام:** وخز في الجلد، حكة، جفاف الجلد، حب الشباب، التهاب في الجلد، ضجيج متواصل في الأذنين، تساقط الشعر، تعرق زائد، اضطراب في الرؤية (يشمل رؤية مشوشة ورؤية غير واضحة)، جفاف العين، كدمة، اكتئاب، أرق، تورّد، دوار، كدمات، قلة الشهوة للطعام، نعاس، وذمة شاملة
- **ألم:** ألم في المفاصل، ضعف العضلات، ألم في الصدر، ألم في منطقة اليدين والقدمين، حالات قشعريرة، تصلب العضلات والمفاصل، تقلصات عضلية
- **من شأن الفحوصات أن تُبين:** سوائل حول القلب، سوائل في الرنتنين، اضطرابات في نظم القلب، قلة العدلات الخُوية، نزف في الجهاز الهضمي، ارتفاع نسب حمض اليوريك في الدم

**أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):**

- **القلب والرتنان:** نوبة قلبية (وهذا يشمل نتائج مميّنة)، التهاب الغشاء المخاطي (fibrous sack) الذي يحيط بالقلب، عدم انتظام نظم القلب، ألم في الصدر بسبب نقص في تزويد الدم للقلب (ذبححة)، ضغط دم منخفض، تضيق المجاري الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبات تنفس، ربو، ضغط دم متزايد في شرايين الرنتنين، تخثرات دموية
- **مشاكل في الهضم:** التهاب البنكرياس، قرحة معوية، التهاب في المريء، انتفاخ البطن، تمزق في جلد القناة الشرجية، صعوبة في البلع، التهاب المرارة، انسداد القنوات الصفراوية، ارتداد معدني مريئي (reflux) (وهي حالة التي تعود فيها الأحماض وباقى محتويات المعدة إلى داخل الحلق)
- **الجلد، الشعر، العيون، عام:** رد فعل تحسسي يشمل كتل حمراء وحساسة على الجلد (حمامى عقدة - erythema nodosum)، قلق، ارتباك، تغيرات في المزاج، انخفاض في الرغبة الجنسية، إغماء، رجفة، التهاب العين الذي يسبب احمراراً أو ألماً، مرض جلدي يتميز ببقع حمراء، حساسية، واضحة جيداً تتوافق بظهور مفاجئ لسخونة وارتفاع في تعداد خلايا الدم البيضاء (neutrophilic dermatosis)، فقدان السمع، حساسية للضوء، خلل في الرؤية، إفراز زائد للدمع، تغير لون الجلد، التهاب النسيج الشحمي تحت الجلد، تقرح الجلد، حويصلات في الجلد، تغير في الأظافر، تغير في الشعر، متلازمة يد - رجل (-hand disorder) (foot disorder)، قصور كلوي، تكرار التبول، تضخم الصدر لدى الرجال، اضطراب في الطمث، ضعف وانزعاج عام، قصور الغدة الدرقية، فقدان التوازن أثناء المشي، نخر عظمي (osteonecrosis) - مرض تنفق دم منخفض للطعام، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان وموت العظم، التهاب المفاصل، انتفاخ الجلد بآمان مختلفة من الجسم
- **ألم:** التهاب وريدي الذي قد يسبب احمراراً، حساسية وانتفاخ، التهاب الوتر
- **الدماغ:** فقدان الذاكرة
- **من شأن الفحوصات أن تُبين:** نتائج فحوصات دم غير سليمة ومن المحتمل أن يكون هناك خلل في الأداء الوظيفي للكلية نتيجة لإبعاد فضلات الورم (tumour lysis syndrome)، نسب منخفضة من الألبومين في الدم، نسب منخفضة من المغاويات (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، انتفاخ الغدة المعفاوية، نزف دماغي، عدم انتظام النشاط الكهربائي للقلب، تضخم القلب، التهاب الكبد، بروتين في البول، ارتفاع إنزيم كرياتين فوسفوكيناز (إنزيم موجود بشكل رئيسي في القلب، في الدماغ، وفي عضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع التروپونين (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الأنسجة مثل عضلة القلب وعضلات الهيكل العظمي)، ارتفاع جاما - جلوتاميل - ترانسفيراز (إنزيم موجود بشكل رئيسي في الكبد)، ظهور سوائل حليبية المظهر حول الرنتنين (chylothorax)

**أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):**

- **القلب والرتنان:** تضخم البطين الأيمن للقلب، التهاب عضلة القلب، حالات مختلفة تحدث نتيجة انسداد في تزويد الدم لعضلة القلب (acute coronary syndrome)، سكتة قلبية (توقف تدفق الدم من القلب)، مرض قلبي تاجي، التهاب النسيج الذي يغلف القلب والرتنين، خثرات دموية (في الأوردة العميقة)، خثرات دموية في الرنتنين
- **مشاكل في الهضم:** فقدان مواد مغذية ضرورية مثل البروتين من جهاز الهضم، انسداد الأمعاء، ناسور في فتحة الشرج (فتحة غير سليمة في فتحة الشرج باتجاه الجلد المحيط لفتحة الشرج)، تضمر وظائف الكلى، سكري
- **الجلد، الشعر، العيون، عام:** تشنجات، التهاب عصب الرؤية الذي قد يؤدي لفقدان كامل أو جزئي للرؤية، لون الجلد مائل إلى الأزرق - مائل إلى البنفسجي، فرط نشاط الغدة الدرقية، التهاب الغدة الدرقية، رَنَح (اضطراب في التنسيق)، صعوبة المشي، إجهاض، التهاب الأوعية الدموية في الجلد، ندبة ليفية في الجلد
- **الدماغ:** سكتة، اختلال مؤقت في الأداء الوظيفي العصبي نتيجة خلل في تدفق الدم، شلل في عصب الوجه، خرف (dementia)
- **جهاز المناعة:** رد فعل تحسسي وخيم
- **جهاز الهيكل العظمي، العضلات، والأنسجة الضامة:** تأخير في اندماج أطراف العظام التي تشكل المفاصل (مُشاشات epiphyses)؛ تباطؤ النمو أو تأخيره

**أعراض جانبية إضافية نسبة شيوعتها غير معروفة (لا يمكن تقديرها من المعلومات الموجودة):**

- التهاب رئوي
  - نزيف في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يؤدي للوفاة
  - إعادة تنشيط (Reactivation) العدوى بفيروس التهاب الكبد B، إذا عانيت من فيروس التهاب الكبد B في الماضي (عدوى في الكبد)
  - رد فعل مصحوب بسخونة، حويصلات على الجلد، وتقرح الأغشية المخاطية
  - مرض كلوي مع أعراض تشمل وذمة ونتائج فحوصات مخبرية شاذة مثل وجود بروتين في البول ومستوى بروتين منخفض في الدم
  - ضرر في الأوعية الدموية المعروف باسم اعتلال الأوعية الذقيفة الخُثاري (thrombotic microangiopathy (TMA))، الذي يشمل انخفاض في تعداد كريات الدم الحمراء، انخفاض في الصفائح وتكوّن تخثرات دموية
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.**

بالإمكان الإبلاغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك لإستشارة عبر الإنترنت للإبلاغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد هناك حاجة إليها. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

**شروط التخزين:**

- يجب التخزين تحت الـ 25°C.

#### 6. معلومات إضافية

**يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:**

**Tablet core:** lactose monohydrate, cellulose, microcrystalline (E460), croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose (E463), magnesium stearate (E470b)  
**Film-coating:** poly (Vinyl Alcohol) (E1203), titanium dioxide (E171), talc (E553b), glyceryl monostearate (E471), sodium laurilsulfate

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟**

- داساتينيب ساندوز 20 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا الجانبين مع ختم "20" على جانب واحد. عبوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصاً مطلياً.
- داساتينيب ساندوز 50 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي)، بيضاوية، محدبة على كلا الجانبين مع ختم "50" على جانب واحد. عبوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصاً مطلياً.
- داساتينيب ساندوز 70 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا الجانبين مع ختم "70" على جانب واحد. عبوة بليستر (شريحة) تحتوي على 60 قرصاً مطلياً.
- داساتينيب ساندوز 100 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي)، بيضاوية، محدبة على كلا الجانبين مع ختم "100" على جانب واحد. عبوة بليستر (شريحة) تحتوي على 30 قرصاً مطلياً.
- داساتينيب ساندوز 140 ملغ: أقراص مطلية بلون أبيض حتى أوف-وايت (أبيض مائل للرمادي)، مستديرة، محدبة على كلا الجانبين مع ختم "140" على جانب واحد. عبوة بليستر (شريحة) تحتوي على 30 قرصاً مطلياً.

**صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه:**

نوفارتيس إسرائيل م.رض. ص.ب. 7126، تل أبيب، إسرائيل.

تم التحرير في حزيران 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

**أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

- داساتينيب ساندوز 20 ملغ: أقراص مطلية: 173-07-36528-99
- داساتينيب ساندوز 50 ملغ: أقراص مطلية: 173-08-36529-99
- داساتينيب ساندوز 70 ملغ: أقراص مطلية: 173-09-36530-99
- داساتينيب ساندوز 100 ملغ: أقراص مطلية: 173-10-36531-99
- داساتينيب ساندوز 140 ملغ: أقراص مطلية: 173-11-36532-99

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.