

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אביבניר 250 מ"ג
טబליות

חומר פעיל וكمותו:
אבירטרון אצטאט 250 מ"ג

abiraterone acetate 250 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה פרק 2 "לפני השימוש בתרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".
קראו בעין את העלון עד סוףanim בטרם תשתחש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווחה.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך
כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אביבניר 250 מ"ג הינה תרופה מרשם המכילה חומר פעיל הנקרא אבירטרון אצטט.
אביבניר 250 מ"ג מעכbat את האנזים CYP17, תרופה זו ניתנת יחד עם פרדנייזון לטיפול.

- בסרטן ערמוני גורומי העמיד לשירות.
- בגברים מבוגרים שהם מאובחנים חדשים בסרטן ערמוני גורומי, רגיש להורמוניים, בסיכון גבוה
(mHSPC) בשילוב עם טיפול בהפחחת אנדרוגן (ADT).

קובוצה Terapeutic:
מעקב ספציפי של האנזים CYP17

**2. לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגש (אלרגי) לאבירטרון אצטט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה
התרופה. לרשותה המרכיבים הנוספים ראה פרק 6 "מידע נוסף".
 - אם את אישת ובפרט אישת בהירון. אביבניר 250 מ"ג מיועדת לשימוש בגברים בלבד.
 - אם אתה סובל מנזק חמור לנבד.
 - בשילוב עם Ra-223 (המשמש לטיפול בסרטן ערמוני).
- אם אחת מהנקודות מעלה מטיאות לך ליטול את התרופה. אם אין בטוח, הייעוץ ברופא או
ברוקח לפני נטילת התרופה.

ازהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה

לפני הטיפול באביבניר 250 מ"ג שוחח עם הרופא:

- אם אתה סובל מבעיות בכבד.
- אם אתה סובל מלחץ דם גבוה, אי ספיקת לב או רמות נמוכות של אשלגן בדם (רמות נמוכות של
אשלגן בדם עלולות להגביר את הסיכון לביעויות קצב לב).
- אם אתה סובל מבעיות לב אחירות או מבעיות בכלי הדם.
- אם אתה סובל מקצב לב לא רגיל או קצב לב מהיר.
- אם אתה סובל מקוצר נשימה.
- אם עליית במהירות משקל.
- אם יש לך נפייחות בכפות הרגליים, בקרסוליים או ברגליים.
- אם נטלת תרופה בשם קטוקונזול בעבר לטיפול בסרטן הערמוני.
- על הצורך בנטילת תרופה זו עם תרופה בשם פרדנייזון.
- על השפעות אפשריות על עצמותיך.
- אם יש לך רמות גבוזות של סוכר בדם.
- ספר לרופא אם ידוע לך על בעיות לב או כלי הדם, כולל בעיות בקצב הלב (הפרעת קצב –
אריתמיה) או אם אתה מטופל בתרופות למצבי אלו.

- ספר לרופא אם יש לך עור או עיניים בגוון צהוב, שתן כהה, בחילה חמורה או הקאות. כל אלו עלולים להיות תסמינים של בעיות בכבד. לעיתים נדירות כשל בתפקוד הכבד (נקרא acute liver failure) עלול לגרום ועלול להוביל למות.
 - אתה עלול לסבול מירידה בתאי דם אדומים, ירידה בחשך מני (libido), חולשת שרירים וכאבי שרירים.
 - אין ליטול איבניר 250 מ"ג בשילוב עם Ra-223Ra בגין העלייה בסיכון לשברים עצומות או מוות.
 - אם אתה מתכוון ליטול Ra-223Ra לאחר טיפול באיבניר 250 מ"ג ופרדניזון, עליך להמתין 5 ימים לפחות. תחילת הטיפול עם Ra-223Ra.
- אם אין בטוח אם התופעות המוזכרות רלוונטיות אליך, דבר על כך עם הרופא או הרוקח לפני נטילת התרופה.

ילדים וمتבגרים

התרופה אינה מיועדת לשימוש ילדים או במתבגרים. אם ילד או מתבגר בטועות בעל מהתרופה, יש לגשת מיד לבית החולים עם אריזת התרופה על מנת להראותו לרופא.

בדיקות ומתקבך

איבניר 250 מ"ג עלולה להשפיע על הכבד וייתכן שלא יהיה לך שם תסמינים. הרופא יבצע בדיקות דם מעט בעת במהלך הטיפול עם איבניר 250 מ"ג על מנת לבדוק תפקודו כבד.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקה, או אם לך חום לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

איבניר 250 מ"ג יכולה להגביר את ההשפעה של מספר תרופות, כולל תרופות לב, תרופות הרגעה, תרופות מסויימות לטיפול בסוכרת, תוספי תזונה (างון St John's wort) ותרופות אחרות. ניתן שהרופא יחליט לשנות את המינון של תרופות אלו. כמו כן, ישנן תרופות העולמות להגביר או להפחית את השפעתה של איבניר 250 מ"ג. תופעה זו עלולה לגרום להופעתן של תופעות לוואי או לחילופין, לפגוע ביעילות של איבניר 250 מ"ג.

תרופות אחרות הנלכחות עם איבניר 250 מ"ג

תרופות להפחחת אנדרגון עלולות להגדיל את הסיכון לעביעות קצב לב. ידע את הרופא אם אתה מקבל:

- תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב (างון כינידון, פרוקאננאמיד, אמיודארון וווטולו).
 - תרופות היודיעות כמעלות סיכון לעביעות קצב לב (างון מתדן – לשיכור כאב ודלקסיפיקציה של התמכרות לתרופות, מוקסיפילוקסצין – אנטיביוטיקה, אנטיפסיקוטיים – לעביעות נשויות חמורות).
- רצוי להזכיר רישמה של כל התרופות שאתה נוטל כדי לידע את הרופא או את הרוקח.

שימוש בתרופה ומהזן

אין לך חותם איבניר 250 מ"ג עם אוכל. נטילת איבניר 250 מ"ג עם אוכל עשוי לגרום לסתוגן כמות גדולה יותר מהנדרש וזה עלול לגרום לתופעות לוואי. יש ליטול טבליות איבניר 250 מ"ג כמונה יחידה פעמיים על קיבת ריקה. יש ליטול איבניר 250 מ"ג לפחות שעתים לאחר הארוחה ואין לאכול לפחות שעה לאחר נטילת איבניר 250 מ"ג.

הירין, הנקה ופוריות

איבניר 250 מ"ג אינה מיועדת לשימוש נשים.

תרופה זו עלולה להזיק לעובר אם היא ניטلت במהלך הירון.

על נשים בהירון או שעשוות להיכנס להירון לעיתים כפפות אם הן באות בмагע עם איבניר 250 מ"ג. על גבר המקיים יחס מיוחד עם אישת העשויה להיכנס להירון להשתמש בקונדומים בלבד בטעות. מנגעה יעל אחר.

על גבר המקיים יחס מיוחד עם אישת הרה להשתמש בקונדומים כדי להגן על העובר.

נהיגה ושימוש במכונות

איבניר 250 מ"ג אינה צפואה להשפיע על יכולת הנהיגה והשימוש במכונות.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

איבניר 250 מ"ג מכילה לקטוז. אם ידוע לך כי יש לך חסור סבירות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני תחילת נטילת איבניר 250 מ"ג.

אביבניר 250 מ"ג מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) ב- 4 טבליות שהן המינון היומי, כך שלמעשה היא נחשפת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. יש לקחת אביבניר 250 מ"ג עם פרדניזון בהתאם להוראות שקיבלת על ידי הרופא.

המינון המקורי בדרך כלל הוא 4 טבליות של אביבניר 250 מ"ג פעמיים ביום (1,000 מ"ג ביום). עבור סרטן ערמוני גורתי העמיד לסיירוס (CRPC) יש ליטול אביבניר 250 מ"ג עם 5 מ"ג פרדניזון פעמיים ביום.

עבור סרטן ערמוני גורתי רגיש להורמוניים (mHSPC) יש ליטול אביבניר 250 מ"ג עם 5 מ"ג פרדניזון מדי יום.

אין לעבר על המנה המומלצת.

"תכן שהרופא ישנה את המינון על פי הצורך.

אופן השימוש בתרופה:

יש לבולו את טבליות אביבניר 250 מ"ג בשלמותן.

אפשר לחצוץ את הtablilia, היהות שכן קזו ח齊ה.

אין לרסק, לכטוש או לעוזס את הtablilia.

יש לבולו טבליות אביבניר 250 מ"ג עם מים.

יש ליטול אביבניר 250 מ"ג על קיבת ריקה. אין לקחת אביבניר 250 מ"ג עם אוכל. נטילת אביבניר 250 מ"ג עם אוכל עשויה לגרום לדוליה יותר מהנדרש של התרופה להיספה וזה עלול לגרום לתופעות לוואי. אל תאכל דבר לפחות שעתיים לפני נטילת אביבניר 250 מ"ג ולפחות שעה לאחר נטילת אביבניר 250 מ"ג.

אביבניר 250 מ"ג נלקחת יחד עם תרופה הנΚראת פרדניזון. יש ליטול את הפרדניזון על פי הוראות הרופא.

יש ליטול פרדניזון בכל יום בזמן השימוש באביבניר 250 מ"ג.

"תכן שהייה צריך בשני המינון של פרדניזון אם חל שינוי במצב הרופאי. הרופא יורה לך אם עליך לשנות את כמות הפרדניזון שאתה נוטל. אל תפסיק נטילת פרדניזון אלא אם הרופא הורה לך להפסיק.

הוראות לפתיחה הבקבוק:

בקבוק הפלסטי מגיע עם פקק עמיד לפתיחה על ידי ילדים. יש לפתוח את הפקק על פי ההוראות הבאות:

• לחץ על פקק הפלסטי כלפי מטה תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון.

• הסר את הפקק

פקקים העמידים לפתיחה על ידי ילדים הורידו משמעותית את מספר מקרי ההרעלת הנגרמים על ידי תרופה בכל שנה.

אם נטلت מינון גבוה יותר מהמומלץ, או אם בטעות בעלILD מ-מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי בבית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול מנה של אביבניר 250 מ"ג או פרדניזון, יש ליטול את המנה הבאה למועדרת בזמן הרגיל.

אם שכחת ליטול מנה אחת של אביבניר 250 מ"ג או פרדניזון, היועץ ברופא מייד.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק נטילת אביבניר 250 מ"ג או פרדניזון ללא התיעצות תחילת עם הרופא.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באביבניר 250 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

הפסק ליטול את התרופה ופנה לרופא מיד אם אתה מרגיש אחת מהתופעות הבאות:
חולשת שרירים, עוויתות שרירים או דפוקות לב (פלפיטזיות). יתכן שאלהם סימנים של רמות נמוכות של אשלגן בדם.

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שモופיעות ביותר משתמש אחד מעשרה:

- נזלים ברגליים או בכפות הרגליים
- רמה נמוכה של אשלגן בדם
- עלייה בערכי תפקוד כבד
- לחץ דם גבוה
- זיהום בדרכי השתן
- שלישול

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות ש모ופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- רמה גבוהה של שומנים בדם
- כאב בחזה
- פעימות לב לא סדיות (פרפרו עליות)
- כשל לבבי
- קצב לב מהיר
- זיהום חמוץ הנקרא אלח דם (5%י)
- שברים עצומות
- קשיי עיכול
- דם בשתן
- פריחה

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) – תופעות שמוופיעות ב-1-1 משתמשים מתוך 1,000:
בעיות בבלוטת האדרנלן (קשרו לעוראה באיזוןמלחים ונזלים).

- קצב לב לא רגיל (אריתמייה)
- חולשת שרירים ו/או כאב שרירים

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמוופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000:
גירוי בריאות (דלקת נאדיות אלרגית – אלבאוליטיס אלרגית)

- כשל בתפקוד כבד (נקרא כשל כבד חרף)

תופעות לוואי שכיחותן לא ידועה:

התקף לב, שינויים ב-ECG (הארכית מקטע QT), תגובות אלרגיות חמורות עם קושי לבלו או לנשום, נפיחות בפנים, בשפתים, בלשון או בגרון, או פריחה מוגדת.
איבוד מסת עצם יכול להתרחש בגברים המטופלים באביבניר 250 מ"ג בהתחוויה של סרטן הערמוני. אביבניר 250 מ"ג בשילוב עם פרדניצון עלולה להגביר את איבוד מסת העצם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי **שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il/) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לكيישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מוחז להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כר תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה מתחת ל-25 מעלות צלזיום.
- חי מדף לאחר פתיחה ראשונה: 120 יום. יש לאחסן מתחת ל-25 מעלות צלזיום.
- יש להגן מאור.
- יש לאחסן את טבליות אביבניר 250 מ"ג באזיזה המקורית.
- אין להשילר שאריות תרופה שאינה בשימוש לאשפפה הביתי או למערכת הביבוב המקומית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינן צורך. אמצעים אלו יעזרו בהגנה על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide.

כיצד נראה תרופה ומה תוכן האזיזה:

- טבליות אביבניר 250 מ"ג הן בצביע לבן עד לבן בגוון קرم (off-white) בעלות צורה אוביאלית, בצד אחד של הטבליות מוטבע "A" ובצד השני מוטבע "250".
 - הטבליות מגיימות בקברוק פלסטי עם פקק פלסטי עמיד לפתיחה אקרואית על ידי ילדים.
 - כל בקברוק מכיל 120 טבליות. כל קרטון מכיל בקברוק אחד.
- יבואן ובעל הרישום וכותבתו: בייאביבניר בע"מ, רחוב דוד המלך 1, הרצליה פיתוח 4666101, ישראל.

שם היצרן וכתובתו:

AIZANT DRUG RESEARCH SOLUTIONS PVT. LTD., INDIA

Survey No. 172/173, Apparel Park Road, Dulpally Village; Qutbullapur Mandal, Hyderabad, Telangana 500100 India.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 172-52-37297-99

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.