

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تكفالي™ 10 ملغ/مل

تكفالي™ 90 ملغ/مل

محلول للحقن

المادة الفعالة

المادة الفعالة هي تكليستاماب (teclistamab).

- ° تكفالي 10 ملغ/مل - قنينة بحجم 3 مل تحتوي على 30 ملغ تكليستاماب
- ° تكفالي 90 ملغ/مل - قنينة بحجم 1.7 مل تحتوي على 153 ملغ تكليستاماب

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 2 بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
ووصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة إلى النشرة، تتوفر للمستحضر تكفالي بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج.
تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وأنباء العلاج بـ تكفالي والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

1. لأى غرض مخصص الدواء؟

تكفالي يستعمل كمستحضر منفرد لعلاج المرضى الكبار المصابين بالورم النقوي المتعدد (الماليوما) المتكرر والمقاوم، الذين تلقوا على الأقل ثلاث علاجات سابقة، بما في ذلك مستحضر من فصيلة المعدلات المناعية، مثبط للبروتيازوم وجسم مضاد ضد CD38 وقد أظهروا تقدماً في المرض خلال العلاج الأخير.

الفصيلة العلاجية: أضداد أخرى أحادية النسيلة وأضداد مرفقة للدواء (antibody drug conjugates)

L01FX24

كيف يعمل تكفالي؟

تكفالي هو جسم مضاد، وهو نوع من البروتين الذي تم تصميمه للتعرف على أهداف معينة في الجسم والإرتباط بها. تكفالي موجه ضد المستقبل BCMA (B cell maturation antigen) الموجود على سطح الخلايا السرطانية للورم النقوي المتعدد، وموجه ضد المستقبل CD3 (cluster of differentiation 3) الموجود على سطح خلايا الجهاز المناعي المسمّاة خلايا T. يعمل هذه الدواء من خلال الإرتباط بذاك الخلايا وتقريبها من بعضها البعض، بحيث يمكن الجهاز المناعي من تدمير الخلايا السرطانية للورم النقوي المتعدد.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
في حال لم تكن واثقاً إذا كنت حساساً (اليرجي)، تحدث مع طبيبك أو الممرضة قبل تناول تكميلي.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
قبل العلاج بـ تكميلي إحـ لـطـبـيـبـ إذا كـنـتـ قدـ عـانـيـتـ مـنـ سـكـتـةـ دـمـاغـيـةـ أـوـ مـنـ إـخـلـاجـ خـلـالـ الـأـشـهـرـ الـسـتـةـ الـأـخـيـرـةـ.

تكميلي واللقاحات

قبل العلاج بـ تكميلي إحـ لـطـبـيـبـ أوـ لـمـمـرـضـةـ إـذـاـ كـنـتـ قـدـ تـلـقـيـتـ لـقـاحـاـ مـؤـخـراـ أـوـ إـذـاـ كـنـتـ مـقـبـلاـ عـلـىـ تـلـقـيـ لـقـاحـ.ـ لاـ يـجـوزـ تـلـقـيـ لـقـاحـاتـ الـحـيـةـ بـدـءـاـ مـنـ 4ـ أـسـابـيـعـ قـبـلـ الـعـلـاجـ بـ تـكـمـالـيـ وـحـتـىـ 4ـ أـسـابـيـعـ بـعـدـهـ.

إـنـتـبـهـ لـلـأـعـرـاضـ الـجـانـبـيـةـ الـخـطـيرـةـ.

بلغـ طـبـيـبـ أوـ الـمـمـرـضـةـ فـورـاـ إـذـاـ كـنـتـ تـعـانـيـ مـنـ إـحـدـىـ الـأـعـرـاضـ التـالـيـةـ:

- علامات لإضطراب المعروف بـ "متلازمة إفراز السيتوكتينات" (CRS). متلازمة إفراز السيتوكتينات هي رد فعل مناعي خطير يتراافق بأعراض مثل سخونة، قشعريرة، غثيان، صداع، نظم قلب سريع، شعور بالدوار وصعوبة في التنفس.
- تأثيرات على الجهاز العصبي. الأعراض تشمل شعور بالإرتباك، شعور بتبدني اليقطة أو صعوبة في الكتابة. بعض هذه الأعراض قد تكون علامات لرد فعل مناعي حاد يسمى "متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية الفعالة" (ICANS).
- علامات وأعراض لحدوث تلوث.

بلغـ طـبـيـبـ أوـ الـمـمـرـضـةـ إـذـاـ كـنـتـ تـلـاحـظـ إـحـدـىـ الـعـلـامـاتـ الـمـذـكـورـةـ أـعـلـاهـ.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إعطاء تكميلي للأطفال أو للمرأهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

قبل تناول تكميلي، سيفحص طبيبك تعداد الدم لتشخيص وجود علامات لتلوث. إذا كنت تعاني من أي تلوث كان، فسيتم علاجه قبل بدء تناول تكميلي. بالإضافة إلى ذلك، سينتأكد طبيبك مما إذا كنت حاملاً أو مرضعة. أثناء العلاج بـ تكميلي، سيقوم طبيبك بمتابعتك لتشخيص أعراض جانبية. سيفحص طبيبك تعداد الدم بشكل منتظم، حيث من الجائز حدوث إنخفاض في عدد خلايا الدم وغيرها من مركبات الدم.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخرأً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إـحـ لـطـبـيـبـ أوـ لـلـصـيـدـلـيـ عنـ ذـلـكـ.

الحمل والإرضاع

ليس معروفاً ما إذا كان تكميلي يؤثر على الجنين أو إذا كان ينتقل إلى حليب الأم.

معلومات للنساء بشأن الحمل

بلغـيـ طـبـيـبـ أوـ الـمـمـرـضـةـ قـبـلـ تـلـقـيـ تـكـمـالـيـ إـذـاـ كـنـتـ حـامـلاـ،ـ تـنـبـيـهـ أـنـكـ قدـ تـكـوـنـيـ حـامـلاـ أـوـ تـخـطـطـيـنـ لـلـحـمـلـ.ـ إـذـاـ أـصـبـحـتـ حـامـلاـ أـثـنـاءـ الـعـلـاجـ بـهـذـاـ دـوـاءـ،ـ بـلـغـيـ طـبـيـبـ أوـ الـمـمـرـضـةـ فـورـاـ.ـ يـرـتـبـطـ تـكـمـالـيـ بـنـقـصـ چـامـاـچـلـوـبـولـينـ الـدـمـ (hypogammaglobulinaemia)،ـ لـذـاـ يـجـبـ النـظـرـ فـيـ تـقـيـيمـ نـسـبـ الـچـلـوـبـولـينـ الـمـنـاعـيـةـ لـدـىـ حـدـيـثـيـ الـولـادـةـ لـلـأـمـهـاـتـ عـوـلـجـ بـ تـكـمـالـيـ.

معلومات للرجال بشأن الحمل

إذا حدث حمل لدى شريكتك أثناء علاجك بهذا الدواء، بلغ طبيبك فوراً.

وسائل منع الحمل - معلومات للنساء قادرات على الحمل

إذا كنت قادرة على الحمل، فيجب عليك إستعمال وسائل منع حمل ناجعة أثناء العلاج ولمدة 5 أشهر بعد التوقف عن العلاج بـ تكافيلي.

وسائل منع الحمل - معلومات للرجال (الذين يستعملون تكافيلي)

إذا كانت زوجتك قادرة على الحمل، فيجب عليك إستعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال العلاج ولمدة 3 أشهر بعد التوقف عن العلاج بـ تكافيلي.

الإرضاع

ليس معروفاً ما إذا كان تكافيلي ينتقل إلى حليب الأم. لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بـ تكافيلي. إذا تم إتخاذ القرار بالتوقف عن العلاج بـ تكافيلي، فيجب عليك الإمتناع عن الإرضاع لفترة 5 أشهر بعد التوقف عن العلاج.

السيادة وإستعمال الماكنات

إن للدواء تأثير كبير في القدرة على السيادة وتشغيل الماكنات. قد يشعر بعض الأشخاص بالإرهاق، الدوار أو بالإرتباك أثناء إستعمال تكافيلي. لا يجوز السيادة، إستعمال الأدوات، تشغيل الماكنات الثقيلة أو القيام بنشاطات قد تعرضك للخطر حتى مرور 48 ساعة على الأقل بعد تلقي المقدار الدوائي الثالث من تكافيلي، أو وفقاً لتعليمات طبيبك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي تكافيلي على أقل من 1 ميليمول (23 ملг) من الصوديوم للمقدار دوائي، أي أنه عملياً "حالٍ من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بشأن المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي سيعتمد على وزن الجسم. أول مقدارين دوائين سيكونان منخفضين أكثر. يعطى تكافيلي كما يلي:

- ستتلقي 0.06 ملغ - كلغ من وزن الجسم في المقدار الدوائي الأول.
- ستتلقي 0.3 ملغ - كلغ من وزن الجسم في المقدار الدوائي الثاني بعد مرور 2-7 أيام.
- بعد ذلك، ستلتلقى مقدار دوائي داعم قدره 1.5 ملغ - كلغ من وزن الجسم بعد مرور 7-2 أيام من المقدار الدوائي الثاني.
- بعد ذلك، ستستمر في تلقي مقدار دوائي داعم مرة واحدة في الأسبوع طالما كنت تستفيد من تكافيلي.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

سيقوم طبيبك بمراقبتك من أجل الكشف عن أعراض جانبية بعد كل من المقادير الدوائية الثلاثة الأولى. سيفعل ذلك لمدة يومين بعد كل مقدار دوائي.

إذا كنت تعاني من أعراض جانبية، فيجب عليك أن تتمكث قريباً من مؤسسة طبية بعد المقادير الدوائية الثلاثة الأولى.

كيف يتم إعطاء الدواء

سيتم إعطاؤك تكافيلي من قبل طبيب أو ممرضة كحقنة تحت الجلد. تُعطى الحقنة في منطقة البطن أو الفخذ.

الأدوية الإضافية التي يتم إعطاؤها أثناء العلاج بـ تكثيفي ستتلقى أدوية 1-3 ساعات قبل كل واحد من المقادير الدوائية الثلاثة الأولى من تكثيفي، والتي ستساعد في تقليل الإحتمال لحدوث أعراض جانبية، مثل متلازمة إفراز السيتوكتينات. قد تشمل هذه:

- أدوية لتقليل الخطورة لرد فعل تحسسي (مضادات الهيستامين)
- أدوية لتقليل الخطورة للإلتهاب (كورتيكosteroides)
- أدوية لتقليل الخطورة للسخونة (مثل باراسيتامول)

من الممكن أن تتلقى هذه الأدوية أيضاً قبل المقادير الدوائية اللاحقة بناءً على الأعراض التي ستقايسها. من الممكن أن تتلقى أيضاً أدوية إضافية بناءً على الأعراض التي تقاسها أو بناءً على تاريخك الطبي.

إذا تلقيت مقداراً دوائياً مفرطاً (كمية أكثر من اللازم) من تكثيفي هذا الدواء يتم إعطاؤه من قبل طبيبك أو الممرضة؛ لذلك من غير المرجح أن تتلقى كمية أكثر من اللازم. في حال تلقيت كمية أكثر من اللازم (مقداراً دوائياً مفرطاً)، سيتحقق طبيبك من وجود أعراض جانبية لديك.

إذا نسيت موعد زيارتك للتقي تكثيفي

من المهم جداً الحضور لكافحة الزيارات. إذا فانتك زيارة، فقم بتعيين زيارة أخرى في أقرب وقت ممكن. يجب الموااظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تكثيفي قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أيًّا منها.

أعراض جانبية خطيرة

توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا طورت إحدى الأعراض الجانبية المهمة التالية، والتي قد تكون خطيرة ومميتة.

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- رد فعل مناعي خطير ("متلازمة إفراز السيتوكتينات") والذي قد يسبب سخونة، قشعريرة، غثيان، صداع، نظم قلب سريع، شعور بالدوار وصعوبة في التنفس
- نسبة منخفضة في الدم من الأجسام المضادة المسماة الچلوبولينات المناعية (نقص چاماچلوبولين في الدم)، ظاهرة قد تزيد من إحتمالية حدوث تلوثات
- نسب منخفضة من نوع معين من خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات)
- تلوث الذي قد يشمل سخونة، قشعريرة، إرتجاف، سعال، ضيق في التنفس، تنفس سريع ونبض سريع

أعراض جانبية شائعة - أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من عشرة:

- تأثيرات على الجهاز العصبي. قد تكون هذه علامات لرد فعل مناعي خطير يُعرف بـ "متلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية الفعالة" (ICANS). بعض الأعراض هي:

- شعور بالإرتباك

○ شعور بتدني اليقظة

○ صعوبة في الكتابة

بلغ طبيبك فوراً إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية إضافية مفصلة أدناه. بلغ طبيبك أو الممرضة إذا طورت إحدى الأعراض الجانبية.

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

• ألم

• تلوث في الرئتين (التهاب الرئتين)

• تلوث كوفيد 19 (COVID-19) الذي يسببه فيروس الكورونا (SARS-CoV-2)

• تلوث في الأنف، في الجيوب الأنفية، أو في الحنجرة (تلوث في المسالك التنفسية العليا)

• نسب منخفضة من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

• نسب منخفضة من الصفيحات الدموية في الدم (الخلايا التي تساعده في تخثر الدم؛ قلة الصفيحات)

• عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء)

• نسب منخفضة من نوع معين من خلايا الدم البيضاء (قلة الملافويات)

• نسبة منخفضة من الفوسفات، المغنيسيوم، أو من البوتاسيوم في الدم (hypophosphatemia، hypokalemia، hypomagnesemia

(hypercalcemia))

• ارتفاع في نسبة الكالسيوم في الدم

• ارتفاع في نسبة الفوسفات القلوي في الدم

• إنخفاض الشهية للطعام

• غثيان، إسهال، إمساك، تقيؤات

• صداع

• إصابة عصبية التي قد تسبب وخز، خدر، ألم أو فقدان الإحساس بالألم

• ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)

• نزف الذي قد يكون خطيراً

• سعال

• ضيق في التنفس (dyspnea)

• سخونة

• شعور بالإرهاق الشديد

• آلام في العضلات

• إنتفاخ في راحتي اليدين، الكاحلين، أو في راحتي الرجلين (وذمة)

• ردود فعل في موقع الحقن أو بقربه، بما في ذلك إحمرار في الجلد، حكة، إنتفاخ، ألم، كدمات، طفح، نزف

أعراض جانبية شائعة - أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من عشرة:

• تلوث خطير الذي ينتشر في الجسم بأكمله (إنتان الدم [sepsis])

• تلوث جلدي الذي يسبب الإحمرار (cellulitis)

• عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء من نوع معين المترافق بسخونة (نقص العدّلات الذي يتراافق بسخونة -

حمى نقص العدّلات)

• نسب منخفضة من الفبرينوجين، نوع من البروتين في الدم، مما يجعل تشكّل الخثارات أكثر صعوبة

- تغير في وظيفة الدماغ (encephalopathy)
- نسبة منخفضة من الكالسيوم أو من الصوديوم في الدم (hyponatremia) أو (hypocalcemia)
- نسبة مرتفعة من البوتاسيوم في الدم (hyperkalemia)
- نسبة منخفضة من الألبومين في الدم (hypoalbuminaemia)
- نسبة منخفضة من الأوكسجين في الدم (hypoxia)
- تزايد نسبة الچاما-چلوتاميل-ترانسفيراز في الدم
- تزايد نسبة إنزيمات الكبد (إنزيمات ناقلات الأمين) في الدم
- تزايد نسبة الكرياتينين في الدم
- تزايد نسبة الأميلاز في الدم (hyperamylasemia)
- تزايد نسبة الليپاز في الدم (hyperlipasaemia)
- قد تُظهر فحوص الدم أنه تتطلب فترة زمنية مطولة أكثر لتأخر الدم (INR مرتفع و- PTT مطول)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تتعارى من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة/الملصقة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين:

يتم تخزين تكميلي في المستشفى أو في العيادة من قبل الطبيب. يجب التخزين في البراد (2-8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد. يجب التخزين في العلبة الأصلية الحماية من الضوء.

لا يجوز إلقاء الدواء في المجاري أو في القمامنة المنزلية. سيقوم الطاقم الطبي بإلقاء الأدوية التي لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Sucrose, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, glacial acetic acid, EDTA disodium salt dihydrate, water for injections.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

محلول للحقن (حقنة)، سائل عديم اللون حتى لون أصفر فاتح.
 تكميلي يتوفّر ضمن علبة تحتوي على قنينة زجاجية واحدة.

صاحب الإمتياز: جي - سي هيلث كير م.ض، كيبوتس شفافيم 6099000، إسرائيل.

المنتج: يانسن بيولوجي بـ.في آينشتاينفيج 101 سـي بـي لـاـيـنـ، هـولـنـدا

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

نكثالي 10 ملغ/مل: 173 74 37566 00

نكثالي 90 ملغ/مل: 173 75 37567 00

تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

مستندًا على نشرة الدولة المرجعية الأوروبية EU من حزيران 2023.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

J-C 2023

TECV SOL PL SH 260723