

إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناول جرعة بمجرد أن تذكر، ولكن يمنع تناول جرعتين معاً باي حال من الحال. يجب الاستمرار في العلاج حسب التوصية الطبية.

إذا توقفت عن تناول الدواء: حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يمنع التوقف عن العلاج لتجنب الأعراض غير المرغوب فيها التي قد تحدث إذا تم إيقاف العلاج فجأة (مثل صداع، شعور سعي، أرق، عصبية).

- ارهاق
- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم
- عصبية
- اضطرابات في التبول
- الشعور بالعطش
- اعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - اعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 1,000:
 - اثارة، قلق، صعوبات في النوم، كوابيس
 - اخلاقاجات
 - رنين في الأذنين (طنين tinnitus)
 - ارتفاع ضغط الدم
 - اسهال، تقيؤ
 - طفح في الجلد، شرى (urticaria)، انفاس في الوجه واللسان
 - صعوبات في التبول
 - زيادة افراز حليب الأم أو توقف حليب الأم دون ارتفاع
 - ارتفاع الضغط داخل العين
 - انتفاخ
 - تفاقم قصور القلب
 - خلل في وظائف الكبد (مثل، ركود صفراوي)

اعراض جانبية نادرة (rare) - اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- قلة الشهية الشديدة، ارتباك شديد (خاصة لدى متعددي المنسن)، هلوسات • اضطرابات في نظم القلب أو النتنض - انفاس في الغدد اللمفاوية • تناقض الشعر • زيادة الحساسية لشوك الشمس • تناقض الشئي عند الرجال • سخونة • تناقض في الوزن • تناقص شاذة في فوهات الكبد

اعراض جانبية نادرة جداً - اعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- مرض عصنة القلب • الشعور بعدم راحة داخلي والحادية الماشية أن تكون في حركة دائمة • اضطراب في الأعصاب المحيطة • ارتفاع شديد في الضغط داخل العين ("torsade de pointes")

اعراض جانبية نادرة تسبب شعورها بالغ معروفة (اعراض لم يتم تحديدها بعد):

- قلة الشهية للطعام • ارتفاع أو انخفاض مستويات السكر في الدم • ذات كرياتي (paranoia) • اضطرابات الحركة (حركات لا إرادية أو تناقض في المركبة) • التهاب عضلة القلب التحتيسي • التهاب الكبد • هياب من الماء • رجفان في الميدين

لوحظ زيادة خطر الإصابة بكسرور في النظام لدى المتعالجين الذين تناولوا هذا النوع من الأدوية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير متكرر في التشرير، عليك استشارة الطبيب.

ال惕ية عن اعراض جانبية:
من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن اعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن اعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمرة عبر الانترنت للت bliغ عن الاعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن تناول الأدوية فيظام تتحقق من الملخص على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع التقارير الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الاعراض الجانبية

يجب التوجيه فوراً إلى الطبيب إذا كان لديك أي من الاعراض الجانبية التالية:

- نوبات من تشوش الوعي المقطعي، رؤية هالة ملونة حول نقاط الضوء أو الم في العينين.

يجب التوجيه فوراً لإجراء فحص للعينين قبل استمرارك بالعلاج، هذه الحالة قد تشير إلى حدوث جلوكوما حادة، وهو عرض جانبي نادر قد يحدث لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

متكلمة في القلب تسمى إطالة مقطع QT (يمكن كشفها من خلال تخطيط كهربائية ECG)، وهو عرض جانبي شائع قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 مستعملين.

إمساك شديد، التنافس في البطن، سخونة وتقيؤ. قد تظهر هذه الاعراض نتيجة اندساس الأمعاء الشديدة، عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

اصفرار الجلد وبرياض العينين (يرagan). قد تكون هناك مشكلة في الكبد. هذا عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

كمات، ترقز، شعور بهامش العين، تغير في الحدقة وسفرقة. قد تكون هذه الاعراض هي أول علامة على وجود مشكلة في الدم أو في نخاع العظام. متكلمة في الدم يمكن أن تتجلى في انخفاض عدد白细胞 (اللوكيماء) التي تحمل الأكسجين إلى الجسم) غالباً في الدم البهيسان (التي تساعد في محاربة العدوى) والصفائح الدموية (التي تساعد في التخثر). عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

أفكار أو سلوكيات انتحارية. عرض جانبي نادر قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل.

اعراض جانبية إضافية:
اعراض جانبية شائعة جداً (very common) - اعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل من بين 1,000:

1 من بين عشرة:

- تعب
- تعب
- ارتفاع في الميدين أو أجزاء أخرى من الجسم

• صداع

• نبض غير منظم، قوي أو سريع

• دوار عند الوقوف بسبب انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم الانصبابي)

• جفاف في الفم

• إمساك

• غثيان

• زيادة التعرق

• زيادة الوزن

• صعوبة أو بطء في النطق

• احتقان الأنف

اعراض جانبية شائعة (common) - اعراض تظهر لدى 1-10-1-100 مستعملين من بين 100:

• ارتفاع

• اضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي (انخفاض الرغبة الجنسية، مشاكل الانتصاب)

• اضطرابات في الأداء الأيضي

• تغيرات في التبول

• خدر أو الشعور بالوخز في الذراعين أو الرجلين

• اضطرابات في التناسق

• اتساع المعدة

• احتسار القلب

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:
قرص مطلي بلون أزرق سماوي، مكتوب من كلا الجانبين. على أحد جانبي القرص مفترش "D" والجانب الآخر ملمس.

تحتوي كل عبوة على 28 قرصاً.

اسم صاحب التسجيل والمصنع وعنوانه:
تباع عبر إسرائيل م.ض، شارع دفورا هشتا 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في أيام 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 172.41.36523.

لتبييض قراءة هذه النشرة وتهسيتها ورد النص بصيغة المذكرة. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.