

עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על ידי מרשם רפואי בלבד

ונטולין זריקות

כל אמפולה של 1 מ"ל מכילה את החומר הפעיל:
סאלבוטאמול (כסולפאט) 0.5 mg (0.5 מ"ג)

לרשימת החומרים הבלטי פיעלים ואלרגניים בתכשיר ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספת".
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
 תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ונטולין זריקות מיועדת למוגרים ומשמשת להקלת במצב של עווית סمفוניות חמורה (severe bronchospasm).
 ונטולין זריקות פועלת כמרחיבת סمفוניות בחסימה הפוכה של דרכי הנשימה.
 הרחבת הסمفוניות מתבצעת תוך זמן קצר (התחלת פעילות תוך 5 דקות) ולמשך טוחן קצר (4-6 שעות).

קבוצה רפואיית: אגוניסט סלקטיבי לאדרנורצפטור בטא-2.

ונטולין זריקות מכילה את החומר הפעיל סאלבוטאמול המשתיך לקבוצה של תרופות הנקראת מרחיבי סمفוניות.

- מרחיבי סمفוניות עוזרים לדרכי האויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה ויציאת אויר.
- הם עוזרים להקל על לחץ בבית החזה, צפופים ושיעול.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (סאלבוטאמול סולפאט), או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

אם אתה חושב שהמתואר מעלה נוגע אליך, אל תשתמש בונטולין זריקות. אם אין לך בטוח, התייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בונטולין זריקות.

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בונטולין זריקות, ספר לרופא אם:**

- יש לך לחץ דם גבוה.

- יש לך סוכרת.
- יש לך פעילות יתרה של בלוטת התannis.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדיר, דופק מהיר או תעוקת חזזה.
- אתה נוטל נגזרות קסנטיין (כמו תאופילין) או סטרואידים לטיפול בחץدم גבוה או במחלת לב.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץדם גבוה או במחלת לב.
- נטלת תרופות אחרות המשמשות להקלת על גודש באף (כמו אפדרין או פסואדואפדרין) או תרופות אחרות המשמשות לטיפול באסתמה.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

- אם אתה לוקח, או אם לוקח אחרונה, תרופות אחרות **כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח**. יש לידע במיוחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- תרופות לדופק לא סדיר או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנולול).
 - תרופות אחרות לאסתמה שלך.

מתן ונוטולין זריקות לא יעשה באותו המזמן עם אף תרופה אחרת.

שימוש בתרופה ומדוזן

ניתן להשתמש בוונטולין זריקות בכל שעות היום, עם או בלי אוכל.

הירון והנקה

אם את בהירון או מניקה, חשוב שיתacen שאת בהירון או אם את מתכוננת להרות, הטייעז עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שוונטולין זריקות תשפיע על יכולת הנהוג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהם.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל אמפולה של 5 מ"ל, לכן ניתן לומר כי היא למעשה נטולת נתרן.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

כיצד ניתנת הזרקה

ונטולין זריקות ניתנת בדרך כלל על ידי רופא או אחיות. ניתן להזריק אותה מתחת לעור (מתן תת-עורית [S.C.]), ישירות לווריד או לשיריר (מתן תוך-וורידי [I.V.] או תוך-שרירית [I.M.]).

אף פעם לא תדרש להזריק לעצמך את התרופה. היא תמיד ניתנת לך על ידי אדם אשר מוסמך לכך.

האמפולה כוללת מערכת פתיחה מסווג (One Point Cut) OPC וצריכה להפתח תוך כדי שימוש בהנחיות הבאות:

- החזק עם יד אחת את החלק התיכון של האמפולה.
- החזק עם היד השנייה את החלק העליון של האמפולה, כשהאגודל ממוקם מעל נקודת הצבע, ולחץ.

מתן תת-עוררי (S.C) או תור-שרירי (I.M.)

- המינון המקביל בדרך כלל הוא 8 מק"ג לכל ק"ג משקל גוף כל 4 שעות.

מתן תור-וורידי איטי (I.V.I)

- המינון המקביל בדרך כלל הוא 4 מק"ג לכל ק"ג משקל גוף.
- ההזרקה תבוצע באופן איטי וייתכן שאף ידרש מתן חוזר.
- ניתן למוחלט את נטולין זריקות ב-10 מ"ל מים להזרקה (Water for Injection).
- ניתן להזריק באופן איטי לתוך הווריד 5 מ"ל של הכנה מהולה (250 מק"ג ב- 5 מ"ל).

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבואה יותר

מתן נטולין זריקות יעשה תמיד תחת תנאים מבוקרים ובザירות. עם זאת, אם אתה חושב שניננתה לך מנת יתר של נטולין זריקות ספר עליך לרופא או לאחות בהקדם האפשרי. התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל.
- אתה תרגיש רעד.
- פעילות יתר (היפראקטיביות).
- חומצה עלולה להצטבר בגוף ולגרום לנשימה שלך להפוך למהירה.

תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך שעوت ספורות.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה מבלתי להיוועץ עם הרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנק נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זכוכית להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בנטולין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות הלואוי הבאות עלולות להופיע עם השימוש בתרופה זו:

תגובהות אלרגיות (אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים):

אם יש לך תגובה אלרגית, הפסיק להשתמש בנטולין זריקות ונסה לרופא מיד. סימנים של תגובה אלרגית כוללים: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או האגרון אשר עלולות לגרום לקשיי ביליה או קשיי נשימה, פריחה مجرדת, תחושת עלפון ו燒רחה והתמוטטות.

פונה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש שלבר פועם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (דפיקות לב). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה ולרוב חולפת לאחר שהשתמש בתרופת למשך זמן מה.
- יתכן שתרגיש שהדופק שלך לא סדיר או שהוא פועם פעימה נוספת.
- תופעות אלה עלולות להופיע ב- **פחות מ 1 מכל 10 אנשים**.

אם אחת מתופעות אלה מופיעה אצלך, פונה לרופא בהקדם האפשרי. **אל תפסיק להשתמש בתרופת אלא אם נאמר לך לעשות כן.**

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלואין הבאות, אשר עלולות גם הן להופיע במהלך השימוש בתרופת זו:

תופעות לוואי שכיחות מודע

אללה עלולות להופיע ב- **יותר מ 1 מכל 10 אנשים**:

- תחושת רעד.

תופעות לוואי שכיחות

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10 אנשים**:

- כאב ראש.
- התכווצויות שריריים.

תופעות לוואי נדירות

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000 אנשים**:

- רמה נמוכה של אשלגן בדם.
- זרימת דם מוגברת לגפיים (התרחבות פריפריאלית).

תופעות לוואי נדירות מודע

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10,000 אנשים**:

- שינויים בדףו' שינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

תופעות לוואי אחרות

תופעות הלואין הבאות עלולות גם להופיע אך שכיחותן אינה ידועה:

- עקצוץ או כאב כאשר הזרקה ניתנת ישירות לתוך השדרה.
- תחושת חולץ (בחילה והקאות).
- כאב בבית החזה בגלל בעיות לב כמו תעוקת חזזה (אנגינה). ספר לרופא, אחות או רוקח אם זה מתרחש. אל תפסיק להשתמש בתרופת אלא אם נאמר לך לעשות כן.
- מצב הקרי "חמצת לקטית" (Lactic acidosis) אשר עלול לגרום לכabi בטן, נשימת יתר, קוצר נשימה, ידים ורגליים קרות, דופק לא סדיר או תחושת צמא.

אם אתה חושב שתרופת זו אינה פועלת מספיק טוב עבורך

אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כראוי, פונה לרופא בהקדם האפשרי.

ייתכן כי בעית הנשימה שלך מחמירה ויתכן שאתה צריך תרופה אחרת. אל טיפול מנה נוספת של ונטולין זיקות אלא אם הרופא הורה לך על כן.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/](http://www.health.gov.il/))

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם ותווך ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת滂ואה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂ואה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- -30°C .
- יש לשמר את האמפולות בתוך אריזת הקרטון כדי להגן מפני אור.
- יש להשמד 24 שעות לאחר מכן ההכנה.
- אם נאמר לך להפסיק להשתמש בתרופה, החזר את תרופה ונטולן זריקות שלא חל בה שימוש לרוקח לצורך השמדה.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתי. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. עדדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- בנוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
Sodium chloride, sodium hydroxide, dilute sulphuric acid, water for injection, nitrogen.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אריזת הקרטון כוללת 5 אמפולות זכוכית (כל אמפולה מכילה 1 מ"ל) הנמצאות בתוך מגשית מפלסטיק. 5 מ"ל מכילים 2.5 מ"ג סאלבוטאמול (כסולפאט) בתוך תמיסת מלח (סליין) סטנדרטית סטרילית שהותאמת לערך pH של 3.5.
- בעל הרישום: גלקסומימטיקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.
- יצור: גלקסומימטיקלין מניאופקטורייניג A.C.P., פארומה, איטליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
027-64-21556-05
- לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלו.

Ven Inj PT v1