

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"א- 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

**קוטליק
20 מ"ג**

טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה:

Cobimetinib 20 mg (קובימטיניב 20 מ"ג)

לمزيد על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - " מידע נוספת".

קריאה בעיון את העلون עד סוףו לפני שימוש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- שמור את העلون. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
- בנוסף, לתכשיר קוטליק קיימים כרטיסים מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בקוטליק ולפועל על פיו. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעalon לצריכן לפני השימוש בתכשיר. יש לשמר את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

קוטליק מיועדת לטיפול במוגרים מעל גיל 18.**(1) למה מיועדת התרופה?**

קוטליק מיועדת לטיפול בסרטן העור מסווג מלנומה גורטוריתית, או שאינה נתיחה, בשילוב התרופה ומורא芬יב (vemurafenib), בחולים עם המוטציה 600V בחלבון הנקרוא BRAF.

קוטליק מיועדת לטיפול ייחיד במוגרים לטיפול בנאופלסמות היסטויוציטיות.

כיצד עובדת התרופה?

התרופה מכוננת לחלבון הנקרוא "MEK" שהוא בעל חשיבות בויסות התפתחות התא הסרטני. כאשר קוטליק ניתנת בשילוב עם ומורא芬יב (תרופה אשר מכוננת לחלבון "BRAF" שעבר מוטציה), ישנה האטה נוספת או עצירה של התפתחות הסרטן.

קובצתה תרפואיית
אנטי ניאופלסטיים – מעכבי פרוטאין קינאזות

(2) לפני השימוש בתרופה**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (cobimetinib), או לפחות אחד מרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6 – " מידע נוספת").

אם אין לך בטוח, פנה לרופא שלך לפני התחלת הטיפול בקוטליק.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בקוטליק, ספר לרופא אם יש לך:

דימום

קוטליק יכול להגרום לדימום חמוץ, במיוחד במקרים או בקייבת (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי", בחלק הדן בדימום חמוץ). ספר מיד לרופא אם יש לך דימום לא רגיל או אחד מהתסמינים הבאים: כאבי ראש, סחרחות, הרגשת חולשה, דם בצוואר או צואה שחורה והקאות דם.

בעיות בעיניים

קוטליק יכולה לגרום לבעיות בעיניים [ראה סעיף 4 – "טיפול לוואי", בחלק הדן בעיות בעיניים (בראייה)].

ספר מיד לרופא שלך אם מופיעים התסמינים הבאים: טשטוש בראשית, הפרעות בראשית, אובדן ראייה חלקית או כל שינוי אחר בראשית הטיפול. הרופא שלך יבדוק את עיניך בכל מקרה של בעיות חדשות, או החמרה של בעיות קיימות בראשית, במהלך הטיפול בקוטליק.

בעיות לב

קוטליק יכולה להפחית את כמות הדם המוזרם על ידי ליבך (ראה סעיף 4 – "טיפול לוואי", בחלק בעיות לבביות). הרופא שלך יורה לך לבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול בקוטליק כדי לבדוק את יכולת ליבך להזרם דם. ספר מיד לרופא שלך אם אתה מרגיש שליבך חולם בחוזקה, פועם במהלך או בזמן עצור בלבתי סדרה או אם יש לך סחרחות, תחושת שחזור, קוצר נשימה, עייפות או נפיחות ברגליים.

בעיות בכבד

במהלך הטיפול בקוטליק יכולה להעלות רמות אנזימי כבד מסוימים בדם. הרופא שלך יורה לך לבצע בדיקות דם כדי לבדוק את רמות האנזימים הללו וכן על מנת לעקוב אחר תפקוד הכבד שלך.

בעיות בשירים

קוטליק יכול לגרום לרמות גבוהות של קרייטין פוספokinaz, אנזים שנמצא בעיקר בשיר, בלבד ובמוח. מצב זה יכול להיות סימן לפגיעה בשיר (רבdomiolיזיס) (ראה סעיף 4 – "טיפול לוואי", בחלק הדן בעיות בשירים). הרופא המתפל יפנה אותך לבצע בדיקות דם על מנת לנטר מצב זה. ספר מיד לרופא המתפל אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים: כאבים בשירים, התכווצויות שרירים, חולשה, שתן בצד ימין או אדום.

שלשול

ספר מיד לרופא שלך אם יש לך שלשול. שלשול חמוץ יכול לגרום לאיבוד נזלים בגוף (התיבשות). מלא אחר הוראות הרופא שלך כדי לדעת מה לעשות על מנת למנוע או לטפל בשלשול.

ילדים ומתבגרים

קוטליק אינה מיועדת לטיפול ילדים ובמתבגרים. הבטיחות והיעילות של בקוטליק במטופלים מתחת לגיל 18 טרם הتبססו.

קוטליק ותרומות אחרות

אם אתה לוקח או אם לך קצת לאחרונה תרומות אחרות, כולל תרומות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופח. הסיבה לכך היא שלקוטליק יכולה להיות השפעה על אופן פעולתן של תרומות אחרות. בנוסף, לתרומות אחרות יכולה להיות השפעה על אופן הפעולה של בקוטליק.

לפני הטיפול בקוטליק, ספר לרופא שלך אם אתה נוטל את התרומות הבאות:

תרופה	מטרת השימוש בתרופה
איטראקונازול, קלריטרומיצין, אריטרומיצין, טילטרומיצין, ווריكونאנזול, ריפאמפיצין, פוסאקונאנזול, פלאקונאנזול, מיקונאנזול	טיפול בזיהומים חידקיים או פטריטיים מסוימים
ריטונאביר, קובייסטאט, לופינאביר, דלאבידין, אמפרנאנאביר, פואאמפרנאנאביר	טיפול בזיהום ב- VII (נגיף כשל חיסוני אנטומי)
טלפוביר	טיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג C
נפדוון	טיפול בדיכאון
אממידארון	טיפול בקצב לב לא סדיר
דילטיאזם, וראפאAMIL	טיפול בלחץ דם גבוה
אימטיניב	טיפול בסרטן

לטיפול בעוויותות (פרכויסים)	קארבאמזפין, פניטואין
תרופה ממקור צמחי עבור טיפול בדיכאון. תרופה זו אינה זמינה ללא מרשם	סנט ג'ון וורט (תמצית צמח ההיפריקום)

שימוש בתרופה עם מזון ושתי

יש להימנע מליטול את התרופה עם מיצ' אשכליות, מכיוון שמי' אשכליות עלול להעלות את כמות התרופה בדם.
ניתן ליטול את התרופה קוטליק עם או בלי מזון.

הירין והנקה

אם הנך בהירין או מיניקה, חשוב שתא עלולה להיות בהירין או מתכנתה להיכנס להירין, היועץ ברופא שלך לפני השימוש בתרופה זו.

- קוטליק אינה מומלצת לשימוש במהלך הטיפול במלר - לרמות שההשפעות של קוטליק לא נחקרו בנשים הרות, התרופה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לעובר או למומים מולדים.
- אם כניסה להירין במהלך הטיפול בקוטליק או בשלושת החודשים לאחר הטיפול האחרון, ספרי מיד לרופא שלך.
- לא ידוע אם התרופה מופרשת בחלב אם. הרופא שלך ידוע עמו לגבי הסיכונים והתועות בתנועת בנטילת קוטליק, במידה והינך מיניקה.

אמצעי מניעה

נשים בגיל הפוריות צרכות להשתמש בשני סוגי אמצעי מניעה ייעלים [כמו קונדומים או חסם אחר למעבר הזרע (עם קוטליק, במידת האפשר)] במהלך הטיפול ולמשך שלושה חודשים לפחות לפחות לאחר סיום הטיפול. שאלית את הרופא שלך לגבי אמצעי המונעה המתאימים ביותר עבורך.

גיהגה ושימוש במכונות

קוטליק יכול להופיע על יכולתך לנוהג או להשתמש במכונות. היועץ מנהיגה או משימוש במכונות אם יש לך בעית בראייה או בעיתות אחרת אשר עלולות להופיע על תפקודך, למשל אם אתה מרגיש מסוחר או עייף. היועץ ברופא שלך, אם אין בטוח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טבליות קוטליק מכילות לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך חוסר סבילות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא שלך לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.
תרופה זו מכילה לפחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבילה ולכן נחשבת 'נטולת נתרן'.

כיצד תשתמש בתרופה?

(3) תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא שלך או הרוקח אם אין בטוח.

מינון מקובל

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא שלוש טבליות (סך הכל 60 מ"ג) ביום.

- יש ליטול את הטבליות כל יום לפחות 21 ימים (נקרא "תקופה טיפולית").
- לאחר 21 ימים, אין ליטול טבליות קוטליק לפחות 7 ימים. במהלך שבעת ימי הפסקה של הטיפול בקוטליק, עליך להמשיך לקחת את התרופה ומוראפניב (vemurafenib) כפי שהוראה לך הרופא שלך.
- התחל את התקופה הטיפולית הבאה שלך עם קוטליק (21 ימי טיפול) לאחר שבעת ימי הפסקה.
- אם יש לך תופעות לוואי, יתכן שהרופא שלך יחליט להפחית את המינון, להפסיק זמני או להפסיק לצמצמות את הטיפול. תמיד יש ליטול את התרופה בבדיקה כפי שהרופא שלך הורה לך. אין לעבר על המנה המומלצת.

נטילת התרופה

- בלע את הטבליות בשלהמונן עם מים.
- ניתן ליטול את התרופה קוטליק עם או בלי מזון.
- יש להימנע מליטול את התרופה עם מיצ' אשכליות.

בדיקות ועקב

- הרופא שller יורה לך לבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול בקטוליק כדי לבדוק את יכולת ליבך להזרים דם.
- הרופא שller יורה לך לבצע בדיקות דם כדי לבדוק את רמות אנזימי הכבד וכן על מנת לעקוב אחר תפקוד הכבד שלך.
- הרופא שller יבדוק את עיניך כדי לבדוק אם יש לך בעיות ראייה חדשות, או כאלה שהוחדרו, בזמן הטיפול בקטוליק.

אם הנrk מקיים לאחר נטילת התרופה, אל תיקח מינון נוסף של קוטוליק באותו היום. המשך לקחת את התרופה כרגע, ביום לאחר מכן.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר של קוטוליק, מהמיןון שלו הורה הרופא, פנה מיד לרופא. קח את אריזת התרופה ועלין זה איתך.
אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בלבד מ-12 מילימטרים מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה קוטוליק בזמן הדרוש, יש לנוהג לפי ההוראות הבאות:

- אם מדובר ביוטר מ-12 שעות לפני מועד נטילת המנה הבאה, קח את המנה שנשכחה ברגע שנזכרת.
- אם מדובר בפחות מ-12 שעות לפני המנה הבאה, אין ליטול את המנה שנשכחה ויש לדלג עליה. יש לחכות וליטול את המנה הבאה בזמן הקבוע שלך.
- אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה, כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה קוטוליק

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

כיצד תוכל לשיע להצלחת הטיפול?

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם

הן זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי

(4)

כמו בכל תרופה, השימוש בקטוליק עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.
אם יש לך תופעות לוואי, יתכן שהרופא שלך יחליט להפחית את המינון או להפסיק זמני או לפחות את הטיפול.
נא עיין גם בעלון של התרופה ומורא芬יב (dabrafenib), אשר ניתן בשילוב עם קוטוליק.

תופעות לוואי חמורות

יש לפנות מיד לרופא אם אתה מביח בתופעות הלואוי הרשומות מטה או אם הן חמירות במהלך הטיפול:

- **דימום חמור** (תופעות לוואי שכיחות אשר עלולות להשפיע על עד משלשה אחד מתוך עשרה):
קטוליק יכולה לגרום לדימום חמור, במיוחד במקרים או בקייבת. כתלות באיזור הדימום, תסמינים עלולים לכלול:
 - כאבי ראש, סחרורת או חולשה
 - הקאות דם
 - כאבי בטן
 - צואה בצבע אדום או שחור
- **בעיות בעיניים (בראייה)** (תופעות לוואי שכיחות מאוד אשר עשויות להשפיע על יותר משלשה אחד מתוך עשרה):

קוטליק יכולה לגרום לביעות בעיניים אשר חלקן עלולות להיות תוצאה של מצב הנקרא "רטינופתיה נסיבית" (serous retinopathy), הנובע מהאטברות של נוזל מתחת לרשתית העין.

תסמניהם של "רטינופתיה נסיבית" כוללים:

- טשטוש בראשית
- הפרעות או עייפות בראשית
- אובדן ראייה חלקי
- שינויים נוספים בראשית

• **בעיות לבביות** (תופעות לוואי שכיחות אשר עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך עשרה).

קוטליק יכולה להפחית את כמות הדם המזרם על ידי ליבך. התסמינים כוללים:

- סחרחות
- תחושת סחרור
- הרגש קוצר נשימה
- עייפות
- הרגשה שהלב הולם בחזקה, פועם במהירות או בצורה בלתי סדירה
- נפיחות ברגליים

• **בעיות בשירים** (תופעות לוואי לא שכיחות אשר עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך עשרה מאה):

קוטליק יכולה לגרום לפירוק שרירים (רבדומיליזיס). התסמינים עלולים לכלול:

- כאבי שרירים
- התכווצויות שרירים וחולשת שרירים
- שタン בצבוע כהה או אדום

• **שלשול** (תופעת לוואי שכיחה מאוד: עלולה להשפיע על יותר מאשר אחד מתוך עשרה משתמשים). פנה מיד אל הרופא שller אם יש לך שלשול ומלא אחר הוראות הרופא כדי לדעת מה לעשות על מנת למנוע או לטפל בשלשול.

תופעות לוואי נוספים

פנה לרופא שller אם הנר מביח בתופעות הלואין הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר מאשר אחד מתוך עשרה):

- הגברת רגשות העור לאור שמש;
- פריחה בעור;
- בחילה;
- חום;
- צמרמוורות;
- עליה בرمמות אנטומי הכבד, הנראית בבדיקות דם;
- תוצאות לא תקין של בדיקות דם בהקשר לערכי קראטין פוספורינאז, אנזים הנמצא בעיקר בלב, במוח ובשרי השלד;
- הקאות;
- פריחה בעור עם אזורים שטוחים שעברו שינוי צבע או בליטות מוגבהות כמו אקנה (אדומות ומלאות מוגלה) בפנים, קרכפת, חזה או גב עליון;
- לחץ דם גבוה;
- אנדמיה (רימה נמוכה של תא דם אדום);
- דימום;
- התעבות לא נורמלית של העור
- נפיחות בדרך כלל ברגליים (בצקת פריפריאלית)
- עור מגדר או יבש
- זיהום כלשהו
- עייפות
- נפיחות בזרועות, רגליים או כפות רגליים או כל חלק אחר בגוף
- קלקל קיבת או צרבת
- זיהום בדרכי השתן
- בעיות בריאות

- תופעות לוואַי שיכחות (עלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך עשרה):
 - סוגים של סרטן העור [כמו קרצינומה של תא היבסיס (basal cell carcinoma), קרטזינומה תא קשך (cutaneous squamous cell carcinoma), קרטואקנתומה (keratoacanthoma)ect];
 - התיבשות, כאשר לגוף שלא אין מספיק נזלים;
 - ירידה ברמות הזרחן, הסידן, האשלגן או הנתרן (הנראית בבדיקות דם);
 - עליה ברמת הסוכר (הנראית בבדיקות דם);
 - עליה של פיגמנט הכלב (הנקרא "בילירובין") בדם. סימנים לכך כוללים הצהבה של העור או העיניים;
 - דלקת ריאות אשר יכולה לגרום לקשי נשימה ועלולה להיות מסכנת חיים (הנקראת "pneumonitis").
 - עליה ברמת קרייטינין בדם.

אם הופיעה תופעת לוואַי, אם אחת מתופעות הלוואַי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואַי שלא צינה בעלוֹן, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואַי

ניתן לדוח על תופעות לוואַי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואַי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואַי או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il>

(5) איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבלייסטר והאריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אין לאחסן את התרופה מעל ל - 30°C.
- אין להשליך את התרופה לפח האשפה הביתי או למי הבוב. שאל את הרוקח כיצד להשליך את התרופה בצד להגן על הסביבה.

(6) מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם (אנא ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה":

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, film-coating mixture (polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol/PEG 3350, talc).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?

קוטליק 20 מ"ג - טבליות מצופות, לבנות ועגולות עם הטבעת הכיתוב "COB" בצד אחד.
ישנו גודל אריזה זמין אחד: 63 טבליות (שלושה בליסטרים של 21 טבליות).

בעל הרישום וכתוותנו: רוש פרמצטטיקה (ישראל) בע"מ, ת.ד. 6391, הוד השרון 4524079.

שם היצרן וכתוותנו: הוֹפְּמָן - לה רוש בע"מ, באצל, שו"ץ.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-34546-38-156.

שם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.