

**ريفار تيقع 10 ملغ
أقراص مطالية**

يحتوي كل قرص مطلي على:

(Rivaroxaban 10 mg) للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بامتناع حتى تفهمها قبل استعمال الدواء. يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

بالإضافة إلى النشرة الطبية، فإن المستحضر ريفار تيقع توجيه بطاقة معلومات وقائية لمتلقى العلاج. تتحملي هذه البطاقة على معلومات هامة يتوجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بريفار تيقع وخلال، وعلىك اتباعها.

يجرب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمتلقى العلاج ونشرة المستهلك الطبية بتمعن قبل البدء باستعمال المستحضر.

يجرب الاحتفاظ ببطاقة النشرة لمعاينة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

ريفار تيقع 10 ملغ مخصص لم:

- منع تكون خثرات الدموية في الأوردة، لدى البالغين بعد جراحة اختيارية لاستبدال الورك أو الركبة.

- منع معاودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (الختار الوريدي العميق) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (الانصمام الرئوي) لدى البالغين، بعد إنعام 6 أشهر علاجية للختار الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي السابق.

الفصيلة العلاجية: ينتهي ريفار تيقع 10 ملغ إلى فصيلة الأدوية المسماة مضادات التخثر ويعلم عن طريق تقليل الميل إلى تكون خثار دموية وذلك عن طريق حجب عامل مرتبط بعملية التخثر (العامل 10a/Xa).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (رجيم) لريفاروكسابان أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (الحصول على معلومات عن المركبات غير "الفعالة انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية").

- كنت تعاني من نزيف دموي متزايد.

- وجد لديك مرض رخمة أو نزيف دموي في الجسم يزيد من خطر نشوء نزيف دموي خطير (مثل: فرحة المعدة، رخمة أو نزيف دموي في المخ، جراحة في الدماغ أو العينين تمت مؤخرًا).

- كنت تستعمل أدوية لمنع تخثر واحد إلى آخر أو عندما تلقى هيبارين من خلال حالات الانتقال من العلاج بمضاد تخثر واحد إلى العلاج بأخر أو عندما تلقى هيبارين من خلال قسطر وريدي أو شريانه مثقبًا (وارفارين، دابيجاتران، آبيكسابان أو هيبارين)، باستثناء قسطر وريدي أو شريانه مثقبًا.

- كنت تعاني من مرض في الكبد يسبب ارتفاعًا في خطر نشوء نزيف دموي.

- كنت حاملاً أو مريضاً.

لا تتناول ريفار تيقع 10 ملغ وأخير طبتك إذا أطريق عليك أحد الأوضاع المذكورة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحدد استعمال ريفار تيقع 10 ملغ توخي الحذر بشكل خاص. قبل العلاج بريفار تيقع 10 ملغ، أخبر الطبيب:

إذا كنت معروضاً لخطرة عالية لنشوء نزيف دموي مثلاً قد يكون في إحدى الحالات التالية:

○ مرض كلوبي بدرجة متوسطة أو خطيرة، لأن وظيفة الكلبين قد تؤثر على كمية الدواء الذي يعمل في جسمك.

○ كنت تستعمل أدوية أخرى لمنع خثار دموية مثل: وارفارين، دابيجاتران، آبيكسابان أو هيبارين، عندما تلقى هيبارين من خلال قسطر وريدي أو شريانه مثقبًا (انظر لاحظ في البند 2 - "التفاعلات بين الأدوية").

○ كنت تعاني من نزيف دموي.

○ ضغط مرتفع جداً وغير متوازن بواسطة العلاج الدوائي.

○ مرض في المعدة أو في الأمعاء قد يسبب نزيفًا دمويًّا، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب في المريء، تتجدد، مثلاً، لمرض الارتجاع المعدي المريني (مرض يعلو فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام موضعة في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.

○ مشكل في الأوعية الدموية في شبكة العين (اعتلال الشبكية).

○ مرض رئوي توسيع فيه الشعب الرئوية ومتصل بالإفرازات القحية (برونكيكتازيس - توسيع القصبات) أو نزيف دموي سافق من الرئة.

○ إذا وجد لديك صمام قلبي اصطناعي.

إذا انتبهت إلى أنك تعاني من مرض اسمه ملازمة أصادم الغوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي بسبب ازدياد في خطرة نشوء خثار دموية)، فأخير طبتك وهو سيفر ما إذا كان يجب تغيير العلاج.

إذا ددد الطبيب أن ينفع دمك غير مستقر أو إذا خطط لاجلك علاج جراحي أو علاج آخر لإزالة الخثرة الدموية من الرئتين.

إذا انتبهت عليه أحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخير الطبيب قبل استعمال الدواء. سيفر الطبيب ما إذا كان يجب معالجاته بريفار تيقع 10 ملغ وما إذا كنت بحاجة إلى متتابعة عن كتب.

إذا اعتقد الطبيب أنك معزز لخطر متزايد لتطوير فرحة المعدة أو الأمعاء، فيجتنب أن يعطيك أيضًا علاجًا لمنعها.

إذا كان علىك الخصوص لعملية جراحية

من المهم هذا تناول ريفار تيقع 10 ملغ قبل وبعد الجراحة، بالضبط في الأوقات التي حدها لك الطبيب.

إذا كانت جراحتك تتضمن قسطراً أو حقنة داخل النخاع (مثلًا التخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي أو لتسكين الألم):

○ من المهم جذا تناول ريفار تيقع 10 ملغ بالضبط في الأوقات التي حدها لك الطبيب.

○ راجع الطبيب المعالج فورًا إذا كنت تعاني من خدر (انعدام الإحساس) أو من ضعف في الرجلين أو من مشكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد تلاشي التخدير، لأن هناك حاجة إلى تدخل طبي طاري.

الأولاد والمرأهون

هذا الدواء غير مخصص للأولاد والمرأهين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا.

لا تتوفر معلومات كافية حول الاستعمال لدى الأولاد والمرأهين.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت كنت تعامل ريفار تيقع 10 ملغ أخرى مما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب

وإضافات غذائية، فأخير الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

○ أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: طوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، يوكسكونازول) باستثناء تلك المخصصة فقط للذهن على الجلد.

○ أدوية تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج - وهي حالة ينبع فيها الجسم فائضًا من الكورتيزول.

○ أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريثروميسين، إيرثروميسين).

○ أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج التلوثات فيروس العوز المناعي البشري (HIV)/مرض الإيدز (مثل: رينوفان).

○ أدوية أخرى مضادة للالتهاب ومسكبة للآلام (مثل: نابروكسين أو حمض الأسبيتيل ساليسيليك [الأسبيرين]).

○ درونوبرازون، دواء لعلاج التهاب المعدة، ولا روكوب الدراجة الهوائية، ولا استعمال أو مثبطات استرداد أدوية متزايدة في الكتاب (مثل: بروتاكوتريبتان [متىكتريبتان]) أو مثبطات استرداد السيروبرازون والفالوبينيترين [SNRIs].

إذا انتبهت علىك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخير الطبيب قبل استعمال ريفار تيقع 10 ملغ وما تؤدي إلى تزايد فعالية ريفار تيقع 10 ملغ. سيفر طبتك ما إذا كان سيعالجك بريفار تيقع 10 ملغ إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كتب.

ذلك، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

○ أدوية معينة لعلاج المصرع (مثل: فينتوتين، كاربامازين، فينوباربital).

إذا انتبهت علىك إحدى الحالات المذكورة أعلاه فأخير الطبيب قبل استعمال ريفار تيقع 10 ملغ مع الطعام. سيفر طبتك ما إذا كان سيعالجك بريفار تيقع 10 ملغ إذا كانت هناك حاجة إلى مراقبة طبية عن كتب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيقع 10 ملغ مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الأضاع والخصوبة

لا تستعمل ريفار تيقع 10 ملغ إذا كنت حاملاً أو مريضاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحملي، فعليك استعمال وسيلة موثق بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار

تقع 10 ملغ.

إذا حلت خال فترة استعمال الدواء، فراجع الطبيب فورًا وهو سيفر بشأن استمرار العلاج.

السيارة واستعمال الماكينات

قد يسبب ريفار تيقع 10 ملغ الدوار (وهو عرض جانبي شائع) أو الإغماء (وهو عرض جانبي غير شائع) (انظر البند 4 - "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ولا ركوب الدراجة الهوائية، ولا استعمال الأدوات أو تشغيل الماكينات في فترة استعمال ريفار تيقع 10 ملغ إذا ثارت من هذين العرضين.

معلومات ملخصة عن بعض مركبات الدواء

يجربون النساء على الالكترون والصوديوم.

إذا اخترك الطبيب بذلك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل أن تبدأ باستعمال ريفار تيقع 10 ملغ.

يجربون النساء على مليلمول من الصوديوم (23 ملخ) في كل قرص ولذلك يعتبر بشكل جوهرى "حالياً من الصوديوم".

3. كيف يستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج ي Siddiq ميسددهما الطبيب فقط.

4. لم يتم تكوين خثار دموية في الأوردة بعد جراحة استبدال الورك أو الركبة، الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

فروع واحد (10 ملغ) مرة واحدة في اليوم.

يجب تناول أول قرص بعد الوجبة بـ 6-8 ساعات. بعد ذلك يجب تناول قرص واحد كل يوم إلى أن يأمرك الطبيب بالتوقف عن ذلك.

لم يتم تكوين خثار دموية في أوردة الرجلين (الختار الوريدي العميق) وفي الأوعية الدموية في

الرئتين (الانصمام الرئوي) بعد إنعام 6 أشهر علاجية للختار الوريدي العميق أو الانصمام الرئوي

السابق، الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

فروع واحد (10 ملغ) مرة واحدة في اليوم.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يحتوي كل قرص مطلي على:

Rivaroxaban 10 mg (Rivaroxaban 10 mg)

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات

الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بامتناع حتى تفهمها قبل استعمال الدواء. يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن

الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

بالإضافة إلى النشرة الطبية، فإن المستحضر ريفار تيقع توجيه بطاقة معلومات وقائية لمتلقى العلاج.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة يتوجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بريفار تيقع وخلال،

وعلبك اتباعها.

يجرب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمتلقى العلاج ونشرة المستهلك الطبية بتمعن قبل استعمال

المستحضر.

يجرب الاحتفاظ ببطاقة النشرة لمعاينة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

لقد توقف هذا الدواء من أجل علاجه. لا تتعط للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي

الطبيعي مشابهة.

لقد توقفت ريفار تيقع 10 ملغ من أجل علاجه