

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالفة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

نورمالول أقراص 25,50, 100 ملغ

المادة الفعالة: كل قرص يحتوي على أتينولول (Atenolol) بجرعة 25, 50 أو 100 ملغ على التوالي.

مواد غير فعالة ومواد الحساسية في الدواء – انظر بند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة يباعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدأ لك أن وضعهم الطبي مماثل. الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

مستحضر من قبلة حاصرات مستقبلات بيتا الأدرينالية (beta-blockers) لعلاج النوبة الصدرية (angina pectoris)، الاحتشاء الحاد لعضلة القلب (بعد نوبة قلبية) وفرط ضغط الدم.

الفصلية العلاجية: حاصِر انتقائي لمستقبلَ بيتا 1.

2. قَبيل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجيًا) للمادة الفعالة (أتينولول) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر بند 6).
- عانيت في الماضي من إحدى المشاكل القلبية التالية:
 - قصور القلب الغير مستحضر عليه (الذي يؤدي بشكل عام لضيق تنفس وانتفاخ في البطن)
 - إحصار القلب من الدرجة الثانية أو الثالثة (حالة التي يمكن أن تُعالج بواسطة ناطقة قلبية)
 - نضوب/نظم قلبي بطيء جدًا أو غير منتظم. ضغط دم منخفض جدًا أو اضطرابات وخبية في تنفق الدم.
- إذا كان لديك ورمًا من نوع ورم القواتم الغير مُعالج. هذا هو ورم الذي عادةً يكون موجودًا بالقرب من الكليّة والذي يؤدي لضغط دم مرتفع. إذا كان مرض ورم القواتم لديك مُعالجًا، سوف يُعطيك الطبيب دواءً آخرًا الذي يسمى حاصِر ألفا. تتناولوه إضافة إلى **نورمالول**.
- كنت تعاني من حمّاض استقلابي (مستويات أعلى من الطبيعي للحمض في الدم).

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

لا بوصي بالعلاج بأتينولول للمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية مشنجة للقصبات (على سبيل المثال رئو وخبم). إذا تفرّر أن هذا هو العلاج الملائم لك، سيتم إعطاء العلاج بالجرعة الأدنى الممكنة. يجب استشارة الطبيب بشأن ضرورة توفر مستحضر موعص للقصبات.

قبل العلاج بنورمالول، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من الربو، من أصوات تنفس شبيهة بالصفير، من مشاكل

الدواء عليك قبل أن تحاول القيام بهذه الفعاليات.

- إذا كنت تشعر بدوخة أو تعب عندما تتناول الدواء، لا تُعدّ أو تستعمل الأدوات أو الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لانكوز. إذا قلقك في الماضي من قبل طبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليغرام صوديوم (23 ملغ) للقرص، أي أنه عمليًا "خالٍ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا استعمال الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.
علاج وطريقة العلاج بخُندان من قبل الطبيب فقط.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال.
حاول تناول القرص في نفس الوقت كل يوم. من المهم جدًا عدم تخطي أي جرعة، خاصةً عندما تكون الجرعة مرة في اليوم.

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة وفقًا لما خُدد من قبل الطبيب المُعالج.
نورمالول 50: يجوز شطر القرص، لا توجد معلومات بخصوص السحق أو المضغ.
نورمالول 100: يمنع الشطر بسبب عدم وجود خط شطر. لا توجد معلومات بخصوص السحق أو المضغ.

إذا تناولت جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معه.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، خذ جرعة فور تذكرك. لكن، إذا تقريبا حان الوقت للجرعة التالية، تخطى الجرعة التي نسيت. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنيصة.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى به من قبل الطبيب. حتى لو طرأ نقص على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة مسبقة مع الطبيب أو الصيدلي.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا توقف عن تناول هذا الدواء قبل أن تشاورك مع الطبيب. في حالات معينة، سيُنفذ إيقاف العلاج بشكل تدريجي.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملمص والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات طبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء، قد يؤدي استعمال **نورمالول** لأعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تُفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

تفاعلات أرجية:

إذا كنت تتطور رد فعل أرجي، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب. قد تشمل العلامات كثل على سطح الجلد أو انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان أو في الحلق.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- قد تشعر عند تناول المستحضر بتباطؤ في نبض القلب؛ هذا عرض عادي، لكن إذا كنت قلقًا، عليك التوجه إلى الطبيب.
- بين وجليلين بارنتين
- إسهل
- غثيل
- تعب

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

- اضطرابات نوم

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

إحصار في القلب قد يؤدي لدوخة، نبض غير منتظم، تعب أو إغماء) عدم إحساس وانقباض في أصابع اليدين المصحوبة بشعور في السخونة والالم (مرض رينو)

تغيرات في المزاج
كوبيس
ارتبك

تغيرات في الشخصية (ذهائم) - اضطراب لبيتا (فسية) أو هلوسات المراس

دوخة (خاصة عندما تقف)
وخز في اليدين
عدم القدرة على الوصول للانصباب (عجز جنسي)
جفاف في الفم

عينين جافتين
اضطرابات بالروية
تساقط الشعر

طفح في الجلد
انخفاض في عدد الصفائح في الدم (قد يسبب لك أن تصاب بالجروح بسهولة أكبر)

علامات بنفسجية في الجلد
يرقان (تجلى بالصفرار الجلد أو الجزء الأبيض في العينين)

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

تغيرات في جزء من الخلايا وفي المركبات الإضافية في الدم. قد يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات دم من حين لآخر، من أجل فحص إذا كان **لنورمالول** أي تأثير على جهاز الدم لديك.

أعراض جانبية التي شويعها غير معروف (أعراض لم يحدّد شيوعها بعد):

وضع وشبه الذئبة (مرض ينتج به جهاز المناعة أجسام مضادة التي تهاجم بالأساس الجلد والمفاصل).
اكتئاب

الحالات التي قد تتفاقم:

إذا كنت تعاني من إحدى المشاكل التالية، فهي قد تتفاقم في بداية العلاج **بنورمالول**. هذا يحدث في أحيان نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

- صدفية (مرض جلدي – psoriasis).
- ضيق تنفس.
- ربو أو مشاكل تنفس.
- اضطرابات التي تتفق الدم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب. يمكن التليغ عن الأعراض الجانبية لوزرة الصحة بواسطة الضغط على الرابط **"الدخول عل توقعات لوزية عقب סיפול תרופות"** الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الإستمارة الأإنترنتية للتليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف تُخزّن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**تأريخ** – **תאריך**) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:** لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو في سلة القبايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف التخلص من الأدوية التي لا تُستعمل بعد. هذه الوسائل سوف تساهم بالحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعّال يحتوي الدواء أيضًا على:
Lactose monohydrate, maize starch, sodium starch glycolate, cellulose microcrystalline, magnesium stearate, povidone, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

نورمالول 25, 50: قرص مستدير، أبيض مع خط شطر.
نورمالول 100: قرص مستدير، أبيض، مسطح، مع ختم "100"

حجابت واحد.
نورمالول 50: 25/50/100
نورمالول 100: 25/50/100

قد لا تتسوق العبوات بجميع أحجامها.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

نورمالول 25: 00-28700-19-104

نورمالول 50: 00-26223-00-052

نورمالول 100: 00-26224-00-052

تمّ تنقيحها في آذار 2022 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة. للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: **دكسل م. ض.**

شارح دكسل 1, أور عيكفا 3060000, إسرائيل