

بيكربونات الصوديوم 500 ملخ، أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على: بيكربونات الصوديوم 500 ملخ (Sodium Bicarbonate 500 mg).

يحتوي كل قرص على حوالي 137 ملخ صوديوم.

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية. انظر البند 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تنتهي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 14 يوم.

1. لماذا هذا الدواء؟

الدواء بيكربونات الصوديوم 500 ملخ مخصص للتخفيف في حالات فرط الحموضة في المعدة.

المجموعة العلاجية: مضاد للحموضة.

2. قبل البدء باستعمال الدواء

ممنوع استعمال الدواء إذا:

- لديك حساسية (الرجي) للمادة الفعالة (بيكربونات الصوديوم) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بيكربونات الصوديوم 500 ملخ، أخبر الطبيب إذا:

• عانيت في الماضي من قصور القلب

• كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى

• كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

• أنت تتبع نظاماً غذائياً قليل الملح (يحتوي كل قرص على حوالي 137 ملخ صوديوم)

الأطفال والمرأهقون:

لا ينصح بهذا الدواء للأطفال والرضع دون سن 6 سنوات.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

• الأدوية التي تحتوي على الليثيوم (العلاج الاكتئاب)

• الفينوتريازين (العلاج القلق)

• بعض المضادات الحيوية (مثل ريفامبيسين أو تتراسيكلين)

• الأدوية المضادة للقرفيات (مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول)

• أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم (مثل كابتوبريل، إنالابريل)

• ديبيريدامول (منع تجلط الدم)

• كينيدين (لاضطرابات ضربات القلب)

• فينيتوتين وجانابنتين (العلاج الصرع)

• كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين (لوقاية من الملاريا أو التهاب المفاصل أو علاجهما)

• بنسيلامين (العلاج الروماتيزم)

• بايفوسفونيت (العلاج مرض باجيت، حيث تتشكل العظام بسرعة كبيرة جداً أو لعلاج هشاشة العظام، لإبطاء فقدان العظام)

• ميثوتريكسات (يستخدم لعلاج السرطان).

• إيفيردين (يستخدم في أدوية البرد/مزيلات الاحتقان)

• أسيرين

الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتدين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في استعمال الدواء.

السوقية واستعمال الماكولات:

من غير المتوقع أن يؤثر الدواء على القدرة على السياقة أو تشغيل الماكولات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك الاستيقاظ من النوم أو من الصيدلي إذا لم تكن متاكداً بخصوص الجرعة وكيفية العلاج.

الجرعة الموصى بها عادة، لدى البالغين والاطفال من سن 6 سنوات وما فوق هو:

4-6 أقراص، 4 مرات في اليوم، حسب الحاجة.

يُمنع استخدام هذا الدواء لفترات متقاربة أو لفترة متواصلة (فوق 14 يوماً) بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

• يجب بلع القرص مع كوب من الماء.

• يمكن قطع القرص أو سحقه لتسهيل البلع، للاستخدام الفوري. لا توجد معلومات حول توحيد نصف القرص.

إذا استعملت باليد مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع بخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

تشمل أعراض الجرعة الزائدة في الحالات الخطيرة تغيرات في المزاج، ضيق في التنفس، ضعف العضلات، تشنجات، تعب، عدم انتظام ضربات القلب، تشنجات وفقدان الوعي لفترة طويلة.

إذا تسببت تناول الدواء في الوقت المطلوب، لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

إذا تسببت تناول أدوية في العتمة يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال بيكربونات الصوديوم 500 ملخ قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى قسم من متناولين الدواء. لا تتصدر عند قراءتك الأعراض الجانبية، قد لا تشكوا من أي منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ بالمستشفى إذا ظهر واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

• انخفاض الوتايسيمون (نقص بوتايسيوم الدم)، وقد تشمل الأعراض نبضًا غير طبيعي، ضعف العضلات، وفقدان الإحساس

• سائل في الرئة (الوذمة الرئوية)

• زيادة ضغط الدم

• أعراض جانبية إضافية:

• الام البطن

• غازات

• القلاء (زيادة درجة الحموضة في الدم)، قد تشمل الأعراض التعب، القيء، العطش والأرق (قد يكون سببها الاستخدام لفترة طويلة، وهو أمر لا ينصح به)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاين من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الدلائل عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

([www.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد اقضاء تاريخ الصلاحية (Date exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

0 يجب التخزين في مكان جاف تحت 25 درجة مئوية.

0 يمكن استخدام الدواء حتى 60 يوماً بعد فتح العبوة للمرة الأولى، ولا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

0 يجب حفظ الدواء في علبة الأصلية.

0 يجب إغلاق العبوة بإحكام بعد كل استخدام، وذلك للحماية من الرطوبة.

0 تحتوي العبوة على مادة ماصة للرطوبة. لا تبتلع ماصة الرطوبة أو تخربه من العبوة.

- لا يجوز رمي الأدوية إلى المياه العادمة أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات اضافية

بالإضافة للمركب الفعال، يحتوي الدواء على:

Starch, Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium (Ac-Di-Sol), Acacia, Talc.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص بيضاء مستديرة، محدبة من الجانبين، عليها ختم "REKAH" من جانب وبلا شيء من الجانب الآخر.
حجم العبوة المصادر عليها: تحتوي كل علبة على 100 قرص.

الم المنتج وصاحب الامتياز:

ريkick للصناعة الدوائية م.ض، شارع هاميلاخا 30 حولون، 5881904، إسرائيل.
تم التحرير في يوليو (تموز) 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

022-07-23524-00

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.