



עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"א - 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

אקסקופרי[™] 12.5 מ"ג, טבליות אקסקופרי[™] 200, 150, 100, 50, 25 מ"ג, טבליות מצופות

כל טבליה מכילה סנוובמט (Cenobamate) 12.5, 25, 50, 100, 150 או 200 מ"ג בהתאם.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוספת" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אקסקופרי ניתנת בשילוב עם תרופות אנטי-אפילפטיות אחרות למטופלים מבוגרים עם אפילפסיה שאינה בשליטת הצורה מספקת למרות היסטוריה של טיפול עם לפחות 2 תרופות אנטי-אפילפטיות, לטיפול בסוג של אפילפסיה עם התקפים מוקדים עם או ללא הכללה משנית.

התקפים מוקדים הם אלו הנגרמים מפעולות מוחית לא תקינה שמתחלת באזורי שנמצא לצד אחד של המוח, והכללה משנית פירושה שהפעילות הלא תקינה מתפשטת לשני צדי המוח. התרופה מיועדת לשימוש במבוגרים בלבד.

קבוצה רפואיית: תרופות אנטי-אפילפטיות.
תרופות אלו משמשות לטיפול באפילפסיה, מצב שבו יש פרכוסים או התקפים בגל פעלויות לא תקינה במוח.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (סנוובמט) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- נולדת עם בעיות לב, עם שינויים בפעולות החשמלית של הלב, הקשורים למצב נדיר הנקרא תסמנת QT קצר משפחתי.

اذירות מיוחדות הקשורות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול באקסקופרי, ספר לרופא אם:

- יש לך מחשבות לפגוע בעצמך או להתאבד. למשל מושט של אנשים שטופלו בתרופות אנטי-אפילפטיות כגון אקסקופרי היו מחשבות לפגוע בעצמם או להתאבד. אם יש לך מחשבות כאלה בכל שלב שהוא, פנה מיד לרופא.
- יש לך תגובה עורית חריפה שעשויה לכלול חום גבוה ותסמיינים אחרים דמו"י שפעת, פריחה בפנים, פריחה המפשטה לחליקים אחרים בגוף, בלוטות נפוחות (בלוטות למיפה מוגדלות); ובבדיקות דם המראות עליה ברמות של אנזימי כבד ושל סוג של תא דם לבנים (אוזינופיליה).

ילדים ומתבגרים
אקסקופרי אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, מכיוון שהיא לא נבדקה בקבוצה זו.

תగבות בין תרופתיות
אם אתה ליקח, אם לוקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי ללקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

נטילת אקסקופרי עם תרופות מסוימות אחרות עשויה להשפיע על אופן הפעולה של התרופות האחרות או על אופן הפעולה של אקסקופרי. אין להתחיל או להפסיק תרופות אחרות מבלי להתייעץ קודם עם הרופא או הרוקח.

ספר לרופא אם אתה מטל אחת מהתרופות הבאות, מאחר שייתכן שייהי צריך להתאים את מינון התרופה שלך:

- תרופות המשמשות לסיעור להידם כגון ברביטורטים ובנזודיאזפינים.
- תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה, כגון קלובאצאם, פניטואין, פנוברביטל, למוטריג'ין.

- תרופות למניעת הירין (амצעי מנעה דרך הפה), מכיוון שאלה עשויה להיות פחות עילית בשילוב עם **אקסקופרי**. הרופא שלך עשוי לרשום שיטות חלופיות למניעת הירין בזמן שתנועת תרופה זו ועד 4 שבועות לאחר הפסקת נטילת תרופה זו.
- תרופות שידוע שהן עוברות שניינן (טרנספורמציה) בגין על ידי קבוצות מסוימות של אנטזימים, כגון מידАЗולאמ (תרופה המשמשת לעצירת התקפי עוויתות ממושכים, חרידפים (פתאומיים), להרגעה ולביעות שינוי), בופורופין (תרופה המשמשת לשינוי בהפסקת עישון), אומפרוזול (תרופה המשמשת לטיפול בצרבת או כיב קיבה), בריסיטיניב (תרופה המשמשת לטיפול בדלקת כואבת של המפרקים או באקזמה בעור), צפאקלור (אנטיביוטיקה), אמגאליפלוזין (תרופה המשמשת לטיפול בסוכר גובהدم בסוכרת), פניצילין G (אנטיביוטיקה), ריטובגרן (תרופה המשמשת לטיפול בפעילות יתר של שלפוחית השתן), סיטגליפטין (תרופה המשמשת לשילטה על סוכר גובהדם בסוכרת).

שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
אין ליטול תרופה זו עם אלכוהול. **אקסקופרי** יכולה להגבר את ההשפעות של אלכוהול בגין תחושת עייפות או ישנוונות ואסור לשתו אלכוהול עם תרופה זו.

הירין והנקה
אם את בהירין או מניקה, חושבת שאת בהירין, או מתכנת להרות, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.
קשה **אקסקופרי** במהלך הירין רק אם את והרופא שלך מחליטים שזה הכרחי לחלוון. עליך להשתמש באמצעי מנעה יעיל במהלך השימוש בסנובמט ועד 4 שבועות לאחר הפסקת נטילת התרופה. התייעצי עם הרופא שלך לגבי אמצעים יעילים למניעת הירין (ראי סעיף "תగובות בין תרופתיות"). עליך להפסיק להניך בזמן נטילת **אקסקופרי**.

נהיגה ושימוש במכונות
אתה עלול להציג ישנוון, מסוחרר או עייף, והראיה שלך עלולה להיות ירודה בזמן נטילת **אקסקופרי**. תופעות אלו סבירות יותר בתחילת הטיפול או לאחר האגדלת המינון.
אין להנוג, לרכוב על אופניים או להשתמש בכלים או מכונות כלשהם, אם התגובה שלך נהיות איטיות ועד שתדע כיצד התרופה משפיעה עלייך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
אקסקופרי מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי רופא שיש לך סבירות לסוכרים מסוימים, היוויעץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?
יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.
אתה תיקח **אקסקופרי** עם תרופות אחרות לטיפול באפילפסיה.

מינון
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
אתה תתחילה ליטול **אקסקופרי** במינון יומי של טבלייה אחת של 12.5 מ"ג בשבועיים הראשונים, ולאחר מכן טבלייה אחת של 25 מ"ג פעמיים ביום במשך השבועיים הבאים. לאחר מכן המינון שלך יותאם בהדרגה כל שבועיים עד שתגיע למינון שפועל היטב. הרופא יקבע את המינון היומי הנכון עבורך וייתכן שיצטרך להתאים אותו לאורך זמן. המינון היומי המומלץ הוא בין 200 מ"ג ל-400 מ"ג פעמיים.
מטופלים הסובלים מאירוע ספיקת כליזות: המינון היומי המומלץ הוא 300 מ"ג ליום.
מטופלים הסובלים מליקוי קל עד בינוני בתפקוד הגוף: המינון היומי המומלץ הוא 200 מ"ג ליום.
אין לעבור על המונה המומלצת.

צורת הנטילה

קח את המינון המומלץ פעם ביום בערך באותה שעה. אתה יכול ללקחת אקסקופרי בכל זמן, במהלך היום או בערב, עם האוכל או בין הארוחות.
יש לבלווע את הטబליות בשלמותן עם כוס מים. אסור לחצוץ את הטබליות, מכיוון שהטබליות אינן מתאימות לחלוקה לשני חצאים שוויים.
אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטබליות.

אם נטלת בטיעות מינון גבוה יותר

שוחח עם הרופא שלך. אתה עלול להרגיש סחרחוורת, עייפות וישנוונות.
אם נטלת מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד וחלוו פחות מ-12 שעות מאז הייתה צריכה לקחת אותה, קח את המנה שנשכח ברגע שאתה נזכר. אם חלוו יותר מ-12 שעות, דלג על המנה שנשכח וקח את המנה הבאה בזמן הקבוע שלך. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצצת על מנה שנשכח.
יש להתמודד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטלת התרופה

אין להפחית את המינון או להפסיק לקחת אקסקופרי ללא התייעצות עם הרופא. הרופא יסביר כיצד להפסיק לקחת אקסקופרי על ידי הפחיתה המינון בהדרגה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקסקופרי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואאי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלואאי החמורים הבאות:

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תסמנת התגובה התורופתית עם אוזינופיליה ותסמים מערכתיים (DRESS) – תגובה עורית חמורה שעשויה לכלול חום ותסמים אחרים דמויי שפעת, פריחה בפנים, פריחה המתרפשת לאזוריים אחרים בגוף ובולטות נפוחות (בלוטות למיפה מוגדלות). בדיקות דם עשויות להראות עלייה ברמות של אנזימי כבד ושל סוג של תא דם לבנים (אוזינופיליה).

תופעות לוואי נוספת

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביוטר ממשתמש אחד מעשרה):

- מריגש ישוני (ישנוונות), דרום או עיף מאוד (עייפות)
- סחרחוורת
- תחושת סחרור (ורטיגו)
- בעיות בקואורדינציה של תנועות, בעיות בהליכה או בשמירה על שווי המשקל (אטקסיה, הפרעה בהליכה, קואורדינציה לא תקינה)
- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-11 משתמשים מתוך 100):

- ירידת בזיכרון, בלבול
- ריגוש יתר
- קושי באמרית מיילים או קושי בדיבור
- תנודות מהירות ובלתי נשכחות של העיניים (ריצוד עיניים), טשטוש ראייה, ראייה כפולה
- בחילות, הקאות, עצירות או שלשלולים
- יובש בפה
- פריחה, גירוד
- נפיחות בעפעפיים, נפיחות בגפיים

- בדיקות דם המראות עליה ברמות של אנזימי כבד מסוימים
- **תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמצויפות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):
- **תגובה אלרגיות**

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או
על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.
- אין להשליך תרופות לביבום או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide

טבליות מצופות 25 מ"ג ו-100 מ"ג מכילות גם:

Polyvinyl alcohol-part. hydrolyzed, macrogol, titanium dioxide (E171), talc, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), indigo carmine aluminum lake (E132)

טבליות מצופות 50 מ"ג מכילות גם:

Polyvinyl alcohol-part. hydrolyzed, titanium dioxide (E171), macrogol, talc, iron oxide yellow (E172)

טבליות מצופות 150 מ"ג ו-200 מ"ג מכילות גם:

Polyvinyl alcohol-part. hydrolyzed, titanium dioxide (E171), macrogol, talc, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172)

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

- אקסקופרי 12.5 מ"ג: טבליות עגולות, בצלע לבן עד קرم, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"12" בצד השני.
- אקסקופרי 25 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצלע חום, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"25" בצד השני.
- אקסקופרי 50 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצלע צהוב, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"50" בצד השני.
- אקסקופרי 100 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצלע חום, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"100" בצד השני.
- אקסקופרי 150 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצלע כתום בהיר, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"150" בצד השני.
- אקסקופרי 200 מ"ג: טבליות מצופות אובליות, בצלע כתום בהיר, עם הטבעה של "SK" בצד אחד ו-"200" בצד השני.

גודלי אריזה מאושרים:

אקסקופרי 12.5 מ"ג ו-25 מ"ג:

אריזת מגש (בליסטר): 7, 14 טבליות. אריזת טיטרציה (אריזה למינון ההתחלתי): 14 טבליות של 12.5 מ"ג ו-14 טבליות מצופות של 25 מ"ג.

אקסקופרי 50 מ"ג:

אריזת מגש (בליסטר): 7, 14, 30 טבליות מצופות. אריזת טיטרציה: 14 טבליות מצופות של 50 מ"ג ו-14 טבליות מצופות של 100 מ"ג. אריזה למינן אחזקתי (מינון יומי של 250 מ"ג): 28 טבליות מצופות של 50 מ"ג ו-28 טבליות מצופות של 200 מ"ג.
אריזת בקבוק: 30 טבליות מצופות.

אקסקופרי 100 מ"ג:

אריזת מגש (בליסטר): 14, 30 טבליות מצופות. אריזת טיטרציה: 14 טבליות מצופות של 50 מ"ג ו-14 טבליות של 100 מ"ג.
אריזת בקבוק: 30 טבליות מצופות.

אקסקופרי 150 מ"ג:

אריזת מגש (בליסטר): 14, 30 טבליות מצופות. אריזת טיטרציה: 14 טבליות מצופות של 150 מ"ג ו-14 טבליות מצופות של 200 מ"ג. אריזה למינן אחזקתי (מינון יומי של 350 מ"ג): 28 טבליות מצופות של 150 מ"ג ו-28 טבליות מצופות של 200 מ"ג.
אריזת בקבוק: 30 טבליות מצופות.

אקסקופרי 200 מ"ג:

אריזת מגש (בליסטר): 14, 30 טבליות מצופות. אריזת טיטרציה: 14 טבליות מצופות של 150 מ"ג ו-14 טבליות מצופות של 200 מ"ג. אריזה למינן אחזקתי (מינון יומי של 250 מ"ג): 28 טבליות מצופות של 50 מ"ג ו-28 טבליות מצופות של 200 מ"ג. אריזה למינן אחזקתי (מינון יומי של 350 מ"ג): 28 טבליות מצופות של 150 מ"ג ו-28 טבליות מצופות של 200 מ"ג.
אריזת בקבוק: 30 טבליות מצופות.

יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

היצן וכותבותו: א.ס.ק"י לייף סינס, אינק. (חברת בת של א.ס.ק"י ביופארמסוטיקלס קומפני, לימיטד), ניו ג'רזי, ארצות הברית

נערכ באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אקסקופרי 12.5 מ"ג: 172-86-37490-99
אקסקופרי 25 מ"ג: 172-87-37491-99
אקסקופרי 50 מ"ג: 172-88-37492-99
אקסקופרי 100 מ"ג: 172-89-37493-99
אקסקופרי 150 מ"ג: 172-90-37494-99
אקסקופרי 200 מ"ג: 172-91-37495-99

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

בעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל