



---

**Информационная брошюра  
для пациентов, получающих  
препарат Тецентрик  
(атезолизумаб) 60 мг/мл**

---

Формат и содержание данной брошюры были  
одобрены Министерством здравоохранения в

## Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

Данная брошюра содержит важную информацию о безопасности, которую Вам следует знать до начала терапии и в ходе терапии препаратом Тецентрик (атезолизумаб).

Информация в данной брошюре не заменяет мнение лечащего врача. С дополнительными вопросами следует обращаться к лечащему врачу.

Для получения полной информации о лекарственном препарате следует ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного препарата, опубликованной в базе лекарственных препаратов на сайте Министерства здравоохранения или на сайте компании «Рош» [www.roche.co.il](http://www.roche.co.il)

*Мы желаем вам крепкого здоровья!*

## Что такое Тецентрик?

Тецентрик – это лекарственный препарат, отпускаемый по рецепту врача, для лечения определенных типов онкологических заболеваний.

## Как действует Тецентрик?

Тецентрик действует за счет связывания со специфическим белком в организме, который называется PD-L1. Этот белок подавляет активность иммунной системы и таким образом предотвращает ее атаку на раковые клетки. За счет связывания с белком PD-L1 Тецентрик позволяет иммунной системе атаковать раковые клетки и уничтожать их.

## Как применяют Тецентрик?

Тецентрик может применяться в различной дозировке и с разной частотой, в соответствии с указаниями лечащего врача.

Терапия проводится медицинским персоналом путем внутривенного введения на протяжении 30-60 минут.



На протяжении  
30-60 минут



В различных дозировках  
внутривенно

## **О чем мне следует уведомить лечащего врача перед началом терапии препаратом Тецентрик?**

Перед началом лечения Вам необходимо предоставить лечащему врачу полную информацию о состоянии Вашего здоровья, в том числе о заболеваниях, которыми Вы страдаете или страдали в прошлом, о лекарственных препаратах, которые Вы принимаете регулярно, включая рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, витамины, растительные пищевые добавки, а также о повышенной чувствительности к лекарственным препаратам, если таковая имеется.

Данная терапия подходит не всем. Запрещено принимать Тецентрик при гиперчувствительности к атезолизумабу или любому иному компоненту препарата (ледяная уксусная кислота, L-гистидин, сахароза, полисорбат 20).

## **Помимо прочего, перед началом терапии препаратом Тецентрик важно уведомить лечащего врача, если:**

- У Вас имеются проблемы с иммунной системой (например, болезнь Крона, язвенный колит или волчанка); у Вас имеется заболевание, воздействующее на нервную систему (такое как миастения гравис или синдром Гийена-Барре); Вы перенесли трансплантацию органа; Вы перенесли или планируете пройти трансплантацию стволовых клеток от донора (аллогенную), или Вы проходили лучевую терапию области грудной клетки.
- Вы беременны или планируете беременность. Тецентрик может нанести вред плоду, поэтому Вы должны немедленно уведомить врача, если обнаружили, что беременны или подозреваете, что забеременели.

Если Вы способны к деторождению:

- Прежде чем Вы начнете лечение препаратом Тецентрик, Вы должны выполнить тест на беременность.
- Вы должны применять эффективные средства контрацепции на протяжении всего периода лечения и не менее 5 месяцев со дня введения последней дозы препарата Тецентрик.
- Вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, попадает ли Тецентрик в грудное молоко. Запрещено кормить грудью во время лечения и не менее 5 месяцев со дня введения последней дозы препарата Тецентрик.

## **Важная информация по безопасному применению препарата Тецентрик**

Тецентрик – это лекарственный препарат, способный лечить некоторые виды рака посредством мобилизации собственной иммунной системы организма пациента. Как и любой другой препарат, Тецентрик может вызывать побочные эффекты у некоторых людей. Он может побудить Вашу иммунную систему атаковать здоровые органы и ткани в различных частях тела или повлиять на их работу. Иногда данные нарушения могут быть тяжелыми или опасными для жизни и даже привести к смерти. У Вас может возникнуть более одного такого явления сразу, и они могут произойти в любой момент в ходе лечения или даже после его завершения.

## Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом, если у Вас появились какие-либо из следующих симптомов, или если эти симптомы усугубляются:

- Нарушения со стороны легких – кашель, одышка, боли в грудной клетке.
- Нарушения со стороны кишечника – диарея (жидкий стул) или повышенная перистальтика, кровь или слизь в кале или черный и липкий стул, сильные боли или повышенная чувствительность в животе.
- Нарушения со стороны печени – пожелтение кожных покровов или белков глаз, сильная тошнота или рвота, боли с правой стороны живота в области желудка, темная моча (цвета чая), повышенная склонность к кровотечениям или образованию гематом.
- Нарушения со стороны эндокринных желез – длительные или абнормальные головные боли, повышенная чувствительность глаз к свету, проблемы с глазами, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, крайняя утомляемость, набор или снижение веса, повышенный аппетит или усиленная жажда, учащенное мочеиспускание, выпадение волос, ощущение холода, запор, более низкий голос, головокружения или обмороки, изменения настроения или поведения (например, снижение либидо, повышенная раздражительность или забывчивость).
- Нарушения со стороны почек – уменьшение количества мочи, кровь в моче, отек лодыжек, потеря аппетита.
- Нарушения со стороны кожных покровов – сыпь, зуд, волдыри или шелушение кожи, язвы в области рта, носа, горла или гениталий, повышенная температура или гриппоподобные симптомы, увеличение лимфатических узлов.
- Возможны также нарушения со стороны других органов. Выше указаны не все возможные симптомы и признаки, которые могут развиваться в ходе лечения препаратом Тецентрик. Следует незамедлительно связаться с лечащим врачом, если Вы испытываете что-либо из перечисленных ниже явлений, либо если их симптомы усиливаются:  
боли в грудной клетке, нерегулярное сердцебиение, одышка или отек лодыжек. Спутанность сознания, сонливость, нарушения памяти,

перепады настроения или изменение в поведении, ригидность затылочных мышц, проблемы с равновесием, онемение или ощущение мурашек в руках или ногах. Размытое зрение, двоение в глазах, чувствительность глаз к свету, боли в глазах, изменения зрения. Тяжелые или непреходящие мышечные боли или слабость, мышечные судороги. Низкая численность эритроцитов, гематомы.

- Инфузионные реакции, которые могут носить тяжелый характер или представлять опасность для жизни – признаки и симптомы могут включать озноб или тремор, зуд или сыпь, румянец на коже, одышку или свисты при дыхании, головокружение, повышенную температуру, предобморочное состояние, боли в шее или спине.
- Осложнения, включая реакцию «трансплантат против хозяина» (РТПХ) у людей, перенесших трансплантацию костного мозга от донора (аллогенную) – данные осложнения могут быть серьезными и привести к летальному исходу, и они могут появиться, если Вы перенесли трансплантацию до или после терапии препаратом Тецентрик.

Незамедлительное оказание медицинской помощи может предотвратить усугубление этих явлений. Если Вы страдаете тяжелыми побочными эффектами, лечащий врач может отложить или немедленно прекратить Ваше лечение препаратом Тецентрик или прописать Вам другие лекарственные препараты.

Существуют и другие, не перечисленные выше побочные эффекты, которые могут появиться вследствие терапии препаратом Тецентрик. Полный список побочных эффектов и частота их появления указаны в инструкции по применению лекарственного препарата. Следует сообщать лечащему врачу о любом изменении или ухудшении Вашего состояния в ходе лечения.

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения посредством онлайн-формы по ссылке: <http://sideeffects.health.gov.il>

Также можно сообщить напрямую в компанию «Рош» по электронной почте: [israel.drugsafety@roche.com](mailto:israel.drugsafety@roche.com) или по телефону: 09-9737722

Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd.  
6 HaHarash St., PO Box 6391  
Hod Hasharon 4524079  
09-9737899  
[www.roche.co.il](http://www.roche.co.il)

#### References:

Teцентрик Prescribing Information

Формат и содержание данной брошюры были одобрены Министерством здравоохранения в

# Уважаемая пациентка, уважаемый пациент!

**Важно всегда иметь при себе данную информационную карточку и предъявлять ее любому медицинскому работнику, участвующему в Вашем лечении.**

Имя врача-онколога: \_\_\_\_\_

Контактные данные: \_\_\_\_\_

Имя пациентки/пациента: \_\_\_\_\_

Мои контактные данные: \_\_\_\_\_

Контактное лицо для экстренных случаев: \_\_\_\_\_

Контактные данные: \_\_\_\_\_

## **Важная информация для сотрудника медперсонала**

Эта пациентка/этот пациент получает лечение препаратом Тецентрик (атезолизумаб). Данный препарат может вызывать побочные эффекты, связанные с иммунной системой и затрагивающие легкие, печень, кишечник, эндокринные железы, сердце и другие органы, а также реакции, связанные с инфузией.

Ранняя диагностика и адекватное лечение необходимы для снижения последствий побочных эффектов, связанных с иммунной системой.

Если имеются подозрения на побочные эффекты, связанные с иммунной системой, следует провести надлежащую диагностику, чтобы подтвердить данную этиологию и исключить другие причины. В зависимости от тяжести состояния следует приостановить терапию препаратом Тецентрик и назначить дополнительные препараты. Точные указания можно найти в инструкции по применению лекарственного препарата на сайте Министерства здравоохранения или на сайте компании «Рош» [www.roche.co.il](http://www.roche.co.il).

Для получения дополнительной информации свяжитесь с лечащим онкологом.

О побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения посредством онлайн-формы по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Также можно сообщить напрямую в компанию «Рош» по электронной почте: [israel.drugsafety@roche.com](mailto:israel.drugsafety@roche.com) или по телефону: 09-9737722