

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

הולדולTM 5 מ"ג

טבליות

חומר פעיל

כל טבלייה מכילה הלופרידול 5 מ"ג (haloperidol 5 mg) וחלקי מתכתיים של חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספחות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשות לטיפול במחלהך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

הולדול מיועד עבור חולמים מבוגרים בני 18 שנים ומעלה:

- לטיפול בסכיזופרניה ובഫראעה סכיזואפקטיבית.
- לטיפול אקטוא בבלבול חריף (דיליריום) לאחר כישלון טיפולים שאינם תרופתיים.
- לטיפול באירועי מניה מתחוניים עד חמורים הקשורים להפרעה דו-קוטבית I, כאשר טיפולים אחרים אינם ניתנים לשימוש.
- לטיפול באירועי פסיכומוטורי חריף הקשור להפרעה פסיכוטית או לאירועי מניה על רקע הפרעה דו-קוטבית I.
- לטיפול בתוקפנות מתמשכת ובתסמניהם פסיכוטיים בחולמים עם דמנציה מתחונה עד חמורה על רקע מחלת אלצהיימר ודמנציה וסקולרית לאחר כישלון טיפולים שאינם תרופתיים וכשהר קיימים סיכון לפגיעה עצמית או לפגיעה באחרים.
- לטיפול בהפרעות טיקים, לרבות תסמונת טורט, בחולמים עם פגיעה חמורה לאחר כישלון טיפולים חינוכיים, פסיכולוגיים ותרופתיים אחרים.
- לטיפול בכוריאה קלה עד מתחונה במחלת הנטינגטון, כאשר תכשירים רפואיים אחרים אינם יעילים או אינם נסבלים.

עבור ילדים חולמים:

- לטיפול בסכיזופרניה במתבגרים בני 13 עד 17 שנים כאשר טיפולים תרופתיים אחרים כשלו או אינם נסבלים.
- לטיפול בתוקפנות חמורה מתמשכת בילדים ובמתבגרים בני 6 עד 17 שנים עם אוטיזם או הפרעות התפתחותיות נרחבות, כאשר טיפולים אחרים כשלו או אינם נסבלים.
- לטיפול בהפרעות טיקים, לרבות תסמונת טורט, בילדים ובמתבגרים בני 10 עד 17 שנים עם פגיעה חמורה לאחר כישלון טיפולים חינוכיים, פסיכולוגיים ותרופתיים אחרים.

קבוצה תרופיתית: הולדול שייך לקבוצת חומרים אנטי-פסיכוטיים משפחת הבוטירופנוניים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| • אתה רגיסטר (אלרגי) לחומר הפעיל (הלופרידול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספת"). | • אתה פছות מודע לדברים סביבך או התגובה שלך נעשית איטיתות באופן לא רגיל. | • יש לך פרקיןוזון. |
|---|---|--------------------|

- יש לך דמנציה ('Lewy body dementia') מסוג דמנציה עם גופיפי לואי ('Lewy body dementia').
 - יש לך מחלת עצבית ניוונית של המוח – Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
 - יש לך הפרעה בלב המכונה תסמונת מקטע QT מוארך או כל בעיה אחרת בקצב הלב אשר מופיעה כממצא חריג בתרשים אק"ג (אלקטרוורקדיוגרム).
 - יש לך אי ספיקת לב או היה לך התקף לב לאחרונה.
 - יש לך רמה נמוכה של אשגן בדם אשר לא טופלה.
 - אתה נוטל את אחת התרופות המופיעות ברשימה של תרופות שאין ליטול בלבד עם הלדול (ראה סעיף 2 "אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות").
- אין להשתמש בתרופה זו אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לך. אם אין לך בטוח, היזועץ ברופא לפני קיחת הלדול.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

תופעות לוואי חמורות

הלדול עלול לגרום לביעות בלב, לביעות בשליטה על תנועות הגוף או האפים ולתופעת לוואי חמורה הנקראת 'تسمונת נירולפטית ממארה'. הלדול יכול גם לגרום לתגובה אלרגיות חמורות ולקישי דם. עליך להיות מודע לתופעות לוואי חמורות בעת שאתה נוטל הלדול מכיוון שאתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף. ראה 'שים לב לתופעות לוואי חמורות' בסעיף 4.

אנשים קשישים ואנשים עם דמנציה

דווחה עלייה קטנה במקרי מוות ושבץ באנשים קשישים עם דמנציה הנוטלים תרופה אנטि-פסיכוטית. שוחח עם הרופא שלך לפני שתתיטול הלדול אם אתה קשיש, במיוחד אם אתה סובל מדמנציה.

לפני השימוש בהולדול, ספר לרופא אם:

- יש לך קצב פעימות לב איטי, מחלת לב או מישחו מבני המשפחה הקרובה שלך מות באופן פתאומי מבעירות לב.
- יש לך לחץ דם נמוך או אם אתה חוש סחרחות בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה.
- יש לך רמה נמוכה של אשגן או מגניזום (או אלקטROLיט אחר) בדם. הרופא שלך יחליט לטפל בזה.
- אי פעם היה לך דימום במוח, או אם הרופא שלך אמר לך שהיסכוי שלך ללקות בשbez גדול משל אנשים אחרים.
- יש לך אפילפסיה או אי פעם היו לך פרקושים (עווותות).
- יש לך בעיות בכליות, בכבד או בבלוטת הרתיס.
- יש לך רמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בדם או סרטן העולול להיגרם על ידי רמות גבוהות של פרולקטין (כגון סרטן שד).
- יש לך היסטוריה של קרישי דם או אם מישחו מבני המשפחה שלך יש היסטוריה של קרישי דם.
- יש לך דיכאון או הפרעה דו-קוטבית ואתה מתחיל להרגיש מדוока.

ייתכן כי תזדקק למעקב צמוד יותר, וייתכן שיש לך לשנות את המינון של הלדול שאתה נוטל. אם אין לך בטוח אם אחד המרכיבים המפורטים לעיל רלוונטי לך, התיעץ עם הרופא שלך או הרוקח טרם נטילת הלדול.

ילדים מתחת לגיל 6 שנים

אין להשתמש בהלדול בילדים מתחת לגיל 6 שנים. זאת לאחר שהתרופה לא נחקרה כראוי בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

יתacen שהרופא שלך ירצה להפנות אותך לבדיקה אלקטרוקורדיגרם (אק"ג) לפני או במהלך הטיפול בהלדול. בדיקת אק"ג מודדת את הפעילות החשמלית של הלב.

בדיקות דם

יתacen שהרופא שלך ירצה לבדוק את הרמות של אשלגן או מגניזום (או אלקטROLיט אחר) בدم, לפני או במהלך הטיפול בהלדול.

aintreakcziot/tgobot bin trofot

אם אתה לוקח, או אם תקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין ליטול הלדול אם אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול:

- בעיות קצב לב (כגון אמיידרון, דופטיליד, דיזופיראמיד, דרונדארון, איבוטיליד, כינידין, סוטולול)
- בדיכאון (כגון ציטאלופראם ואסציטאלופראם)
- בפסיכוזות (כגון פלופנאזין, לבומפרומזין, פרפנאזין, פימוזיד, פרוכלורפרזין, פרומאזין, סרטינידול, תיורידازין, טריפלואופרזין, טריפלופרומזין ויפראסידון)
- בזיהומיים בקטריאליים (כגון איזיתרומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין, לבופולוקסצין, מוקסיפלוקסצין וטיליתרומיצין)
- בזיהומיים פטריטיים (כגון פנטאמידין)
- במלריה (כגון הלוונטרין)
- בבחילות והקאות (כגון דולסטרון)
- בסרטן (כגון טורמיפן וונדטנייב).

כמו כן, דוחה לרופא אם אתה נוטל בפרידיל (טיפול באכاب בחזה או להורדת לחץ דם) או מתדון (לשיכון כאבים או טיפול בהתק讽刺ות לسمים).

טרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לבבויות לב, لكن עליך להתייעץ עם הרופא אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו ועל טיפול הלדול (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם").

יתacen שידרש מעקב מיוחד אם אתה נוטל ליתיום והלדול בו-זמןית.

יש צורך בניטור מיוחד אם אתה נוטל את שתי התרופות יחד. יש לדוח לרופא מיד ולהפסיק טיפול את שתי התרופות בו-זמןית אם אתה סובל מ:

- חום לא מוסבר או תנעות לא נשלטות
- בלבול, חוסר התמצאות, כאב ראש, בעיות בשווי משקל ותחושת ישנוניות כל אלה סימנים למצב חמור.

טרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של הלדול או להגביר את הסיכון לבבויות לב.

דוחה לרופא אם אתה נוטל:

- אלפראצולאם או בוספירון (טיפול בחרדה)
- דולוקסטין, פלאוקסטין, פלבוקסמין, נפזודון, פארוקסטין, סרטרلين, St. John's Wort (היפריקום פרפורטום) או גנלאקסין (טיפול בדיכאון)

- בופרופין (טיפול בדיכאון או לסיווע בהפסקת עישון)
- קרבמזפין, פנוברביטל או פנטואין (טיפול באפילפסיה)
- ריפאמיצין (טיפול בזיהומים בקטראליים)
- איטרקונזול, פוסאקונזול או ווריקונזול (טיפול בזיהומים פטריאtíים)
- טבליות קטוקונזול (טיפול בתסמונות קושינג)
- אינדיינאביר, ריטונאביר או סקוונאביר (טיפול בנגיף הכלש החיסוני האנושי – HIV)
- כלורפרומזין או פרומתזין (טיפול בבחילות והקאות)
- וראפאAMIL (טיפול ביתר לחץ דם או בעיות לב).

כמו כן, דוחה לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, כגון תרופות משתנות. ניתן כי הרופא יצטרכ לשנות את המינון של הלдол שאתה נוטל אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

הלдол יכול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות מהסוגים שלhallן:

ספר לרופא שילך אם אתה נוטל תרופות:

- הרגעה או לסיווע בהפרעותamina (תרופות הרגעה)
- טיפול בכאב (משככי כאבים חזקים)
- טיפול בדיכאון (נוגדי דיכאון טריציקליים)
- הורדת לחץ דם (כגון גואנטידין ומתיולופה)
- טיפול בתגובה אלרגיות חמורות (אדרנליין)
- טיפול בהפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) או בнерkolפסיה (ידועות כתרופות ממראיות)
- טיפול במחלת פרקיןסון (כגון לבודופה)
- דילול דם (פנינידיון)

התיעץ עם הרופא טרם נטילת הלдол אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם מזון או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיית אלכוהול במהלך נטילת הלдол עלולה לגרום לישנווות ולהפחחת הערנות. משמעות הדבר היא כי עליך לנוהג משנה זהירות לגבי כמות האלכוהול שאתה שותה. התיעץ עם הרופא לגבי שתיית אלכוהול בעת נטילת הלдол, ודוחה לרופא על כמות האלכוהול שאתה שותה.

היריון, הנקה ופוריות

היריון – אם אתה בהיריון, חושבת שאתה בהיריון או מתכנת להרות, פני לרופא להתייעצות.

הרופא שילך עשוי ליעץ לך לא ליטול הלдол במהלך ההיריון.

הבעיות שלhallן עלולות להתרחש ביילודים של אימהות הנוטלות הלдол במהלך 3 החודשים

האחרונים להיריון (השליש האחרון):

- רעד שרירים, נקשות או חולשת שרירים
- ישנווות או אי-שקט
- קשי נשימה או קושי באכלה

שיכוחותן המדוקת של בעיות אלו אינה ידועה. אם נטלת הלдол במהלך ההיריון ותינוקך מפתח אחת מתופעות לוואי אלו, פני לרופא.

הנקה – התיעוץ עם הרופא אם את מיניקה או מתכנת להויניק. זאת לאחר שכמוויות קטנות של התרופה עלולות לעבור לחלב האם ומשם לתינוק. הרופא שילך ידוע איתך בסיכון וביתרונות של הנקה כאשר את נטلت הלдол.

פוריות – הלдол עלול להגביר את הרמות של ההורמן פרולקטין, אשר עלול להשפיע על הפרירון בוגרים ובנשים. התיעץ עם הרופא אם יש לך שאלות בעניין זה.

נהיגה ושימוש במכוניות

הלдол עלול להשפיע על היכולת לנוהג ולהשתמש בכלים ובמכוניות. תופעות לוואי, כגון תחושת ישנות, עלולות לפגוע בערנות, במיוחד בתחלת הטיפול או לאחר נטילת מינון גבוה. אין לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהן מבליל دون בכר עם הרופא תחילת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה טబליות הלдол 5 מ"ג מכילות לקטור.

אם הרופא אמר לך כי יש לך סיבות לSOCרים מסוימים, התיעץ עימיו טרם תחילת השימוש בטබליות הלдол.

טబליות הלдол 5 מ"ג מכילות נתרון.

תרופה זו מכילה נתרון בכמות קטנה מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרון ב-4 טබליות (שויה ערך למינון יומי מקסימי של הלдол), ככלומר התרופה נחשבת 'נתולת נתרון'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתחום.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא יאמר לך כמה הלдол ליטול ולמשך כמה זמן. כמו כן, הרופא יאמר לך אם ליטול הלдол פעם אחת ביום או מספר פעמים ביום. ייתכן כי יהלוף פרק זמן מסוים עד אשר תחושה בהשפעתה המלאה של התרופה. הרופא בדרך כלל יתחל ממינון נמוך, ולאחר מכן יתאים למינון המתאים לך.

חשוב מאד שתיטול את הכמות הנכונה.

המינון של הלופרידול שיינתן לך יהיה תלוי:

- בגילך
- בהפרעה שעוברת אתה מקבל טיפול זה
- בעוויתות בכליות או בכבד, אם יש לך
- בתרופות נוספות אותן אתה נוטל.

מבוגרים

• המינון ההתחלתי שלך יהיה בדרך כלל בין 0.5 מ"ג ל-10 מ"ג בכל יום.

• ייתכן שהרופא שלך יתאים את המינון, על מנת לבדוק את המינון שהכי מתאים לך.

• המינון המרבי למבוגרים צריך להיות תלוי במצב הרפואי עבورو אתה מקבל את הטיפול ומשתנה בין 5 מ"ג ל-20 מ"ג בכל יום.

נשים קשישים

• נשים קשישים יתחילה טיפול במינון של 0.5 מ"ג בכל יום או מחצית מהמינון הנמוך למבוגרים.

• מספר הטබליות שאתה לוקח יודעת לעמוד עד אשר הרופא ימצא את המינון שהכי מתאים לך.

• המינון המרבי שאנשים קשישים יכולים לקחת הוא 5 מ"ג בכל יום, אלא אם הרופא החליט שדרוש מינון גבוה יותר.

ילדים ותבגרים בגילאי 17-6 שנים

• המינון שלך יהיה בדרך כלל בין 0.5 מ"ג ל-3 מ"ג בכל יום.

• ייתכן שתבגרים עד גיל 17 שנים, מקבלים טיפול עבור סכיזופרניה או בעוויתות התנהגותיות, ייקחו מינון גבוה יותר של עד 5 מ"ג בכל יום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הלдол מירע לנטילה דרך הפה.

יש ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

יש לבלווע את התרופה עם מעט מים. אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה.

אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פונה מיד לרופא או לחדר מילון של בית

חולמים והבא את אריזת התרופה איתך.

בנטילת מינון יתר עלולים להופיע אחד או יותר מהסימנים הבאים: ירידה במצב העורנות, רעד

חריף או נוקשות יתר של שריריהם.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, אין ליטול מנת כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל

והיוועץ ברופא. לאחר מכן המשך ליטול את התרופה על פי הנחיות הרופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק ליטול הלдол

עליך להפסיק את נטילת הלдол בהדרגה, אלא אם כן הרופא הורה לך אחרת. הפסקת טיפול

פתאומית עלולה לגרום לתופעות, כגון:

- בחילות והקאות
- קשיי שינה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב

משמעותם אם אתה **זקוק להם**.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בה לדול 5 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבחלה במקרה רשותת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

שים לב לתופעות לוואי חמורות

דווח לרופא מיד אם תבחן או תהשוד באחת התופעות שלහן. יתכן כי תזדקק לטיפול רפואי דחוף.

בעיות לב:

• הפרעה בקצב הלב – תופעה זו מפסיקת את פעולתו התקינה של הלב ועלולה לגרום לאיבוד הכרה

• קצב לב מהיר באופן חריג

• פעימות לב נוספות

• תסמונת מקטע QT מוארך

בעיות לב אינן שכיחות בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולות להופיע בעד משתמש אחד מתוך 100). מקרי מוות פתאומיים התרחשו במקריםים שנטלו תרופה זו, אך שכיחותם המדעית של מקרי מוות אלה אינה ידועה. כמו כן, דום לב (לב מפסיק לעיתים) התרחש באנשים שנטלו תרופות אנטי-פסיכוטיות.

בעיה חמורה המכונה 'תסמנת נוירוליפתית ממירה'. תופעה זו גורמת לחום גבוה, לנוקשות שריריים חמורה, לבלבול ולאיבוד הכרה. היא נדירה בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולה להופיע

بعد משתמש אחד מתוך 1,000).

בעיות בשליטה בתנועות הגוף או הגפיים (הפרעה אקסטרא-פירמידלית), כגון:

- תנועות הפה, הלשון, הלסת ולעיתים הגפיים (tardive dyskinesia) – תחושת חוסר מנוחה או קושי לשבת במנוחה, תנועות גוף מגברות תנועות גוף איטיות או מופחתות, עוויותות או תנועות עוויותות רעד או נוקשות בשירים, הליכה מתנדנדת
- אי-יכולת לזרז
- היעדר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעתים נראה כמסיכה.

תופעות אלו הן שכיחות מאוד בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולות להופיע ביותר ממשתמש אחד מתוך 10). אם תסבול מאתת מטופעות אלו, ייתכן כי תקבל תרופה נוספת.

תגובה אלרגית חמורה העוללה לכלול:

- נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון
- קושי בבליעה או בנשימה
- פריחה המלווה בגרד (סרפדת).

תגובה אלרגית אינה שכיחה בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 100).

קרישי דם בורידים, בדרך כלל ברגליים (פקקת בורידים عمוקים – DVT). קרישי דם דווחו באנשים הנוטלים תרופות אנטि-פסיכוטיות. סימני DVT ברגל כוללים נפיחות, כאב ואודם ברגל, אך הקריש עלול להישחף לריאות, תוך גריםמת כאב בחזה וקשיי נשימה. קרישי דם עלולים להיות חמורים מאוד, שכן דוחה לרופא מיד אם תבחן באחת מביעות אלו.

דוחה לרופא מיד אם תבחן באחת מטופעות הלואי החמורות המפורטות לעיל.

טופעות לוואי נוספות

דוחה לרופא אם תבחן או תהשוד באחת מטופעות הלואי שלහן.

טופעות לוואי שכיחות מאוד – תופעות שモפייעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10:

- תחושת אי-שקט
- קשיי שינה
- כאב ראש.

טופעות לוואי שכיחות – תופעות שモפייעות בעד משתמש אחד מתוך 10:

- הפרעה נפשית חמורה, כגון אמונה בדברים שאינם אמיתיים (מחשבות שווא) או ראייה, הרגשה, שמיעה או הרחה של דברים שאינם קיימים (הזיות) דיכאון
- מתח שריריים חריג
- תחושת סחרחות, לרובות בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה
- תחושת ישגוניות
- תנועות עיניים כלפי מעלה או תנועות עיניים מהירות ובלתי נשלטות בעיות ראייה, כגון טשטוש ראייה
- לחץ דם נמוך
- בחילות, הקאות
- עצירות
- יובש בפה או הפרשת רוק מגברת
- פריחה עורית

- אי-יכולת להטיל שtan או לרוקן את השלפוחית לחלוtin
- קושי בהשגת זקה ובסימורה (אין-אונות)
- עלייה או ירידה במסקל
- שינויים המופיעים בבדיקות דם לתפקודי כבד.

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות ש모ופיעות بعد משתמש אחד מתוך 100:

- השפעות על Tai דם – מספר נמוך של כל Tai הדם, לרבות ירידות חמורות בספרית Tai הדם הלבנים ומספר נמוך של טסיות (תאים המסייעים בקרישת דם)
- חששות בלבול
- אובדן החשך המיני או חשך מיני מופחת
- פרוכוסים (עוויותה)
- נוקשות בשירים ובמפרקים
- עוויותה שרירים, תנעותעוויתיות או התכווצויות שאין נשלטות, לרבותעוית בצוואר הגורמת לסייעת הראש לצד אחד
- בעיות הליכה
- קוצר נשימה
- דלקת כבד או בעיית כבד הגורמת להצחבת העור או העיניים (צחבת)
- רגשות מוגברת של העור לאור שימוש גרד
- העזעת יתר
- שינויים במחזורי וסת (מחזוריים חדשים), כגון הייעדר מחזוריים חדשים, או מחזוריים ארוכיים, כבדים ומכאיבים
- ייצור חלב בשדיים באופן בלתי צפוי
- כאב או אי-נוחות בשדיים
- חום גוף גבוה
- נפיחות הנגרמת על ידי הצטברות נוזל בגוף.

תופעות לוואי נדירות – תופעות ש모ופיעות بعد משתמש אחד מתוך 1,000:

- רמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בدم
- היצרות נתיבי האויר בריאות הגורמת לקשיי נשימה
- קושי או אי-יכולת לפתח את הפה
- בעיות בתפקוד מיני.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה – תופעות שכיחותן טרם נקבעה:

- רמה גבוהה של ההורמון אנטி-דיורטי בدم (חסמונהת הכרוכה בהפרשה לקויה של ההורמון אנטี้-דיורטי)
- רמת סוכר נמוכה בدم
- נפיחות סביב תיבת הקול אועוית רגעית של מיתרי הקול העוללה לגרוםלקשיי דיבור או נשימה
- אי ספיקת כבד פתאומית
- הפחחת זרימת המרה ב津ור המרה
- היוציארות קששים בעור או קילוף העור
- דלקת בכלי דם קטנים, שמובילה לפריחה עורית המלווה בבבליטות אדומות או סגולות קטנות
- פירוק רקמת השפיר (תמס שפיר)
- זקה מתמשכת המלווה בכאב בפי
- הגדלת שדיים בגברים

- חום גוף נמוך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלן, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-30°C.

6. מידע נוסף

- **נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, maize starch, talc, cottonseed oil hydrogenated, indigotindisulphonate sodium (E132).

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:**

טבליות עגולות בצבע כחול, קמורות בשני הצדדים, בצד אחד הטבעה של המילה JANSSEN ובצד השני מוחולקות ל-4 חלקים על ידי 2 קווי חציה המאונכים זה לזה. האריזה מכילה 20, 25 או 30 טבליות. ניתן שלא כל גודלי האריזות משוקרים.

יצרן: יאנسن פרמצבטיקה אג.וו, טורנהאוטסוווג 30, בי-2340, בירסה, בלגיה.

בעל הרישום: ג'י-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 025-56-21624-00

לשם הפשטות ולהקלת הקירה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

HALD TAB PL SH 020523