

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

يوتيروكس® 25 ميكروغرام
يوتيروكس® 50 ميكروغرام
يوتيروكس® 100 ميكروغرام

أعراض

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على ليقوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 25، 50 أو 100 مكغ. المواد غير الفعالة والمسمية للحساسية في المستحضر: انظر البند 2 تحت عنوان "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء.
إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء

يوتيروكس بعيارات دوائية مختلفة يستعمل لعلاج الحالات التالية:

- تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد - انفاخ في العنق بسبب تضخم الغدة الدرقية) لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية
- منع تكرر ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية
- بديل للهرمون الطبيعي الذي تنتجه الغدة الدرقية إذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ثيروكسين بكمية كافية
- تثبيط تجدد نمو ورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية
- موازنة مستويات الهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، وذلك عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية

بجرعة دوائية قدرها 100 مكغ وما فوق، يستعمل يوتيروكس لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية.

الفصيلة العلاجية: هورمون الغدة الدرقية (Thyroid).

ليقوثيروكسين، المركب الفعال في يوتيروكس، هو بديل اصطناعي للهرمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية ويستعمل لعلاج أمراض الغدة الدرقية أو في قصور الأداء الوظيفي للغدة الدرقية. ليقوثيروكسين ذو تأثير مشابه للهرمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية.

2. قبل استعمال الدواء

من أجل ضمان استقرار العلاج بالمستحضرات الحاوية ليقوثيروكسين صوديوم، فإن إستبدال مستحضر معين يحوي ليقوثيروكسين صوديوم بمستحضر آخر، يتم فقط باستشارة طبية شخصية وبمراقبة حثيثة للمعالج.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة ليقوثيروكسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6)
- كنت تعاني من خلل وظيفي غير معالج للغدة الكظرية أو الغدة النخامية أو فرط نشاط غير معالج للغدة الدرقية (انسماں درقی)
- كنت تعاني من مرض قلبي شديد (احتشاء عضلة القلب أو التهاب القلب)

لا يجوز استعمال الدواء سوية مع أدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية، وذلك إذا كنت في فترة الحمل (انظر في تحت "الحمل والإرضاع" لاحقاً)

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ يوتيروكس، أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من أحد أمراض القلب التالية:

- اضطراب في تدفق الدم في الأوعية الدموية التاجية (ذبحة صدرية، (angina pectoris
- قصور القلب
- نبض سريع وغير منتظم
- ضغط دم مرتفع
- طبقة شحمية على جدران الشرايين (تصلب الشرايين، (arteriosclerosis

في هذه الحالات يجب أن تكون متوازن من ناحية طبية وذلك قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية. في فترات متقاربة، يتوجب فحص مستويات الهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقية أثناء العلاج بـ يوتيروكس. إذا لم تكن متأكداً من وجود هذه الحالات لديك، أو لا تلقى علاجاً لها، كن على اتصال بالطبيب.

يفحص الطبيب فيما إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الغدة الكظرية، الغدة النخامية أو الغدة الدرقية مع انتفاخ زائد وغير مراقب لهormونات الغدة الدرقية (استقلالية الغدة الدرقية)، لأن هذه الحالات يجب أن تكون متوازنة من ناحية طبية قبل أن تبدأ بتناول يوتيروكس أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية.

يجب مراقبة ضغط الدم بشكل متواتر عند بدء العلاج بـ ليقوثيروكسين لدى خدج الذين كان وزنهم عند الولادة منخفض جداً لأنه قد يحدث هبوط سريع في ضغط الدم (فشل دوراني).

قد يحدث عدم توازن في هرمونات الغدة الدرقية إذا توجب عليك تبديل الدواء الخاص بك بمستحضر آخر يحتوي على ليقوثيروكسين. توجه إلى طبيب إذا توفرت لديك أسلحة بخصوص تبديل الدواء. يتطلب الأمر مراقبة متواترة (سريرية وبيولوجية) خلال فترة الإنقال. احك للطبيب إذا قاسيت من أعراض جانبية لأن ذلك قد يدل على الحاجة لملاءمة المقدار الدوائي (رفع أو خفض).

احك للطبيب:

- إذا كنت في فترة انقطاع الطمث (سن اليأس) أو بعدها (فترة ما بعد سن اليأس)، بسبب الخطورة للإصابة بمرض تخلخل العظام، من الجائز أن يحتاج الأمر فحص نشاط الغدة الدرقية بصورة منتظمة.
- قبل بداية، توقف أو إجراء تغيير في تناول أورليستات (دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة). من الجائز أن تكون هناك حاجة إلى المراقبة عن كثب وملاءمة المقدار الدوائي.
- إذا كنت تقاسي من علامات لاضطرابات ذهانية، فمن الجائز أن يحتاج الأمر إلى المراقبة عن كثب وملاءمة المقدار الدوائي.

لا يجوز استعمال هرمونات الغدة الدرقية لخفض الوزن. إن استعمال هرمونات الغدة الدرقية لا يؤدي إلى انخفاض في وزنك، إذا كانت نسبة هرمون الغدة الدرقية ضمن الحدود الطبيعية. أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تظهر في حال زيادتك للجرعة الدوائية دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول مقدار دوائية مرتفعة من هرمونات الغدة الدرقية مع أدوية معينة لتخفيض الوزن مثل أمفيرامون، كاتين وفيتيل بروپانولامين، لأن خطورة حدوث أعراض جانبية شديدة أو حتى مهددة للحياة قد تزيد.

يجب إعلام الطبيب وأو طاقم المختبر، قبل الفحوصات المخبرية لرصد مستويات هرمونات الغدة الدرقية، بأنك تتناول أو تتناولت البيوتين مؤخراً (المعروف أيضاً كفيتامين H، فيتامين B7 أو فيتامين B8). قد يؤثر البيوتين في نتائج الفحوصات المخبرية. وفقاً للفحص، قد تكون النتائج مرفقة أو منخفضة بشكل غير صحيح بسبب البيوتين. قد يطلب منك الطبيب التوقف عن تناول البيوتين قبل إجراء الفحوصات المخبرية. يجب أن تدرك أيضاً أن منتجات إضافية التي قد تتناولها، مثل الثيتامينات المتعددة أو المكمالت الغذائية للشعر، الجلد والأظافر يمكن أن تحتوي أيضاً على البيوتين. هذا الأمر قد يؤثر في نتائج الفحوصات المخبرية. يجب إعلام الطبيب وأو طاقم المختبر إذا كنت تتناول هذه المنتجات (انظر المعلومات في البند "التدخلات بين الأدوية").

التدخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

يوتيروكس قد يؤثر على عمل الأدوية التالية:

- أدوية مضادة للسكري (أدوية خاضفة لمستوى السكر في الدم):
يوتيروكس قد يقلل من تأثير دواء السكري الذي تتناوله، لذلك يمكن أن تحتاج إلى إجراء فحوص إضافية لمستويات السكر في الدم، خاصة عند بدء العلاج بـ يوتيروكس. أثناء العلاج بـ يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للدواء المضاد للسكري الذي تتناوله.

مشقات الكومارين (أدوية تستعمل لمنع تخثر الدم):

- يوتيروكس قد يزيد من تأثير هذه الأدوية. هذا الأمر يمكن أن يزيد الخطورة لحدوث نزف، خاصة لدى المسنين. لذلك من الجائز أن تكون هناك حاجة إلى فحوص منتظمة لقيم تخثر الدم عند بدء العلاج بـ يوتيروكس وخلاله. أثناء العلاج بـ يوتيروكس، من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي للدواء من فصيلة الكومارين الذي تتناوله.

احرص على تقييدك بالقواعد الزمنية الموصى بها للتناول إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

- الأدوية المستعملة لربط المخصوص الصفراوية وتخفيف المستويات العالية للكوليسترول (مثل كوليستيرامين أو كوليستيبول): تأكد من أنك تتناول يوتيروكس حتى أربع حتى خمس ساعات قبل تناول هذه الأدوية، لأنها قد تسبب امتصاص يوتيروكس من الأمعاء.
- مضادات الحموضة (أدوية تستعمل للتخفيف من المشاكل الهضمية)، سوكرالفات (العلاج القرحات في المعدة أو الأمعاء)، أدوية أخرى الحاوية على المنيوم، الأدوية الحاوية حديد، الأدوية الحاوية على كالسيوم:
تأكد من أنك تتناول يوتيروكس ساعتين على الأقل قبل تناول هذه الأدوية، لأنها قد تقلل من تأثير يوتيروكس.

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد تضعف من تأثير يوتيروكس.

پروبييل ثيوأوراسييل (دواء لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية)

چلوکورتيكونيدات (أدوية سيترونية مضادة للتحسّس ومضادة للالتهاب)

حاجبات بيتا (أدوية خاضفة لضغط الدم تستعمل أيضاً لعلاج أمراض القلب)

سيرتالين (دواء لعلاج الاكتئاب)

كلوروكوبين أو بروجوانيل (أدوية لمنع الملاريا أو لعلاجها)

أدوية تنشط عمل إنزيمات معينة في الكبد مثل باربيتورات (أدوية مهدئة أو أقراص منومة)، كاربامازيبين (دواء لعلاج الصرع، يستعمل أيضاً لتعديل أنواع مختلفة من الألم ولموازنة اضطرابات في المزاج) أو مستحضرات تحتوي نبتة سانت جونز (دواء عشبي)

أدوية حاوية إستروجين المستعملة للعلاج الهرموني البديل أثناء فترة سن اليأس وبعدها أو كوسائل مانعة للحمل

سيثيلامير (دواء يربط الفوسفات يستعمل لعلاج مرضي يعانون من فشل كلوي مزمن)

مثبطات تيروزين كيناز (أدوية مضادة للسرطان ومضادة للالتهاب)

- مثبطات مضخة البروتون (مثل أوميپرازول، إيزوميپرازول، رابيپرازول، والنسوپرازول) التي تستعمل لتقليل كمية الحمض المنتجة عن طريق المعدة، مما قد يقلل من امتصاص ليوثيروكسين من الأمعاء وبالتالي يجعله أقل فعالية. إذا كنت تتناول ليوثيروكسين أثناء علاجك بمثبطات مضخة البروتون، فسيقوم طبيبك بمتابعة وظيفة الغدة الدرقية لديك وقد يحتاج إلى ملائمة جرعة يوتيروكس أورليستات (دواء يستعمل لعلاج السمنة المفرطة)

- بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شانك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، لأنها قد تزيد من تأثير يوتيروكس:
- ساليسيلات (أدوية تستعمل لتخفيف الألم أو لتخفيف السخونة)
 - ديكومارول (دواء مضاد لتخثر الدم)
 - فوروسيميد بجرعة دوائية عالية قدر ما 250 ملг أو أكثر (دواء مدر للبول)
 - كلوفيرات (دواء لتحفيض نسب الشحوم في الدم)

- بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرًا أو من شانك أن تتناول واحد من الأدوية المدونة أدناه، فهي قد تؤثر على عمل يوتيروكس:
- ريتوناخير، إينديناخير، لوبينافير (مثبطات بروتياز، أدوية لعلاج HIV)
 - فينيتوتين (دواء لعلاج الصرع)

من الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص منتظمة لقيم هورمون الغدة الدرقية. من الجائز أن يحتاج الأمر إلى ملائمة الجرعة الدوائية لـ يوتيروكس.

بلغ الطبيب إذا كنت تتناول أميدارون (دواء يستعمل لعلاج اضطرابات نظم القلب)، لأن هذا الدواء قد يؤثر على وظيفة وعلى نشاط الغدة الدرقية.

إذا كنت بحاجة لإجراء صورة باشعة رنген أو فحوص تشخيصية أخرى بواسطة مواد ظليلة تحوي بود، بلغ الطبيب بأنك تتناول يوتيروكس. من الجائز أن يتطلب منك تلقي حقنة التي قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.

إذا كنت تتناول البيوتين أو تناولته مؤخرًا، فيجب عليك اعلام الطبيب وأو طاقم المختبر قبل الفحوصات المخبرية لرصد مستويات هرمونات الغدة الدرقية. قد يؤثر البيوتين في نتائج الفحوصات المخبرية (انظر البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").

استعمال الدواء والطعام

بلغ الطبيب إذا كنت تتناول منتجات الصويا، خاصة إذا كنت تغير من نسبة منتجات الصويا التي تستهلكها في الغذاء. المنتجات الحاوية صويا قد تخفض امتصاص يوتيروكس من الأمعاء ولذلك من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير الجرعة الدوائية التي تتناولها من يوتيروكس.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، استمري بتناول يوتيروكس. تكلمي مع الطبيب، لأنه من الجائز أن تكون حاجة لملائمة الجرعة الدوائية. إذا كنت تتناولين يوتيروكس بصورة متزامنة مع دواء مضاد لنشاط الغدة الدرقية من أجل معالجة فرط إنتاج هورمونات الغدة الدرقية، سوف يوصيتك الطبيب بالتوقف عن العلاج بـ يوتيروكس أثناء فترة الحمل.

إذا كنت في فترة الإرضاع، استمري بتناول يوتيروكس حسب ما أوصى به الطبيب. إن كمية الدواء المطروحة في حليب الأم تكون صغيرة بحيث لا تؤثر على الرضيع.

السيادة واستعمال الماكينات

لم تُجر أيَّاث عن تأثير الدواء على القدرة على السيادة وتشغيل ماكينات. بما أن ليوثيروكسين يشابه هورمون الغدة الدرقية المنتج في الجسم بصورة طبيعية، فمن غير المتوقع أن يضر الدواء يوتيروكس من القدرة على السيادة وتشغيل ماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء

يحتوي الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملг) من الصوديوم للجرعة – يعتبر "حال من الصوديوم".
يحتوي يوتيروكس 25 مكغ على حتى 18 مكغ صوديوم
يحتوي يوتيروكس 50 مكغ على حتى 19 مكغ صوديوم
يحتوي يوتيروكس 100 مكغ على حتى 21 مكغ صوديوم

3. كيفية استعمال الدواء

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج سوف يحددان من قبل الطبيب فقط.

بحد لـك الطبيب الجرعة الدوائية التي تتناول بالاعتماد على فحوص مختلفة وفحوص مخبرية. تبدأ عادة بجرعة دوائية منخفضة، تزداد كل أسبوعين حتى أربعة أسابيع، إلى أن يتم ملائمة الجرعة الدوائية النهائية لك شخصيًّا. خلال الأسابيع الأولى للعلاج، يجب أن تُحدد لك مواعيد لإجراء فحوص مخبرية. يعتمد على نتائج الفحوص لتحديد الجرعة الدوائية المناسبة لك.

إذا ولد رضيعك مع قصور في نشاط الغدة الدرقية (hypothyroidism)، من الجائز أن يوصي الطبيب بالبدء بجرعة دوائية أكبر، لأنه من المهم إعطاء البديل للهورمون بسرعة. الجرعة الدوائية الإبتدائية الموصى بها هي 10 حتى 15 ميكروغرام لكل كيلوغرام وزن جسم وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى. بعد ذلك، يحدد الطبيب الجرعة الدوائية التي تتناسب رضيعك.

- المجالات الإعْتِياديَّة للجرعات الدوائيَّة مسجَّلة في الجدول أدناه. مع ذلك، من الجائز أن جرعة دوائية أقل يمكن أن تكون مناسبة إذا:
- كنت مسؤًّا

- كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية
- كنت تعاني من قصور شديد أو متواصل في نشاط الغدة الدرقية
- كان وزن جسمك منخفضاً أو كان لديك ورم درقي كبير

| الجرعة الدوائية اليومية الموصى بها من يوتيروكس | | استطبابات لتناول يوتيروكس |
|---|-----------------------|---|
| 75 حتى 200 ميكروغرام | | <ul style="list-style-type: none"> • لعلاج تضخم الغدة الدرقية الحميد (ورم درقي حميد) لدى معالجين ذوي نشاط سليم للغدة الدرقية |
| 75 حتى 200 ميكروغرام | | <ul style="list-style-type: none"> • لمنع تكرر ظهور ورم درقي بعد عملية جراحية |
| للاطفال | للكبار | <ul style="list-style-type: none"> • لإستبدال الهرمون الطبيعي المنتج من قبل الغدة الدرقية، إذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ثيروكسين بكمية كافية |
| 12.5 حتى 50 ميكروغرام | 25 حتى 50 ميكروغرام | <ul style="list-style-type: none"> - جرعة دوائية ابتدائية |
| 100 حتى 150 ميكروغرام لمتر مربع من سطح الجسم | 100 حتى 200 ميكروغرام | <ul style="list-style-type: none"> - جرعة دوائية داعمة |
| 150 حتى 300 ميكروغرام | | <ul style="list-style-type: none"> • لتشبيط نمو الورم لدى معالجين يعانون من سرطان الغدة الدرقية |
| 50 حتى 100 ميكروغرام | | <ul style="list-style-type: none"> • لموازنة مستويات الهرمون الذي تنتجه الغدة الدرقية، عندما يعالج فرط نشاط الغدة الدرقية بأدوية مثبطة لنشاط الغدة الدرقية |
| 150 ميكروغرام: بدء العلاج 4 أسابيع قبل الفحص: يجب البدء بـ 75 ميكروغرام لمدة أسبوعين، ومن ثم 150 ميكروغرام حتى الشخص 200 ميكروغرام (قرصان من يوتيروكس 100 ميكروغرام): بدء العلاج: أسبوعان قبل الفحص | | <ul style="list-style-type: none"> • لفحص سلامة نشاط الغدة الدرقية |

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

- أقراص يوتيروكس مخصصة للإعطاء عن طريق الفم.
- دائمًا يجب تناول كامل الجرعة اليومية صباحًا، على معدة خاوية (على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الفطور)، من المستحسن مع قليل من سائل، مثلًا نصف كأس من الماء.
- للرضع يجب إعطاء كامل الجرعة اليومية من يوتيروكس على الأقل نصف ساعة قبل وجبة الطعام الأولى اليومية. قبل الاستعمال مباشرة، اسحق القرص واخلطه مع القليل من الماء، قبل إعطائه للطفل مع إضافة قليلة من سائل. حضر دائمًا خليطًا طازجًا كالمطلوب.

للفرص خط شطر للتقسيم.

مدة العلاج:

تتعلق مدة العلاج بالحالة الصحية التي من أجلها أنت تعالج بـ يوتيروكس. لذلك ينافسك الطبيب بخصوص الفترة الزمنية التي تحتاجها لتناول هذا الدواء. أغلب المعالجين يجب أن يتناولوا يوتيروكس طوال حياتهم.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر فمن الجائز أن تشعر بأعراض كنبض سريع، فاق، عدم هدوء أو حرکات غير إرادية. اختلالات قد تظهر في حالات فردية لدى معالجين يعانون من اضطرابات عصبية كالصرع. قد تظهر أعراض اضطرابات ذهانية (ذهان) حادة وذلك لدى مرضى معرضون لخطرة حدوث اضطرابات ذهانية. راجع الطبيب إذا كنت تلاحظ أي عرض من بين الأعراض المذكورة هنا.
إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المناسبة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

يمتنع تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية بخصوص كيفية استعمال الدواء، راجع الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال في كل دواء، إن استعمال يوتيروكس قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني منها.

من الجائز أن تشعر بعرض واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية المذكورة أدناه إذا كنت تتناول يوتيروكس أكثر مما وصف لك، أو إذا كانت الجرعة الدوائية التي حدثت لك غير ملائمة (مثلاً إذا تمت زيادة الجرعة الدوائية بشكل سريع):
نبض سريع أو غير منتظم، ألم في الصدر، صداع، ضعف عضلي أو تقلص عضلي، تورّد الوجه (شعور بسخونة واحمرار في الوجه)، سخونة، تقيؤات، عدم انتظام الدورة الشهرية، ورم دماغي كاذب (pseudotumor cerebri)، ضغط زائد داخل الجمجمة، ارتجاف، عدم الراحة، اضطرابات في النوم، تعرق، انخفاض في الوزن، حالات إسهال.

إذا كنت تلاحظ أي عرض جانبي من الأعراض التي ذكرت هنا، راجع الطبيب. من شأن الطبيب أن يقرر إيقاف العلاج لعدة أيام أو يقلل الجرعة الدوائية اليومية حتى اختفاء الأعراض الجانبية.

ردود فعل تحسسية لأي من مكونات يوتيروكس (انظر البند 6 "معلومات إضافية"). ردود فعل تحسسية يمكن أن تتضمن طفح، شرى وانتفاخ الوجه أو الحنجرة (وذمة وعلبية). فإذا حدث ذلك، راجع الطبيب حالاً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

تبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روبي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب حفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي (المجاري) أو القمامات المنزلية. اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد استعمالك بعد. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً -

Maize starch, citric acid (anhydrous), gelatin, croscarmellose sodium, magnesium stearate, mannitol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلب:

أعراض يوتيروكس 25، 50 و 100 ميكروغرام هي بيضاء اللون، دائرة الشكل، مسطحة من جانبها، ذات حافة مائلة. وعلى السطح العلوي للقرص يوجد خط للشطر مع الكتابة 25 EM، 50 EM أو 100 EM، حسب الترتيب.
تحتوي كل علبة من يوتيروكس 25 مكغ على 50 أو 100 قرص.
تحتوي كل علبة من يوتيروكس 50 مكغ ويوتيروكس 100 مكغ على 30، 50 أو 100 قرص.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمتياز وعنوانه: ميرك سيرونو م.ض، شارع هاكيشون 18، ياقهه 81220

اسم المنتج وعنوانه: Merck Healthcare KGaA، دارمشتات، ألمانيا

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

رقم تسجيل يوتيروكس 25 مكغ 99-37022-16-170

رقم تسجيل يوتيروكس 50 مكغ 00-33604-50-147

رقم تسجيل يوتيروكس 100 مكغ 00-33605-51-147

تم تحرير هذه النشرة في أيلول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.