

ה לדולTM 2 מ"ג/מ"ל טיפות

חומר פעיל

כל 1 מ"ל (20 טיפות) מכיל הלופרידול 2 מ"ג (haloperidol 2 mg/1 ml) (zie פירוטן).
חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרכופה" וסעיף 6 "מידע גנוטף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופתך. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התroppה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תroppה זו נרשמה לטיפול במחלתהך. אל תעביר אותה לאחרך. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיעדת התרבות?

ה לדול מיעוד עבור חולמים מוגרים בני 18 שנים ומעלה:

- לטיפול בסכיזופרניה וב הפרעה סכיזואפקטיבית.
 - לטיפול אקטואי בבלבול חריף (דליירום) לאחר CISלון טיפולים שאינם רפואיים.
 - לטיפול באירועי מניה מתונים עד חמורים הקשורים להפרעה דו-קוטבית I, כאשר טיפולים אחרים אינם ניתנים לשימוש.
 - לטיפול בא-שקט פסיכומוטורי חריף הקשור להפרעה פסיכוטית או לאירועי מניה על רקע הפרעה דו-קוטבית I.
 - לטיפול בתוקפנות מתמשכת ובתסמים פסיכוטיים בחולים עם דמנציה מותנה עד חמורה על רקע מחלת אלצהיימר ודמנציה וסקולרית לאחר CISלון טיפולים שאינם רפואיים וכשהם קיימים סיכון לפגיעה עצמית או לפגיעה באחרים.
 - לטיפול בהפרעות טיקים, לרבות תסמונת טורט, בחולים עם פגיעה חמורה לאחר CISלון טיפולים חינוכיים, פסיכולוגיים ותרופה אחרים.
 - לטיפול בכוריאה קלה עד מותנה במהלך הנטינגטון, כאשר תכשירים רפואיים אחרים אינם יעילים או אינם נסכללים.

עבור ילדים חולים:

- לטיפול בסכיזופרניה במתבגרים בני 13 עד 17 שנים כאשר טיפולים תרופהתיים אחרים כשלו או אינם נסבלים.
 - לטיפול בתוקפנות חמורה מתמשכת ילדים ובמתבגרים בני 6 עד 17 שנים עם אוטיזם או הפרעות התפתחותיות נרחבות, כאשר טיפולים אחרים כשלו או אינם נסבלים.
 - לטיפול בהפרעות טיקום, לרבות תסמונת טורט, ילדים ובמתבגרים בני 10 עד 17 שנים עם פגיעה חמורה לאחר CISלון טיפולים חינוכיים, פסיכולוגיים ותרופהתיים אחרים.

קבוצת רפואיים: הלдол שיר לקבוצת חומרים אנטי-פסיקוטיים משפחתי הבוטירופנוורים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (הלופרידול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספת").
 - אתה פוחת מודע לדברים סביך או התגובה שלך נעשו איטיות באופן לא רגיל.
 - יש לך פרקינסון.
 - יש לך דמנציה (שיטיון) מסווג דמנציה עם גופיפי לואי ('Lewy body dementia').
 - יש לך מחלת עצבית ניוונית של המוח – Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
 - יש לך הפרעה בלב המכונה תסמנות מקטע QT מוארך, או כל בעיה אחרת בקצב הלב אשר מופיעה כממצא חריג בתרשים אק"ג (אלקטרוקardiוגרם).

- יש לך אי ספיקת לב או היה לך התקף לב לאחרונה.
- יש לך רמה נמוכה של אשגן בدم אשר לא טיפולה.
- אתה נוטל את אחת התרופות המופיעות בראשימה של תרופות שאין ליטול ביחד עם הלдол (ראה סעיף 2 "אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות").
- אין להשתמש בתרופה זו אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לך. אם אין בטוח, היועץ ברופא לפני קייחת הלдол.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

תופעות לוואי חמורות

הלдол עלול לגרום לביעות לבב, לביעות בשליטה על חנויות הגוף או הגפיים ולתופעת לוואי חמורה הנקראת 'תסמנת נוירולפטית ממארה'. הלдол יכול גם לגרום לתגובה אלרגיות חמורות ולקישי דם. עליך להיות מודע לתופעות לוואי חמורות בעת שאתה נוטל הלдол מכיוון שאתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף. ראה 'שים לב לתופעות לוואי חמורות' בסעיף 4.

אנשים קשישים ואנשים עם דמנציה

דוחה עלייה קטנה במקרי מוות ושבץ באנשים קשישים עם דמנציה הנוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות. שוחח עם הרופא שלך לפני שתתילול הלдол אם אתה קשיש, במיוחד אם אתה סובל מדמנציה.

לפני השימוש בהלдол, ספר לרופא אם:

- יש לך קצב פעימות לב איטי, מחלת לב או מישחו מבני המשפחה הקרובה שלך ממת באופן פתאומי מביעות לב.
- יש לך לחץ דם נמוך או שאתה חש סחרחות בעת מעבר לertz ישיבה או עמידה.
- יש לך רמה נמוכה של אשגן או מגניזום (או אלקטROLיט אחר) בדם. הרופא שלך יחליט כיצד לטפל בזה.
- אין פעם היה לך דימום במוח או אם הרופא שלך אמר לך שהיסכוי שלך ללקות בשbez גדול של אנשים אחרים.
- יש לך אפילפסיה או אי פעם היו לך פרקושים (עוויתות).
- יש לך בעיות בכליות, בכבד או בבלוטת התריס.
- יש לך רמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בדם או סרטן העולול להיגרם על ידי רמות גבוהות של פרולקטין (כגון סרטן שד).
- יש לך היסטוריה של קרishi דם או אם מישחו מבני המשפחה שלך יש היסטוריה של קרishi דם.
- יש לך דיכאון או הפרעה דו-קוטבית ואתה מתחיל להרגיש מדויק.

ויתכן כי תזדקק ל谦卑 צמוד יותר, וויתכן שייהיה צריך לשנות את המינון של הלдол שאתה נוטל. אם אין לך בטוח האם אחד המרכיבים המפורטים לעיל רלוונטי לך, התיעץ עם הרופא שלך או הרוקח טרם נטילת הלдол.

ילדים מתחת לגיל 6 שנים

אין להשתמש בהלдол בילדים מתחת לגיל 6 שנים. זאת מאחר שהתרופה לא נחקרה כראוי בקבוצת גיל זו.

בדיקות ומעקב

ויתכן שהרופא שלך ירצה להפנות אותך לבדיקת אלקטרו-קורדיוגרם (אקס'ג') לפני או במהלך הטיפול בהלдол. בדיקת אקס'ג' מודדת את הפעילות החשמלית של הלב.

בדיקות דם

ויתכן שהרופא שלך ירצה לבדוק את הרמות של אשגן או מגניזום (או אלקטROLיט אחר) בדם, לפני או במהלך הטיפול בהלдол.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תרופה אחרת, תרופה נוספת כולל תרופות ללא מרשם ותוספי

תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין ליטול הלдол אם אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול:

- בעיות קצב לב (כגון אמיודרון, דופטיליד, דיזופיראמיד, דרונדארון, איבוטיליד, כינידין, סוטולוֹן)
- בדיכאון (כגון ציטאלופראם ואצטיאלאופראם)
- בפסיכוזות (כגון פלופנאזין, לבומפרומזין, פרפנאזין, פימוזיד, פרוכלורופרזין, פרומאזין, סרטינידול, תיורידאיין, טריפילואופריזין, טריפלופרומזין ח'יפראסידון)
- בזיהומיים בקטריאליים (כגון איזיתרומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין, לבופולוקסצין, מוקסיפילוקסצין וטליתרומיצין)
- בזיהומיים פטרירתיים (כגון פנטאמידיין)
- במלריה (כגון הלופנטרין)
- בבחילות והקאות (כגון דולסטרון)
- בסרטן (כגון טורמיפן וונדטניב).

כמו כן, דוחה לרופא אם אתה נוטל בפרידיל (טיפול בכאב בחזה או להורדת לחץ דם) או מתדון (לשיכון כאבים או לטיפול בהתקמכותה לסמים).

תרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לעבויות לב, لكن עליך להתייעץ עם הרופא אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו ואל טיפול הלдол (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם").

יתכן שידרש מעקב מיוחד אם אתה נוטל ליתיום והlodol בו-זמןית.

יש צורך בניטור מיוחד אם אתה נוטל את שתי התרופות יחד. יש לדוחה לרופא מיד ולהפסיק טיפול את שתי התרופות בו-זמןית אם אתה סובל מ:

- חום לא מוסבר או תנעות לא נשכחות
- בלבול, חוסר התמצאות, כאב ראש, בעיות בשווי משקל ותחושת ישנוויות כל אלה סימנים למצב חמור.

תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של הלдол או להגביר את הסיכון לביעות לב.

דוחה לרופא אם אתה נוטל:

- אלפרازולאם או בוספירון (טיפול בחרדה)
- Dolokstien, פלאוקסטין, פלבוקסמין, נפוזדון, פארוקסטין, סרטרلين, St. John's wort (היפריקום פרפורטום) או נולפאקסין (טיפול בדיכאון)
- בופרופיון (טיפול בדיכאון או לסיווע בהפסקת עישון)
- קרבמיופין, פנוברביטל או פניטואין (טיפול באפילפסיה)
- ריפאמפייצין (טיפול בזיהומיים בקטריאליים)
- איטרקונזול, פוסאكونזול או ווריקונזול (טיפול בזיהומיים פטרירתיים)
- טבליות קטוקונזול (טיפול בתסמונת קושינג)
- אינדיינאביר, ריטונאביר או סקווניאביר (טיפול בגין חסל החיסוני האנושי – HIV)
- כלורופרומזין או פרומתזין (טיפול בבחילות והקאות)
- וראפאמיל (טיפול בגין לחץ דם או בעיות לב).

כמו כן, דוחה לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, כגון תרופות משתנות.

יתכן שהרופא יצטרכ לשנות את המינון של הלдол שאתה נוטל אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

הלдол יכול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות מהסוגים שלללו:

ספר לרופא שלא אם אתה נוטל תרופות ל:

- הרגעה או לסיווע בהפרעותamina (תרופות הרגעה)
- טיפול בכאב (משככי כאבים חזקים)
- טיפול בדיכאון (ונגדי דיכאון טריציקליים)
- הורדת לחץ דם (כגון גואנטידין ומתיילדופה)
- טיפול בתגובהות אלרגיות חמורות (אדראניין)
- טיפול בהפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) או במרקולפסיה (ידועות כתרופות ממראיות)

- טיפול במחלת פרקינסון (כגון לבודופה)
 - דילולدم (פנינדיון)
- התיעץ עם הרופא טרם נטילת הלдол אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לערבב הלдол 2 מ"ג/מ"ל טיפול עם קצת מים לפני הנטילה אולם אין לערבב הלдол 2 מ"ג/מ"ל טיפול עם כל נאול אחר.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיית אלכוהול במהלך נטילת הלдол עלולה לגרום לשינויות ולהפחחת העורנות. משמעות הדבר היא כי עליך לנוהג משנה זהירות לגבי כמות האלכוהול שאתה שותה. התיעץ עם הרופא לגבי שתיית אלכוהול בעת נטילת הלдол, ודוחה לרופא על כמות האלכוהול שאתה שותה.

הירין, הנקה ופוריות

הירין – אם את בהירין, חושבת שתאת בהירין או מתכנת להרות, פני לרופא להתייעצות. הרופא שלך עשוי ליעץ לך לא ליטול הלдол במהלך ההירין.

הבעיות שלහן עלולות להתרכש בילדים של אימהות הנוטלות הלдол במהלך 3 החודשים האחרונים להירין (השליש האחרון):

- רעד שרירים, נוקשות או חולשת שרירים
- ישינויות או אי-שקט
- קשי נשימה או קשי בהאכלה

שכיחותן המדויקת של בעיות אלו אינה ידועה. אם נטلت הלдол במהלך ההירין ותינוק מפתח אחת מתופעות לוואי אלו, פני לרופא.

הנקה – התיעיצי עם הרופא אם את מיניקה או מתכנת להיניק. זאת לאחר שכמויות קטנות של התרופה עלולות לעבור לחלב האם ומשם לתינוק. הרופא שלך ידוע איתך בסיכונים וביתרונות של הנקה כאשר את נוטלת הלдол.

פוריות – הלдол עלול להגביר את הרמות של ההורמון פרולקטין, אשר עלול להשפיע על הפרוון בגברים ובנשים. התיעץ עם הרופא אם יש לך שאלות בעניין זה.

נהייה ושימוש במכונות

הלдол עלול להשפיע על היכולת לנוהג ולהשתמש בכלים ובמכונות. תופעות לוואי, כגון תחושת ישינויות, עלולות לפגוע בערנותך שלך, במיוחד בשלב ההתיפול או לאחר נטילת מינון גבוה. אין לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות כלשהן מבלי לדון בכך עם הרופא תחילה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הלдол 2 מ"ג/מ"ל טיפול מכיל את המרכיב מתיל פרהידרוקסיבנזואט (methyl parahydroxybenzoate). חומר זה עלול לגרום לתגובה אלרגית. התגובה עלולות להתרכש זמן מה לאחר התחלת נטילת הלдол 2 מ"ג/מ"ל טיפול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

הרופא יאמר לך כמה הלдол ליטול ולמשך כמה זמן. כמו כן, הרופא יאמר לך אם ליטול הלдол פעם אחת ביום או מספר פעמים ביום. ייתכן שיחלוףפרק זמן מסוים עד אשר תחשוש בהשפעתה המלאה של התרופה. הרופא בדרך כלל יתחיל מינון נמוך, ולאחר מכן יתאים למינון המתאים לך. חשוב מאוד שתיטול את הכמות הנכונה.

המשמעות של הופרידול שיענתן לר יהיה תלוי:

- ביגלר
 - בהפרעה שעבורה אתה מקבל טיפול זה
 - בעיות ביכולות או בכבד, אם יש לך
 - בתרופות נוספות אותן אתה גוטל.

מבוגרים

- המינון ההתחלתי שלך יהיה בדרך כלל בין 0.5 מ"ג ל-10 מ"ג בכל יום.
 - ייתכן שהרופא שלך יתאים את המינון, על מנת לבדוק את המינון שהכי מתאים לך.
 - המינון המירבי למבוגרים צריך להיות תלוי במצב הרפואי עבورو אתה מקבל את הטיפול ומשתנה בין 5 מ"ג ל-20 מ"ג בכל יום.

אנשים קשישים

- המינון המירובי שאנשים קשישים יכולים ללקחת הוא 5 מ"ג בכל יום, אלא אם הרופא החליט שדרישת מינון גבוהה יותר.
 - המינון של הלдол יותאם עבורך עד אשר הרופא ימצא את המינון שהכי מתאים לך.
 - אנשים קשישים יתחילה טיפול במינון של 0.5 מ"ג בכל יום או מחצי מהמינון הנמור למבוגרים.

ילדיים ומתבגרים בגילאי 17-6 שנים


- המינון שלך יהיה בדרך כלל בין 0.5 מ"ג ל-3 מ"ג בכל יום.
 - ייתכן שמתבגרים עד גיל 17 שנים, המקבלים טיפול עבור סכיאופרניה או בעיות התנהגותיות, יקחו מינון גבוה יותר של עד 5 מ"ג בכל יום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הולדול מירוע לנטילה דרר הפה.

אתה יכול לחת את הטיפות לאחר ערבות בכמות קטנה של מים; אין לערבות עם נחל אחר. חשוב מאוד לחת את הכמות המתאימה של הלודל.

הוראות לפתיחת הבקבוק:



- סגור את הבקבוק.
 - שתה את התמיסה מיד.
 - מספר הטיפות שאתה צריך ליטול.
 - לחץ בעדינות על דפנות הבקבוק וספר את מספר הטיפות שאתא צריך ליטול.
 - מעל כף.
 - לאחר הפתיחה הפוך את הבקבוק כלפי מטה מטה תורן כדי סיוב נגד כיון השעון.
 - על מנת להסיר את הפקק יש להחוץ כלפי פתיחה אקרואית על ידי ילדים.
 - סגור בפקק בטיחותי למינעת הבקבוק.

אם נטלה בטעות מינון גובה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעל ילב מן התרפופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים וhäבא את אריזת התרפופה איתך.

עלולים להופיע אחד או יותר מהסימנים הבאים: ירידה במצב העורנות, רעד חריף או נוקשות יתר של שריריהם.

אם שכחת ליטול את התروفה

אם שחתת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. לאחר מכן המשך ליטול את התרופה על פי הנחיות הרופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק ליטול הלдол

עליך להפסיק את נטילת הלдол בהדרגה, אלא אם כן הרופא הורה לך אחרת. הפסקת טיפול פתאומית עלולה לגרום לתופעות, כגון:

- בחרילות והקאות
- קשיי שינה.

יש להתמיד בטיפול כדי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה דזוקם להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהולדול 2 מ"ג/מ"ל טיפות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

שים לב לתופעות לוואי חמורות

דוחה לרופא מיד אם תבחן או תהשוד באחת התופעות שלහן. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף.

בעיות לב:

- הפרעה בקצב הלב – תופעה זו מפסיקת את פעולתו התקינה של הלב ועלולה לגרום לאיבוד הכרה
- קצב לב מהיר באופן חריג
- פעימות לב נוספות
- תסמונת מקטע QT מוארך

בעיות לב אינן שכיחות בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולות להופיע بعد משתמש אחד מתוך 100). מקרי מוות פתאומי התתרחשו במטופלים שנטלו תרופה זו, אך שכיחותם המדויקת של מקרי מוות אלה אינה ידועה. כמו כן, דום לב (לב מפסיק לעיתים) התתרחש באנשים שנטלו תרופה אנטיפסיקוטית.

בעיה חמורה המכונה 'תסמונת נוירולפטית ממארה'. תופעה זו גורמת לחום גבוה, לנוקשות שרירים חמורה, לבלבול ולאיבוד הכרה. היא נדירה בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולה להופיע بعد משתמש אחד מתוך 1,000).

בעיות בשליטה בתנועות הגוף או הגפיים (הפרעה אקסטרה-פירמידלית), כגון:

- תנודות הפה, הלשון, הלסת ולייתים הגפיים (tardive dyskinesia)
- תחרשת חוסר מנוחה או קשיי לשבת במנוחה, תנודות גוף מגברות
- תנודות גוף איטיות או מופחתות, עזיותות או תנודות עזיותות
- רעד או נוקשות בשרירים, הליכה מתנדנדת
- אי-יכולת לzech
- הידרר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעתים נראה כמסיכת.

תופעות אלו הן שכיחות מאוד בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולות להופיע ביותר ממשתמש אחד מתוך 10). אם תסבול מאתת מתופעות אלו, ייתכן שתקבל תרופה נוספת.

תגובה אלרגית חמורה העולמה לכלול:

- נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון
- קשיי בבליעה או בנשימה
- פריחה המלולה בגוף (סרפדה).

תגובה אלרגית אינה שכיחה בקרב אנשים הנוטלים הלдол (עלולה להופיע بعد משתמש אחד מתוך 100).

קרישי דם בורידים, בדרך כלל ברגליים (פקקת בורידים עמוקים – DVT). קרישי דם דווחו באנשים הנוטלים תרופות אנטיב-פסיכוטיות. סימני DVT ברגל כוללים נפיחות, כאב ואודם ברגל, אך הكريש עלול להיסחף לריואת, תוך גירמת כאב בחזה וקשיי נשימה. קרישי דם עלולים להיות חמורים מאד, لكن דווח לרופא מייד אם תבחן באחת מביעות אלו. דווח לרופא מייד אם תבחן באחת מתופעות הלועאי החמורות המפורטוות לעיל.

תופעות לוואי נוספות

דווח לרופא אם תבחן או תהשוד באחת מתופעות הלועאי שלහן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד – תופעות שモפייעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10:

- תחרשות אי-סקט
- קשיי שינה
- כאב ראש.

תופעות לוואי שכיחות – תופעות שモפייעות بعد משתמש אחד מתוך 10:

- הפרעה נפשית חמורה, כגון אמונה בדברים שאינם אמיתיים (מחשבות שווא) או ראייה, הרגשה, שמיעה או הרחה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- דיכאון
- מתח שריריים חריג
- תחרשות סחרחות, לרבות בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה
- תחרשות ישנות
- תנועת עיניים כלפי מעלה או תנועות עיניים מהירות ובלתי נשלטות
- בעיות ראייה, כגון טשטוש ראייה
- לחץ דם נמוך
- בחילות, הקאות
- עצירות
- יובש בפה או הפרשת רוק מוגברת
- פריחה עורית
- אי-יכולת להטיל שtan או לרוקן את השלפוחית לחלוין
- קושי בהשגת זקופה ובשמורה (אין-אונות)
- עלייה או ירידת משקל
- שינויי המופיעים בבדיקות דם לתפקודי כבד.

תופעות לוואי שאין שכיחות – תופעות שモפייעות بعد משתמש אחד מתוך 100:

- השפעות על tai דם – מספר נמוך של tai הדם, לרבות ריריות חמורות בספירת tai הדם הלבנים ומספר נמוך של טסיות (תאים המסיעים בקרישת דם)
- תחרשות הבלבול
- אובדן החשך המוני או חشك מוני מופחת
- פרטוסים (עוויתות)
- נוקשות בשירים ובמפרקיהם
- עוויתות שרירים, תנועות עוויתיות או התכווצויות שאין נשלטות, לרבות עווית בצוואר הגורמת לסיבוב הראש לצד אחד
- בעיות הליכה
- קוצר נשימה
- דלקת כבד או בעיית כבד הגורמת להצבת העור או העיניים (צחבת)
- רגישות מוגברת של העור לאור שימוש גרד
- העת יתר
- שינויי במחזורי וסת (מחזוריים חדשים), כגון היעדר מחזוריים חדשים או מחזוריים ארוכים, כבדים ומכאיבים
- ייצור חלב בשדיים באופן בלתי צפוי

- כאב או אי-נוחות בשדיים
- חום גוף גבוה
- נפיחות הנגרמת על ידי הצלברות נוזל בגוף.

תופעות לוואי נדירות – תופעות שモופיעות بعد משתמש אחד מתוך 1,000:

- רמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בدم
- היצרות נתיבי האויר בריאות הגוף לקשיי נשימה
- קושי או אי-יכולת לפתוח את הפה בעיות בתפקוד מיני.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה – תופעות שכיחותן טרם נקבעה:

- רמה גבוהה של ההורמון אנטי-דיאורטי בدم (تسمונת הכרוכה בהפרשה לקויה של ההורמון אנטי-דיאורטי)
- רמת סוכר נמוכה בדם
- נפיחות סביב תיבת הקול או עווית רגעית של מיתרי הקול העוללה לגרום לקשיי דיבור או נשימה
- אי ספיקת כבד פתואמית
- הפחחת זרימת המריה ב津ור המרתה
- היוציארות קשქשים בעור או קילוף העור
- דלקת בклיע דם קטנים, שמובילה לפיריחה עורית המלווה בבליטות אדומות או סגולות קטנות
- פירוק רקמת השדריר (תמס שריר)
- זקפה מתמשכת המלווה בכאב בפיں
- הגדלת שדיים בגברים
- חום גוף נמוך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוונה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנع הרעלת התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתם. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-30°C. אין להקפיא.

לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק אין להשתמש בהלдол 2 מ"ג/מ"ל טיפול מעבר ל-3 חודשים.

6. מידע נוסף

• נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactic acid, methyl parahydroxybenzoate and purified water.

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:
התכשיר מגיע באירועה של 15 מ"ל או 30 מ"ל.
התכשיר מגיע בבקבוק עם מונת טיפות המכיל תמיסה צוללה ושקופה.
ייתכן שלא כל גודלי האריזות מסווגים.

- **יצרן:** יאנסן פרמצבטיקה א.ג.ר, טורנהווטסוווג 30, בי-2340, בירסה, בלגיה.
 - **בעל הרישום:** ג'י-סי הלט' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.
 - **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 029-70-25163-00
- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בפברואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

HALD DROP PL SH 020523