

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

هالدول™ 5 ملغ

أقراص

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على هالوپریدول 5 ملغ (haloperidol 5 mg)

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

هالدول مخصص للمرضى الكبار بعمر 18 سنة وما فوق:

- لعلاج الفضام والإضطراب الفصامي العاطفي.
- للعلاج الحاد بالإرتباك الشديد (هنيان) بعد فشل العلاجات غير الدوائية.
- لعلاج حوادث الهوس المعتدلة حتى الشديدة المتعلقة بإضطراب ثنائي القطب I، عندما لا يمكن إستعمال علاجات أخرى.
- لعلاج عدم الهدوء النفسي الحركي الحاد المرتبط بإضطراب ذهاني أو أحاديث الهوس على خلفية إضطراب ثنائي القطب I.
- لعلاج العدواية المستمرة والأعراض الذهانية لدى مرضى الخرف المعتمد حتى الشديد على خلفية مرض الزهايمير والخرف الواعي بعد فشل العلاجات غير الدوائية وعندما تكون هنالك خطورة لإلحاق الأذى بالنفس أو إلحاق الأذى بآخرين.
- لعلاج إضطرابات الخلاجات، بما في ذلك متلازمة توريت، لدى مرضى لديهم تضرر شديد بعد فشل العلاجات التربوية، النفسية والدوائية الأخرى.
- لعلاج الرقاصل الطفيف حتى المعتمد في مرض هنتنقون، عندما تكون المستحضرات الطبية الأخرى غير ناجعة أو لا يمكن تحملها.

بالنسبة للأطفال المرضى:

- لعلاج الفضام لدى مراهقين أعمارهم 13 حتى 17 سنة عندما تفشل العلاجات الدوائية الأخرى أو لا يمكن تحملها.
- لعلاج العدواية الشديدة المستمرة لدى الأطفال والراهقين أعمارهم 6 حتى 17 سنة المصابين بالتوحد أو بإضطرابات النمو واسعة النطاق، عندما تفشل العلاجات الأخرى أو لا يمكن تحملها.
- لعلاج إضطرابات الخلاجات، بما في ذلك متلازمة توريت، لدى الأطفال والراهقين أعمارهم 10 حتى 17 سنة الذين لديهم تضرر شديد بعد فشل العلاجات التربوية، النفسية والدوائية الأخرى.

الفصيلة العلاجية: ينتمي هالدول إلى مجموعة المواد المضادة للذهان من فصيلة البوتيروفينونات.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (هالوپيريدول) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
 - كنت أقل إدراكاً للأشياء من حولك أو أن ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل غير اعتيادي.
 - يوجد لديك مرض پاركينسون.
 - يوجد لديك خرف (dementia) من نوع الخرف مع أجسام ليو (Lewy body dementia).
 - يوجد لديك مرض عصبي ضموري للدماغ - Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
 - يوجد لديك إضطراب قلبي يسمى متلازمة إطالة مقطع QT أو آية مشكلة أخرى في نظم القلب التي تظهر كنتيجة شاذة في التخطيط الكهربائي للقلب (ECG).
 - يوجد لديك قصور قلبي أو عانيت من نوبة قلبية مؤخراً.
 - وُجِدت لديك نسبة منخفضة لليوتوساسيوم في الدم لم يتم معالجتها.
 - كنت تتناول إحدى الأدوية التي تظهر في قائمة الأدوية التي لا يجوز تناولها سوية مع هالدول (أنظر الفقرة 2 "التدخلات/التفاعلات بين الأدوية").
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كانت إحدى الأمور المذكورة أعلاه تتطبق عليك. إذا لم تكن واثقاً، إستشر الطبيب قبل تناول هالدول.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

أعراض جانبية خطيرة

قد يسبب هالدول مشاكل في القلب، مشاكل في التحكم في حركات الجسم أو الأطراف وعرض جنبي خطير يسمى 'متلازمة مضادات الذهان الخبيثة'. يمكن أن يسبب هالدول أيضاً ردود فعل تحسسية خطيرة وخثرات دموية. يجب أن تكون على دراية بالأعراض الجانبية الخطيرة أثناء تناولك هالدول لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل. انظر 'إنتبه للأعراض الجانبية الخطيرة' في الفقرة 4.

الأشخاص المسنون والأشخاص المصابون بالخرف

تم التبليغ عن زيادة طفيفة في حالات الوفاة والسكنة الدماغية لدى الأشخاص المسنين المصابين بالخرف الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان. تحدث مع طبيبك قبل أن تتناول هالدول إذا كنت مسنًا، خاصة إذا كنت تعاني من الخرف.

قبل إستعمال هالدول، إحك لطبيبك إذا:

- وُجد لديك تباطؤ في نظم نبضات القلب، مرض قلبي أو توفي أحد أفراد عائلتك القريبة بشكل مفاجئ نتيجة مشاكل قلبية.
- وُجد لديك إنخفاض في ضغط الدم أو إذا كنت تشعر بدوران أثناء الإنقال إلى وضعية الجلوس أو الوقوف.
- وُجِدت لديك نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو شاردة كهربائية أخرى) في الدم. سوف يقرر طبيبك كيفية معالجة ذلك.
- كان لديك ذات مرة نزف في الدماغ، أو إذا قال لك طبيبك بأن إحتمال إصابتك بسكنة دماغية أكبر مقارنة بالأشخاص الآخرين.
- وُجد لديك صرع أو كانت لديك ذات مرة إختلالات (تشنجات).
- وُجِدت لديك مشاكل في الكلى، في الكبد أو في الغدة الدرقية.
- وُجِدت لديك نسبة مرتفعة من هورمون الپرولاكتين في الدم أو سرطان الذي قد ينجم عن نسب مرتفعة للپرولاكتين (مثل سرطان الثدي).

- وُجدت لديك سابقة لخثرات دموية أو إذا كانت لأحد أفراد عائلتك سابقة لخثرات دموية.
- وُجد لديك إكتئاب أو إضطراب ثنائي القطب وبدأت تشعر بإحباط.

من الجائز أن تحتاج لمراقبة حثيثة أكثر، ومن الجائز أن تكون هناك حاجة للتغيير المقدار الدوائي الذي تتناوله من هالدول.

إذا لم تكن واثقاً إذا كانت إحدى الحالات المفصلة أعلاه تطبق عليك، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هالدول.

الأطفال دون عمر 6 سنوات

لا يجوز إستعمال هالدول لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات. ذلك لأنه لم يتم بحث الدواء كما ينبغي لدى هذه الفئة العمرية.

الفحوص والمتابعة

من الجائز أن يرغب طبيبك بتحويمك لإجراء فحص التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) قبل أو خلال العلاج بـ هالدول. فحص التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) يقيس النشاط الكهربائي للقلب.

فحوص الدم

من الجائز أن يرغب طبيبك بفحص نسب البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو شاردة كهربائية أخرى) في الدم، قبل أو خلال العلاج بـ هالدول.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

لا يجوز تناول هالدول إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج:

- مشاكل في نظم القلب (مثل أميودارون، دوفيتيليد، ديسوپيراميد، درونيدارون، إيبوتيليد، كينيدين، سوتالول)
- الإكتئاب (مثل سيتالوپرام أو إستالوپرام)
- الذهان (مثل فلوفينازين، ليقوميرومازين، پيرفينازين، پيموزيد، پروكلورپيرازين، پرومازين، سرتيندول، ثيوريدازين، تريفلوپيرازين، تريفلوپرومازين وزيراسيون)
- التلوثات الجرثومية (مثل أزيثروميسين، كلاريثروميسين، إريثروميسين، ليثوفلوكساسين، موکسيفلوكساسين وتيليثروميسين)
- التلوثات الفطرية (مثل بنتاميدين)
- الملاريا (مثل هالوفانترین)
- الغثيان والتقيؤات (مثل دولاسيترون)
- السرطان (مثل توريميفين وفانديتانيب).

كذلك، بلغ الطبيب إذا كنت تتناول ببيريديل (لعلاج الألم في الصدر أو لخفض ضغط الدم) أو ميثادون (لتسكن الآلام أو لعلاج الإدمان على المخدرات).

قد تزيد هذه الأدوية من خطورة حدوث مشاكل في القلب، لذلك عليك إستشارة الطبيب إذا كنت تتناول أيّاً من هذه الأدوية ولا يجوز أن تتناول هالدول (أنظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").

من الجائز أن تتطبق مراقبة خاصة إذا كنت تتناول الليثيوم وهالدول في نفس الوقت.

هناك حاجة لمراقبة خاصة إذا كنت تتناول كلا الدوائين معًا. يجب إبلاغ الطبيب على الفور والتوقف عن تناول

كلا الدوائين في نفس الوقت إذا كنت تعاني من:

- سخونة غير مبررة أو حركات خارجة عن السيطرة

- إرباك، توهان، صداع، مشاكل في التوازن والشعور بالنعاس كل هذه هي علامات على وجود حالة خطيرة.

قد تؤثر بعض الأدوية على طريقة عمل هالدول أو تزيد من خطورة حدوث مشاكل القلب.
بلغ الطبيب إذا كنت تتناول:

- ألپرازولام أو بوسپيرون (العلاج الفلق)
- دولوكسيتين، فلوأوكسيتين، فلوقوكسامين، نيفازودون، باروكسيتين، سيرترالين، St. John's wort (هيبيريكوم بيرفوراتوم) أو فينلافاكسين (العلاج الإكتناب)
- بوپروپيون (العلاج الإكتناب أو المساعدة في الإقلاع عن التدخين)
- كاربامازيبين، فينوباربيتال أو فينيتوئين (العلاج الصرع)
- ريفاميبسيين (العلاج للتلوثات الجرثومية)
- إيتراكونازول، پوساكونازول أو فوريكونازول (العلاج للتلوثات الفطرية)
- أقراص كيتوكونازول (العلاج متلازمة كوشينغ)
- إيندينافير، ريتونافير أو ساكوينافير (العلاج فيروس الفشل المناعي البشري - HIV)
- كلورپرومازين أو پروميثازين (العلاج الغثيان والتقيؤات)
- فيрапاميل (العلاج فرط ضغط الدم أو مشاكل القلب).

كذلك، بلغ الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، مثل أدوية مدرة للبول.
من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى تغيير المقدار الدوائي الذي تتناوله من هالدول إذا كنت تتناول أيًّا من هذه الأدوية.

يمكن أن يؤثر هالدول على طريقة عمل أدوية من الأنواع التالية:

إحكام طبيبك إذا كنت تتناول أدوية من أجل:

- التهدئة أو المساعدة في إضطرابات النوم (أدوية مهدئة)
- علاج الألم (مسكنتات الآلام القوية)
- علاج الإكتناب (مضادات الإكتناب ثلاثة الحلقة)
- خفض ضغط الدم (مثل جوانثيدين وميثيل دوپا)
- علاج ردود الفعل التحسسية الخطيرة (أدنريالين)
- علاج إضطرابات الإصغاء وفرط النشاط (ADHD) أو النوم الإنثيابي (المعروف بأدوية المنشطة)
- علاج مرض پاركينسون (مثل ليقودوبا)
- تمبييع الدم (فينينديون)

إشتهر الطبيب قبل تناول هالدول إذا كنت تتناول إحدى هذه الأدوية.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

إن شُرب الكحول أثناء تناول هالدول قد يسبب النعاس وإنخفاض اليقظة. هذا يعني أنه يجب أن تكون حذراً بالنسبة لكمية الكحول التي تشربها. إشتهر الطبيب حول شرب الكحول أثناء تناول هالدول، وبلغ الطبيب عن كمية الكحول التي تشربها.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل - إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، فتوجهي إلى الطبيب من أجل الإستشارة. قد ينصحك طبيبك بعدم تناول هالدول خلال فترة الحمل.

قد تحدث المشاكل التالية عند حدثي الولادة لأمهات تتناولن هالدول خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (الثالث الأخير):

- إرتجاف العضلات، تصلب أو ضعف العضلات
- نعاس أو عدم الهدوء
- صعوبات في التنفس أو صعوبة في الإطعام

إن الشيوع الدقيق لهذه المشاكل غير معروف. إذا تناولت هالدول أثناء الحمل وتطورت لدى رضيعك إحدى تلك الأعراض الجانبية، فتوجهي إلى الطبيب.

الإرضاع - استشيري الطبيب إذا كنت مريضة أو تخاطبين لإرضاع. نظراً لأن كميات قليلة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الأم ومن ثم إلى الرضيع. سيناقشك طبيبك حول مخاطر وفوائد الإرضاع أثناء تناولك هالدول.

الخصوصية - قد يزيد هالدول من نسب هورمون البرولاكتين، والذي قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال والنساء. إستشر الطبيب إذا توفرت لديك أسئلة حول هذا الموضوع.

السيادة وإستعمال الماكنات

من شأن هالدول أن يؤثر على القدرة على السيادة وإستعمال الأدوات والمراكبات. الأعراض الجانبية، مثل الشعور بالغثيان، قد تؤثر على القيادة، خاصة عند بدء العلاج أو بعد تناول مقدار دوائي مرتفع. لا يجوز السيادة أو إستعمال أدوات أو مراكبات أياً كانت دون مناقشة هذا الأمر مع الطبيب أولاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء تحتوي أقراص هالدول 5 ملغ على اللكتوز.

إذا قال لك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إستشره قبل بدء إستعمال أقراص هالدول. تحتوي أقراص هالدول 5 ملغ على الصوديوم.

تحتوي هذا الدواء على صوديوم بكمية أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) صوديوم في 4 أقراص (يساوي بالقيمة لمقدار دوائي يومي أقصى من هالدول)، أي أن الدواء يعتبر خالٍ من الصوديوم.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستفصاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة لمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

سيخبرك الطبيب عن مقدار هالدول الذي يجب أن تتناوله ولأي فترة زمنية. كذلك، سيخبرك الطبيب ما إذا كان عليك تناول هالدول مرة واحدة في اليوم أو عدة مرات في اليوم. من الجائز أن ينقضي بعض الوقت إلى أن تشعر بالتأثير الكامل للدواء. عادة ما سيبدأ الطبيب بمقدار دوائي منخفض، وبعد ذلك يقوم بملاءمة المقدار الدوائي الذي يناسبك. من المهم جداً أن تتناول الكمية الصحيحة.

يتعلق المقدار الدوائي الذي سيُعطى لك من هالوپيريدول:

- بعمرك
- بالإضطراب الذي من أجله تناولت هذا العلاج
- بالمشاكل في الكلى أو في الكبد، إذا وجدت لديك
- بالأدوية الإضافية التي تتناولها.

الكبار

- المقدار الدوائي الإبتدائي الخاص بك يكون عادة ما بين 0.5 ملغ حتى 10 ملغ في كل يوم.

- من الجائز أن يقوم طبيبك بملاءمة المقدار الدوائي، من أجل فحص المقدار الدوائي الأنسب بالنسبة لك.
- المقدار الدوائي الأقصى للكبار يجب أن يعتمد على الحالة الطبية التي من أجلها تلتقي العلاج ويتراوح بين 5 ملخ حتى 20 ملخ في كل يوم.

الأشخاص المسنون

- سبباً الأشخاص المسنون العلاج بمقدار دوائي ذو 0.5 ملخ في كل يوم أو نصف المقدار الدوائي الأدنى للكبار.
- سنتم ملائمة عدد الأقراص التي تتناولها حتى يجد الطبيب المقدار الدوائي الأنسب بالنسبة لك.
- المقدار الدوائي الأقصى الذي يمكن للأشخاص المسنين تناوله هو 5 ملخ في كل يوم، إلا إذا قرر الطبيب أن هناك حاجة لمقدار دوائي أعلى.

الأطفال والراهقون بأعمار 6-17 سنة

- المقدار الدوائي الخاص بك يكون عادة ما بين 0.5 ملخ حتى 3 ملخ في كل يوم.
- من الجائز أن يتناول المراهقون حتى عمر 17 سنة، الذين يتلقون علاجاً للفصام أو لمشاكل سلوكية، مقداراً دوائياً أعلى يصل حتى 5 ملخ في كل يوم.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

هالدول مخصص للتناول عن طريق الفم.

يجب تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

يجب بلع الدواء مع قليل من الماء. لا تتوفر معلومات حول السحق/الشطر/المضغ.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

عند تناول مقداراً دوائياً مفرطاً قد تظهر واحدة أو أكثر من العلامات التالية: تدلي في حالة اليقطة، إرتجاف حاد أو تصلب مفرط في العضلات.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب. بعد ذلك يستمر بتناول الدواء وفق تعليمات الطبيب.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول هالدول

عليك التوقف عن تناول هالدول تدريجياً، إلا إذا أوصاك الطبيب خلاف ذلك. إن التوقف المفاجئ عن العلاج قد يسبب أعراضًا، مثل:

- غثيان وتقيؤات
- صعوبات في النوم.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.
إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال هالدول 5 ملغ قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

إنتبه للأعراض الجانبية الخطيرة

بلغ الطبيب على الفور إذا كنت تلاحظ أو تشكي بـأحدى الأعراض التالية. من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ.

مشاكل قلبية:

- إضطراب في نظم القلب - تؤدي هذه الظاهرة إلى توقف العمل السليم للقلب وقد تسبب فقدان الوعي
- تسارع نظم القلب بشكل شاذ
- نبضات قلب إضافية
- متلازمة إطالة مقطع QT

مشاكل القلب غير شائعة لدى أشخاص يتناولون هالدول (قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100). حدثت حالات الموت المفاجئ لدى مرضى تناولوا هذا الدواء، ولكن الشيوع الدقيق لحالات الموت هذه غير معروف. كذلك، حدثت حالات لسكتة قلبية (توقف القلب عن النبض) لدى الأشخاص الذين تناولوا أدوية مضادة للذهان.

مشكلة خطيرة تسمى 'متلازمة مضادات الذهان الخبيثة'! تؤدي هذه الظاهرة لسخونة مرتفعة، لتصلب شديد في العضلات، لإرتباك وفقدان للوعي. إنها نادرة لدى الأشخاص الذين يتناولون هالدول (قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000).

مشاكل في التحكم في حركات الجسم أو الأطراف (إضطراب خارج الهرمي)، مثل:

- حركات الفم، اللسان، الفك وأحياناً الأطراف (tardive dyskinesia)
- الشعور بعدم راحة أو صعوبة الجلوس بهدوء، تزايد حركات الجسم
- حركات جسم بطيئة أو قليلة، تشنج أو حركات تشنجية
- إرتجاف أو تصلب في العضلات، تأرجح في المشي
- عدم القدرة على الحركة
- إنعدام وجود تعبيرات وجه سليمة، وهو تعبير أحياناً يشبه القناع.

هذه الأعراض شائعة جدًّا لدى الأشخاص الذين يتناولون هالدول (قد تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10). إذا عانيت من إحدى هذه الأعراض، من الجائز أن تلتقي دواء إضافياً.

رد فعل تحسسي خطير قد يشمل:

- إنتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة
- صعوبة في البلع أو في التنفس
- طفح مترافق بحكة (شرى).

رد الفعل التحسسي ليس شائعاً لدى الأشخاص الذين يتناولون هالدول (قد يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100).

خثرات دموية في الأوردة، عادة في الرجلين (خثار الأوردة العميقه - DVT). تم الإبلاغ عن حدوث خثرات دموية لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان. علامات حدوث DVT في الرجل تشمل إنتفاخ، ألم وإحمرار في الرجل، ولكن قد تنتقل الخثرة إلى الرئتين، مما يسبب ذلك ألمًا في الصدر وصعوبات في التنفس. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة جدًّا، لذا بلغ الطبيب على الفور إذا لاحظت إحدى هذه المشاكل.

بلغ الطبيب على الفور إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة المفصلة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية

بلغ الطبيب إذا كنت تلاحظ أو تشكي بأحدى الأعراض الجانبية التالية.

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10:

- الشعور بقلة الهدوء
- صعوبات في النوم
- صداع.

أعراض جانبية شائعة - أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 :

- إضطراب نفسي خطير، مثل الإعتقاد بأن شيئاً ليست حقيقة (أوهام) أو رؤية، شعور، سمع أو شم أشياء غير موجودة (هلوسة)
- إكتئاب
- توتر عضلي شاذ
- الشعور بدوار، بما في ذلك عند الانتقال لوضعية الجلوس أو الوقوف
- الشعور بنعاس
- حركة نحو الأعلى للعينين أو حركات سريعة وخارجية عن السيطرة للعينين
- مشاكل في الرؤية، مثل تشوش الرؤية
- ضغط دم منخفض
- غثيان، تقيؤات
- إمساك
- جفاف في الفم أو زيادة إفراز اللعاب
- طفح جلدي
- عدم القدرة على التبول أو على إفراغ المثانة البولية بالكامل
- صعوبة في تحقيق إنتصاب العضو الذكري والحفظ عليه (عجز جنسي)
- زيادة أو تناقص الوزن
- تغيرات التي تظهر في فحوص الدم لوظائف الكبد.

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100:

- تأثيرات على خلايا الدم - عدد منخفض لكافة خلايا الدم، بما في ذلك إنخفاضات شديدة في تعداد خلايا الدم البيضاء وعدد منخفض للصفائح الدموية (الخلايا التي تساعد على تخثر الدم)
- الشعور بالإرتباك
- فقدان الرغبة الجنسية أو تدني الرغبة الجنسية
- إختلالات (تشنجات)
- تصلب في العضلات وفي المفاصل
- تشنجات عضلية، حركات تشنجية أو تقلصات خارجة عن السيطرة، بما في ذلك حدوث تشنج في الرقبة الذي يسبب دوران الرأس إلى جانب واحد
- مشاكل في المشي
- ضيق في التنفس
- إلتهاب الكبد أو مشكلة في الكبد التي تسبب إصفرار الجلد أو العينين (برقان)
- زيادة حساسية الجلد لأشعة الشمس

- حكة
- زيادة التعرق
- تغيرات في دورات الطمث (دورات الشهرية)، مثل غياب دورات شهرية، أو دورات طويلة، شديدة ومؤلمة
- إنتاج غير متوقع للحليب في الثديين
- ألم أو إزعاج في الثديين
- إرتفاع درجة حرارة الجسم
- إنفاس ناتج عن تراكم سائل في الجسم.

أعراض جانبية نادرة - أعراض التي تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000:

- إرتفاع نسبة هورمون البرولاكتين في الدم
- تضييق الممرات الهوائية في الرئتين مما يسبب صعوبات في التنفس
- صعوبة أو عدم القدرة على فتح الفم
- مشاكل في الوظيفة الجنسية.

أعراض جانبية شيوعها غير معروفة - أعراض شيوعها لم يحدد بعد:

- إرتفاع نسبة الهرمون المضاد لإدرار البول في الدم (متلازمة تتعلق بخل في إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول)
- إنخفاض نسبة السكر في الدم
- إنفاس حول حجرة الصوت أو تشنج مؤقت في الأوتار الصوتية الذي قد يسبب صعوبات في النطق أو في التنفس
- قصور كبيدي مفاجئ
- إنخفاض تدفق الصفراء في القناة الصفراوية
- تكون قشور على الجلد أو تقرش الجلد
- إلتهاب في الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي يتراافق بتنوعات صغيرة حمراء أو بنفسجية
- نقك الأنسجة العضلية (إنحلال العضلات المخططة)
- إنتصاب مستمر للقضيب الذكري الذي يتراافق بألم في القضيب
- تضخم الثديين عند الرجال
- إنخفاض درجة حرارة الجسم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضيع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, talc, cottonseed oil hydrogenated, indigotindisulphonate sodium (E132).

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص مستديرة بلون أزرق، محدبة من كلا الجانبين، طبعت على جانب واحد الكلمة JANSSEN والجانب الثاني مقسم إلى 4 أجزاء بواسطة خطٍ شطري متعمدين الواحد مع الآخر.
تحتوي العلبة على 20، 25 أو 30 قرصاً من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

- المنتج: يانسن فارماسيتيكا إن.فـ، تورنهوتسيويچ 30، بي-2340، بيرزه، بلجيكا.

- صاحب الإمتياز: جيبي - سي هيلث كير م.ض، كيبوتس شفافيم 6099000، إسرائيل.

- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 025-21624-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في شباط 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

HALD TAB PL SH 020523