

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أبيترن فتائل 50 ملغ فتائل

التريكيب

تحتوي كل فتيلة على:

ديكلوفيناك صوديوم 50 ملغ

(Diclofenac sodium 50 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتدبر حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مضاد للإلتهابات ومسكن للألام مثل تلك المتعلقة بالمفاصل، بالعضلات وبالهيكل العظمي، بالعمليات الجراحية السنوية وبالعمليات الجراحية البسيطة الأخرى.

الفصيلة العلاجية

من مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs).

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

● كنت تعتقد بأنك حساس (اليرجي) للمادة الفعالة (ديكلوفيناك صوديوم) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية")، أو كنت حساساً (اليرجي) للأسبيرين، إيبوبروفن أو مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs) الأخرى. علامات لرد فعل تحسسي مفرط تشمل إنتفاخ الوجه والعم (وذمة وعائية)، مشاكل في التنفس، ألم في الصدر، رشح، طفح جلدي أو أي رد فعل تحسسي آخر.

● لديك حالياً، أو كانت لديك في الماضي قرحة (ulcer) في المعدة أو في الإثني عشر (قرحة هضمية) أو نزف في الجهاز الهضمي (هذا يمكن أن يشمل دم في القيء، نزف عند إفراغ الأمعاء، دم جديد في البراز أو براز أسود).

● كانت لديك مشاكل في المعدة أو في الأمعاء بعد تناول مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs) أخرى.

● وُجد لديك فشل في القلب، الكلى أو الكبد.

● لديك مرض معروف في القلب و/أو مرض في الأوعية الدموية الدماغية مثلاً: إذا اجتزت في الماضي نوبة قلبية، سكتة دماغية، سكتة إقفارية عابرة (TIA)، إنسداد الأوعية الدموية المؤدية للقلب أو للدماغ أو إذا اجتزت أي عملية لإزالة أو لتجاوز الإنسداد.

● وجدت لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في الدورة الدموية (مرض في الشرايين المحيطية).

● كنت في الثلث الثالث من الحمل.

● كنت في فترة الإرضاع.

● كنت تعاني من بذل مجهود غير مجدي لإفراغ الأمعاء، إسهال أو نزف شرجي.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ أبيترن فتائل 50 ملغ، إحك الطبيب إذا:

● كنت تعاني من إضطرابات في المعدة أو الأمعاء، بما في ذلك الإلتهاب القولوني القرحي (ulcerative colitis) أو مرض كرون (Crohn's disease).

● وُجدت لديك مشاكل في الكلى أو الكبد، أو كنت أنت مسناً.

● كنت أنت تعاني من البورفيريا (porphyria).

● كنت أنت تعاني من أية إضطرابات في الدم أو من نزف. إذا كنت كذلك، فمن الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوص روتينية خلال فترة استعمال هذه الفتائل.

● وُجد لديك ذات مرة ربو.

● وُجد لديك ذبحة صدرية، خثرات دموية، ضغط دم مرتفع، نسب أعلى من الحد الطبيعي للشحوم في الدم (ارتفاع الكولسترول أو ارتفاع نسبة الشحوم الثلاثية).

● لديك مشاكل في القلب، كانت لديك سكتة دماغية، أو كنت تعتقد بأنك معرض لخطورة حدوث هذه الحالات (مثلاً، إذا وجد لديك ارتفاع في ضغط الدم، سكري أو ارتفاع في الكولسترول أو كنت من المدخنين).

● لديك سكري.

● أنت من المدخنين.

● لديك مرض الذئبة (ذئبة إحصارية جهازية [SLE]) أو حالة مشابهة.

تحذيرات خاصة إضافية

عليك استعمال المقدار الدوائي الأكثر إنخفاضاً من فتائل أبيترن 50 ملغ للفترة الزمنية الممكنة الأقصر، خاصة إذا كنت تعاني من نقص في الوزن أو كنت مسناً.

مثل الأدوية الأخرى المشابهة لـ أبيترن، فإن أبيترن فتائل 50 ملغ قد يزيد قليلاً من خطورة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. تكون الخطورة أكبر إذا كنت تستعمل مقداراً دوائياً أكبر لفترة طويلة. دائماً يجب التقيد بتعليمات الطبيب بالنسبة للمقدار الدوائي ولمدة العلاج.

إذا شعرت في أي وقت خلال فترة استعمال الدواء بعلامات أو بأعراض لمشاكل في القلب أو في الأوعية الدموية، مثل ألم في الصدر، ضيق في التنفس، ضعف أو صعوبة في التطق، إتصل بطبيبك فوراً.

خلال فترة استعمالك لـ أبيترن فتائل 50 ملغ، من الجائز أن يوجهك الطبيب لإجراء فحوص روتينية من حين لآخر.

إذا وُجدت لديك سابقة لمشاكل في المعدة عند استعمالك لمضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs)، خاصة إذا كنت مسناً، عليك التبليغ للطبيب فوراً إذا لاحظت أعراض شاذة.

● بسبب كون هذا المستحضر مضاد للإلتهاب، فإن أبيترن فتائل 50 ملغ قد يجب علامات حدوث تلوث مثل صداع وسخونة مرتفعة. إذا شعرت بسوء عليك التوجه للطبيب، تذكر التنويه بأنك تستعمل أبيترن فتائل 50 ملغ.

قبل استعمال أبيترن فتائل 50 ملغ، إحك لطبيبك إذا اجتزت مؤخرًا، أو أنك مقبل على إجتناب عملية جراحية في البطن أو في الجهاز الهضمي، لأنه أحياناً قد تعرقل الفتائل شفاء الجروح بعد عملية جراحية في الأمعاء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تستعمل:

● أدوية لعلاج السكري

● مضادات التخثر (أقراص لتميع الدم مثل وارفارين)

● مدرات البول

● ليثيوم (لعلاج مشاكل نفسية معينة)

● ميثوتريكسات (أمراض الإلتهابية معينة وأنواع سرطان معينة)

● سيكلوسبورين وتاكروليموس (المستعملان لعلاج أمراض الإلتهابية معينة وبعد زراعة أعضاء)

● تريميثوبريم (دواء لمنع حدوث تلوثات في المسالك البولية أو لعلاجها)

● مضادات حيوية من نوع كوتريول (للثلوثات)

● أي أدوية أخرى من نوع NSAIDs (مضادات الإلتهاب لاستيرويدية) أو مثبطات COX-2 (cyclo-oxygenase-2)، مثلاً أسبيرين أو إيبوبروفن

● ميفيفيستون (دواء يستعمل لإيقاف الحمل)

● الجليكوزيدات القلبية (مثلاً ديجوكسين)، المستعملة لعلاج المشاكل القلبية

● أدوية تسمى SSRIs المستعملة لعلاج الإكتئاب (مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين)

● ستيرويدات بالإعطاء عن طريق الفم (دواء مضاد للإلتهاب)

● أدوية تستعمل لعلاج مشاكل قلبية أو ارتفاع ضغط الدم، مثلاً حاجبات بيتا أو مثبطات ACE

● فوريكوزانول (دواء لعلاج الثلوثات الفطرية)

● فينيثوثين (دواء لعلاج الإختلاجات)

● كوليستيبول وكوليستيرامين (يستعملان لخفض الكولسترول)

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

لا يجوز استعمال فتائل أبيترن 50 ملغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأن استعمالها قد يلحق الضرر بالجنين أو يسبب مشاكل أثناء الولادة. يمكن أن يسبب الإستعمال مشاكل في الكلى وفي قلب الجنين. يمكن أن يتسبب الإستعمال في حدوث ميل للزف عند الرضيع والأم وأن يتسبب بذلك أن تكون الولادة متأخرة أكثر أو أطول من المتوقع.

لا يجوز استعمال فتائل أبيترن خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية وتم وصفه من قبل طبيبك. إذا كنت بحاجة إلى علاج خلال هذه الفترة أو أثناء محاولتك الحمل، فيجب إستعمال أقل مقدار دوائي لأقصى فترة ممكنة.

إبتداءً من الأسبوع الـ 20 من الحمل، لهذا المستحضر هناك عرض جانبي محتمل لتضرر كلوي لدى الجنين، مما يؤدي إلى نقص السائل الأمنيوسي أو تضيق الأوعية الدموية في قلب الرضيع (ductus arteriosus).

يوصى بالإمتناع عن استعمال المستحضرات من فصيلة الـ NSAIDs ابتداءً من الأسبوع الـ 20 من الحمل واستشارة فرد من الطاقم الطبي إذا دعت الحاجة.

هل أنت تخططين لحصول حمل؟ إن استعمال فتائل أبيترن 50 ملغ قد يجعل من الصعب حصول حمل. عليك إستشارة طبيبك إذا كنت تخططين لحصول حمل أو إذا وُجدت لديك صعوبات في حصول حمل.

الإرضاع

بالمشابهة للأدوية الأخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs)، فإن ديكلوفيناك ينتقل إلى حليب الأم. لذا، لا يجوز استعمال أبيترن فتائل خلال فترة الإرضاع.

السياقة وإستعمال الماكينات

من حين لآخر بلغ متعاملون بأن فتائل ديكلوفيناك صوديوم سببت لهم الشعور بدوار، إرقاق أو نعاس، كما أنه يُبلغ أيضاً عن مشاكل في الرؤية. إذا تأثرت على هذا النحو من استعمال الدواء، فعليك الإمتناع عن السياقة وعن إستعمال الماكينات.

الإستعمال لدى الأطفال

إن أبيترن فتائل 50 ملغ غير مناسب للإستعمال لدى الأطفال.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الفتيلة ولذلك يعتبر خالٍ من الصوديوم.

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الاعتيادي لدى الكبار عادةً هو: فتيلتان في اليوم. في الحالات الشديدة، من الجائز أن يوصي الطبيب بعلاج مشترك مع الأقراص.

لا يجوز تجاوز مقدار دوائي يومي إجمالي قدره 150 ملغ من ديكلوفيناك صوديوم.

المسنون

من الجائز أن يوصيك الطبيب بإستعمال مقدار دوائي أخفض من المقدار الدوائي الاعتيادي لدى الكبار. بالإضافة لذلك، من الجائز أن يرغب الطبيب بالتأكد من أن فتائل أبيترن لا تؤثر سلباً على معدتك، بالأخص على إمتداد الـ 4 أسابيع الأولى من إستعمال الفتائل.

يجب إستعمال هذا الدواء في الأوقات المحددة كما حُدد من قبل الطبيب المعالج.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الإستعمال

لا يجوز البلع، الفتائل مخصصة للإدخال لفتحة الشرج (rectum). يوصى بإستعمال الفتائل بعد حدوث نشاط للأمعاء.

يتبع >

ملاحظة: إذا كانت الفتيلة رخوة بحيث لا يمكن إدخالها، بالإمكان تبريدها بالتخزين في البراد خلال نحو 30 دقيقة، أو بواسطة وضعها تحت تيار من الماء البارد قبل نزع الغلاف.

1. أولاً، اغسل يديك جيداً.
2. إنزع الغلاف عن الفتيلة. بالإمكان ترطيب الفتيلة بالقليل من الماء لتسهيل الإدخال.
3. استلق على جانبك وأدخل الفتيلة بلطف عميقاً لداخل فتحة الشرج بواسطة الأصبع.
4. اغسل يديك جيداً بعد إدخال الفتيلة.

فحوص ومراقبة

خلال فترة العلاج المطول بالدواء، أو في العلاج الذي يلزم استعمال مقادير دوائية عالية، يجب إجراء فحوص دم، بول ووظائف الكبد والكلية. من الجائز حدوث ارتفاع إنزيمات الكبد، الذي يلزم إيقاف العلاج بعد استشارة الطبيب (أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية").

إذا كنت تعاني من مرض قلبي موجود أو من أخطار هامة لحدوث مرض قلبي، يقيم طبيبك من جديد ومن حين لآخر فيما إذا كان عليك مواصلة العلاج بالدواء، خاصة إذا كنت تتعالج لفترة تزيد عن أربعة أسابيع.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت استعمال هذا الدواء في الوقت المخصص، فيجب استعمال مقدار دوائي حال تذكرك بذلك، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال مقدارين دوائيين سوية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معه.

لا يجوز استعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال أيبترن فئاتل 50 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية عند استعمال المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أياً منها. بالإمكان تقليل الأعراض الجانبية بواسطة استعمال المقدار الدوائي الناتج الأكثر إنخفاضاً للمدة الزمنية اللازمة الأقصر.

بعض الأعراض الجانبية يمكن أن تكون جدية

يجب التوقف عن العلاج والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال ظهور:

- ألم مفاجئ وحد في الصدر (علامات لإحتشاء عضلة القلب أو لنوبة قلبية).
- ضيق في التنفس، صعوبة التنفس في حالة الإستلقاء، إنتفاخ الرجلين أو راحتي القدمين (علامات لفصور القلب).
- ضعف مفاجئ أو تمل في الوجه، اليد أو في الرجل، خاصة في جانب واحد من الجسم، فقدان مفاجئ أو جزئي للرؤية، صعوبة مفاجئة في التكلم أو فهم الكلام، صداع مفاجئ من نوع شقيقة الذي يحدث لأول مرة، مع أو بدون إضطراب في الرؤية. هذه العلامات يمكن أن تكون علامة مبكرة لحدوث سكتة.
- ألم في البطن، إضطراب في الهضم، حرقان، غازات، غثيان أو تقيؤ.
- أية علامة لنزف في المعدة أو في الأمعاء، مثلاً، خلال إفراغ الأمعاء، دم في القيء أو براز أسود.
- ردود فعل تحسسية التي قد تشمل طفح جلدي، حكة، كدمات، مناطق حمراء مؤلمة، وتقرح أو حوصلات.
- صفرير أو ضيق في التنفس (تشنج للقصبات الهوائية).
- إنتفاخ في الوجه، الشفتين، اليدين أو الأصابع.
- إصفرار الجلد أو بياض العينين.
- ألم متواصل في الحنجرة أو سخونة مرتفعة.
- تغير غير متوقع في كمية البول و/أو مظهره.
- تقلص طفيف وحساسية البطن، الذي يبدأ بعد وقت قصير من بدء العلاج بنفثايل ديكلوفيناك، وبعد ذلك نزف شرجي أو إسهال دموي، عادة خلال 24 ساعة من بدء ألم البطن.
- ألم في الصدر، الذي يمكن أن يكون علامة لرد فعل تحسسي جدي يسمى متلازمة كوينيس (Kounis syndrome).
- أعراض التهاب السحايا الدماغية مثل: صداع شديد، تصلب الرقبة، تصلب العضلات، غثيان وتقيؤات حادة ومستمرة وآلام في العمود الفقري (نادر).
- إذا لاحظت بأنه تظهر لديك كدمات بسهولة أكبر من المعتاد أو لديك آلام في الحنجرة أو تلوذات متكررة، توجه لطبيبك.
- أحياناً قد تسبب فئاتل أيبترن حكة أو حرقة في فتحة الشرج أو تؤدي إلى تقادم اليواسير.

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها:

- أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على ما بين 1 إلى 10 من كل 100 متعالج):
 - ألم في البطن، حرقان، غثيان، تقيؤ، إسهال، إضطراب في الهضم، غازات، صداع، دوام، قيرتيفو
 - طفح جلدي أو بقع جلدية
 - نسب مرتفعة لإنزيمات الكبد في الدم
 - تهيج في مكان إدخال الفتيلة
- أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على ما بين 1 إلى 10 من كل 1,000 متعالج):
 - ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، ألم في الصدر، مشاكل في القلب، بما في ذلك نوبة قلبية أو ضيق في التنفس، صعوبة التنفس خلال وضعية الإستلقاء، أو إنتفاخ الرجلين أو راحتي القدمين (علامات لفصور القلب). خاصة إذا استعملت مقدراً دوائياً مرتفعاً (150 ملغ في اليوم) لفترة طويلة.

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على مستعمل واحد من بين 1,000

إلى بين مستعمل واحد من بين 10,000 متعالج):

- تقرحات معدية أو أنزفة (مناك بلاغات نادرة جداً عن حالات سببت الوفاة، خاصة لدى المسنين)
- التهاب المعدة (Gastritis) (التهاب، تهيج أو إنتفاخ مخاطية المعدة)
- تقيؤ دم
- إسهال يتراقف بدم أو نزف من فتحة الشرج
- براز أسود
- نعاس، إرهاق
- طفح جلدي وحكة
- إحتباس سوائل (الأعراض تشمل إنتفاخ الكاحلين)
- إضطراب في الأداء الوظيفي الكبدي، بما في ذلك التهاب الكبد ويران
- ربو (الأعراض يمكن أن تشمل صغير، ضيق في التنفس، سعال وضغط على إمداد الصدر)

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على أقل من 1 من كل 10,000

متعالج):

تأثيرات على الجهاز العصبي:

التهاب السحايا الدماغية (meningitis)، وخز أو خدر في الأصابع، إرتجاج، إضطراب في الرؤية مثل تشوش أو إزدواج في الرؤية، تغيرات في المزاج، فقدان السمع أو تضرر السمع، طنين (رتين في الأذنين)، قلة النوم، كوابيس، تغيرات في المزاج، إكتئاب، قلق، عصبية، إضطرابات نفسية، توهان وفقدان الذاكرة، إختلاجات، صداع مع نفور من الأضواء الساطعة، سخونة وتصلب الرقبة.

تأثيرات على المعدة والجهاز الهضمي:

إمساك، إتهاب اللسان، تقرحات في الفم، إتهاب الجزء الداخلي من الفم أو الشفتين، إضطراب في القولون (بما في ذلك إتهاب القولون، أو تقادم إتهاب القولون التقرحي أو مرض كرون)، إتهاب البنكرياس.

تأثيرات على الصدر أو الدم:

فرط ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)، إنخفاض ضغط الدم (الأعراض يمكن أن تشمل إغماء أو دوام)، إتهاب الأوعية الدموية (vasculitis)، إتهاب الرئتين، إضطراب في الدم (بما في ذلك فقر الدم).

تأثيرات على الكبد أو الكلى:

إضطراب في الكلى أو إضطرابات خطيرة في الكبد، بما في ذلك فشل كبدي، ظهور دم أو بروتين في البول.

تأثيرات على الجلد أو الشعر:

إنتفاخ الوجه، طفح جلدي خطير بما في ذلك متلازمة ستيغنس - جونسون، متلازمة لايل (Lyll's syndrome) وحالات طفح جلدي أخرى، التي قد تتفاقم عند التعرض لضوء الشمس. تساقط الشعر.

تأثيرات على الجهاز التناسلي:

عجز جنسي.

أعراض جانبية أخرى بلغ عنها بشيوع غير معروف تشمل:

إضطراب في الحنجرة، إرتباك، هذيان، قلة راحة (شعور عام بالإزعاج)، إتهاب أعصاب العين، إضطراب في الإحساس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Expiry date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركَّب الفعّال أيضاً على:

Witepsol H15, Witepsol E85.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

فئاتل بلون أبيض - كريم.

علبة تحتوي على 10 أو 100 فتيلة.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ص،

شارع دفور هنتفيك 124، تل أبيب 6944020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

015.72.24237

تم إعداد النشرة في نيسان 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتكوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.