

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسمح هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

بروتيزولام تيفع 0.25 ملغ أقراص

التركيبية:

يتخوي كل قرص على:

بروتيزولام 0.25 ملغ

(Brotizolam 0.25 mg)

الحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة باهتمام حتى نتهائتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك لا تعطله للأخرين بأي حال من الأحوال. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

مقدمة

ينتمي هذا الدواء إلى فصيلة البنزوديازيبينات، التي تتصف بصفات خاصة تستوجب كثيراً من الحذر عند استعمالها.

هناك أهمية كبيرة للمتابعة الطبية عن كتب عند استعمال هذا الدواء. عند استعمالك لهذا الدواء احرص على مراجعة الطبيب بعد أسبوعين، لأن العلاج مخصص لفترات زمنية قصيرة فحسب.

قد يؤدي الاستعمال المطول للدواء إلى تقليل تأثير الدواء. قد يسبب الاستعمال المطول عرضاً شديداً وهو الاعتماد، الذي يصعب على المريض إيقاف استعمال الدواء. ولذلك يجب إيقاف استعمال الدواء بشكل تدريجي، بحسب تعليمات الطبيب.

قد يكون إيقاف العلاج بشكل غير مراقب مصحوباً بأعراض الانسحاب مثل: التوتر، العصبية، الارتباك، الارتجاج، الارتقاع، آلام البطن، التقيؤات، الغثيان، العرق، التشنجات، والتصلبات والام العضلات. أحياناً، قد يؤدي الاستعمال المطول لهذا الدواء إلى حدوث تغيرات في أنماط السلوك وإلى نشوء الأفكار المزعجة. خاصة لدى المسنين؛ يوصى بتوخي الحذر عند المشي لأن الدواء يقلل اليقظة ويحل أحياناً بتناسق حركات الجسم، ولذلك هناك تحوُّف من التعثر أو الوقوع.

استعمال هذا الدواء مع أدوية مع فصيلة الأفيونيات، أو مع أدوية أخرى كإبنة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو مع الكحول قد يسبب إحساساً عميقاً بالميل إلى النوم، صعوبات في التنفس (كبثاً تنفسياً)، غيبوبة وموتاً.

1. لأي عرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج مشاكل النوم.

الفصيلة العلاجية

ينتمي إلى فصيلة البنزوديازيبينات.

الدواء لا يعالج المسبب لاضطرابات النوم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة، للبنزوديازيبينات أخرى أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها المستحضر (للاطلاع على قائمة المركبات غير الفعالة، انظر البند 6).

• كنت حاملاً أو مرضعاً.
• كنت تعاني من قصور تنفسي خطير، من متلازمة ارتقاع التنفس أثناء النوم (sleep apnea)، من قصور الكبد الخطير، من الوهن العضلي الوبيل و هو مرض يتسمّل بضعف العضلات.

• كنت تعاني الآن أو قد عانيت في الماضي من اعتماد على الأدوية، المخدرات غير القانونية أو الكحول.
• كنت تعاني من التسمم من الكحول، الحبوب، المنومة، مسكنات الآلام الأفيونية أو الأدوية النفسية (مثل الأدوية المضادة للأدخال، مضادات الاكتئاب، الليثيوم).
• لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والمراهقين الذين سنهم من 18.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج ببروتيزولام تيفع أخبر الطبيب إذا:

• كنت تعاقف (تسيء استخدام) الكحول، المخدرات غير القانونية والأدوية الأان، أو قد عاقرتها في الماضي.
• كنت حاملاً تتلقّى العلاج ببروتيزولام تيفع.
• كنت تعاني الآن أو قد عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي أو الكبد. في حالات كهذه يُحتمل أن يوصي الطبيب بجرعة دوائية منخفضة.
• كنت تعاني الآن أو قد عانيت في الماضي من اكتئاب أو من أفكار انتحارية.
• وجدت لديك حساسية لعداء ما أو لدواء ما.

تحذيرات إضافية

قد يسبب الاستعمال المطول اعتماداً بدنياً ونفسياً!
يزداد الخطر لنشوء اعتماد على الدواء مع ارتفاع الجرعة الدوائية ومدة العلاج. لذلك سيرشدك الطبيب إلى استعمال الدواء لفترة قصيرة قدر الإمكان بل وقد يُجري لقاءات متابعة دورية. يمكن تمييز الاعتماد النفسي عندما تصل إلى وضع لا تريد فيه أن تتوقف عن استعمال الدواء. إذا كان هناك اعتماد بدني على الدواء، فإن الإيقاف الفجائي سيكون مصحوباً بأعراض الانسحاب (انظر البند 3 – "إذا توقفت عن استعمال الدواء"). إضافة إلى ذلك، يكون خطر نشوء الاعتماد أعلى لدى متلقّي العلاج الذين يعاقرون الأدوية أو الكحول الآن أو قد عاقروها في الماضي (انظر البند 3 – "إذا توقفت عن استعمال الدواء").

قد ينشأ لدى نساء نسيان خلال فترة العلاج بالدواء. يحدث هذا العرض عادة بعد تناول الدواء بضع ساعات. يرجى مراجعة الطبيب إذا نشأ لديك هذا العرض.

إذا كنت تعاني من دهان (مرض نفسي خطير يؤثر على السلوك والسيطرة على النفس)، فسي بروتيزولام تيفع غير مناسب لك.

إذا كنت تعاني من اكتئاب خطير أو من قلق مع أحداث اكتئاب خطير، فإن العلاج ببروتيزولام تيفع قد يزيد من خطر نشوء أفكار عن الأضرار بالنفس أو أفكار انتحارية. يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء. سيقيم الطبيب

بالمتابعة عن كتب خلال فترة العلاج ببروتيزولام تيفع. في كل مرة تراودك هذه الأفكار، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى المستشفى.

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة أو لفترة مطولة دون استشارة الطبيب.

• الاستعمال اليومي طوال عدة أسابيع قد يسبب انخفاضاً في فعالية الدواء.

• يوجد لبروتيزولام تيفع تأثير مرخ للعضلات، مما قد يزيد من خطر الوقوع. يجب الاستعمال بحذر لدى المسنين.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصةً، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية (من الجدير بالذكر أن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية. إذا

لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية، فاستشر رجاء الطبيب أو الصيدلي):

• أدوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: أدوية للتهنئة، للنوم، أدوية مضادة للاكتئاب أو للقلق، أدوية مضادة للأدخال، أدوية لعلاج الصداع، مضادات هستامين معينة، مواد التخدير، مسكنات الآلام الناركوتية) – استعمال هذه الأدوية خلال فترة العلاج ببروتيزولام تيفع قد يسبب كتباً متزايداً للجهاز العصبي المركزي.

• الأفيونيات (مسكنات الآلام القوية). بدائل المخدرات وأدوية معينة (للسعال) – الاستعمال بالتزامن مع بروتيزولام تيفع يزيد من خطر حدوث ميل إلى النوم، صعوبات في التنفس (كبت تنفسي)، غيبوبة بل والموت. لذلك يجب النظر في إعطاء الأفيونيات مع بروتيزولام تيفع فقط عند عدم وجود خيارات علاجية أخرى. إذا ارتشدك الطبيب إلى استعمال بروتيزولام تيفع مع الأفيونيات، فقد يقيد الجرعة الدوائية ومدة العلاج. أخير الطبيب إذا كنت تستعمل أدوية تحتوي على الأفيونيات والزّم بتوصيات الطبيب. إذا لاحظت وجود أحد الأعراض، فراجع الطبيب فوراً.

• مسكنات الآلام القوية مع فصيلة الأفيونيات – الاستعمال بالتزامن مع بروتيزولام تيفع قد يعزز الإحساس بالشّمق (النشوة) ويسرع الاعتماد.

• أدوية لإرخاء العضلات – بالدمج مع بروتيزولام تيفع يُحتمل لزيادة في التأثير المرخي للعضلات.
• أدوية لعلاج السكري وضغط الدم المرتفع، أدوية لعلاج مشاكل القلب (مثل ديجوكسين)، الهرمونات – يجب توخي الحذر عند استعمال هذه الأدوية بالدمج مع بروتيزولام تيفع بسبب احتمال حدوث تأثير متبادل.

• قد تسبب الأدوية التالية لزيادة في تأثير بروتيزولام تيفع: أدوية مضادة للفطريات من فصيلة الأزولات (مثل إيتراكونازول، كيتوكونازول)، مضاد حيوي من فصيلة الكاربوليدات (مثل كلاريثروميسين، إريثروميسين)؛ منجّلات البرونش (مثل ايندينافير، فيلنافير، ريتونايفر)، سيميثيدين، أستيمزول، كيناثات الجهاز المناعي (مثل سيكلوسبورين، سيروموس، تاكلوليموس)، حاصرات قنوات الكالسيوم، أدوية ضد الملاريا مثل منفلوكوين وهالوفانترين، ميدازولام، بيموزيد، سيدلينايفيل، أدوية لخفض الكوليسترول من فصيلة الستاتينات (مثل أتورفاستاتين، لوفاستاتين، سيمفاستاتين)؛ والستيرويدات (مثل الستيون إستراديول)، تاموكسيفين، ثيرفينداين.

• قد تسبب الأدوية التالية انخفاضاً في تأثير بروتيزولام تيفع: كاربامازيبين، إيفاغريف، كاربامازيبين St. John's wort (العرن)، نيفيرابين، فينوبريتال، فينوتوين، بريميدون، ريفامبين، ريفاميسبين.

استعمال الدواء والطعام

• يجب تناول الدواء على معدة فارغة.

• لا يجوز شرب عصير الجريبفروت خلال فترة العلاج.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء. استعمال الكحول في فترة العلاج ببروتيزولام تيفع قد يسبب - من بين أمور أخرى - التهتهة/التشوش، الميل إلى النوم والإحلال بالتركيز.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تستعملي الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

قد ينشأ اعتماد بدني لدى الأطفال الذين تتجهجهم أمهات تتناول البنزوديازيبينات لفترة مطولة أثناء الحمل. أظهر هولاء الأطفال أعراض الانسحاب في فترة ما بعد الولادة. كذلك، قد إعطاء جرعات دوائية عالية في مراحل الحمل المتقدمة وقيل الولادة، يُحتمل حدوث كبت تنفسي لدى الموليد. هناك احتمال ضئيل للإضرار بتطور الجنين عند استعمال البنزوديازيبينات في مراحل الحمل المبكرة.

إذا كنت حاملاً، أو تحططين حملاً، أو لديك شك أنك حامل، فيجب مراجعة الطبيب.

لا تتوفر معلومات سريرية عن تأثيرات الدواء على الخصوبة.

الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين

هذا الدواء غير مخصص لأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عاماً (لم تتم دراسة الفعالية والسلامة لدى هذه الفئة السكانية).

الاستعمال لدى المسنين، المرضى الموهنين، المرضى الذين يعانون من مشاكل في وظيفة الكبد أو المرضى المصابين بقصور تنفسي
قد تكون هذه الفئة أكثر حساسية لتأثيرات الدواء ولذلك يجب استعماله بحذر وبجرعة دوائية منخفضة. من بين تأثيرات الدواء، خاصة لدى المسنين، يُشتمل الارتفاع في خطر الوقوع نتيجة لإرخاء العضلات (انظر "مقدمة").
السياقة واستعمال الماكنت

قد يؤثر هذا الدواء على قابلية رد الفعل، أيضاً عند استعماله وفقاً لتعليمات الطبيب، وبذلك يحل بالقدرة على السياقة، وتشغيل الماكنت. استعمال هذا الدواء قد يحل باليقظة، وبالقدرة على التركيز وبوظيفة العضلات (خاصة عندما تكون مدة النوم غير كافية أو بالدمج مع أدوية كإبنة للجهاز العصبي المركزي أو بالدمج مع الكحول). إذا أحسست بأعراض كهذه التي فصلت، فلا يجوز السياقة أو تشغيل الماكنت. على أي حال يجب توخي الحذر عند سياقة السيارة، وعند تشغيل الماكنت الخطرة وعند القيام بأي نشاط يتطلب اليقظة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يجوز استعمال بروتيزولام تيفع على اللاكتوز. إذا أخيرك طبيبك أن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فتحتّم مع طبيبك قبل استعمال الدواء.

يتخوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب الاستعمال دوماً وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا. الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيدجدهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتيّعة عادةً هي:

نصف قرص إلى قرص واحد (بحسب قرار الطبيب)، قبل النوم.

يمنع بتاتا تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا تتوفر معلومات بخصوص هرس أو مضغ الأقراص. يجب بلع الدواء مع الماء. يمكن شطر القرص حسب خط الشطر المعلم.

الدواء غير مخصص للإعطاء تحت اللسان.

يجب الحرص على النوم لمدة 7 ساعات على الأقل بعد تناول الدواء، لكي يكون الأداء الوظيفي سليماً بعد الاستيقاظ (انظر أيضاً البند "السياقة واستعمال الماكنت").

إذا تناولت خطا جرعة دوائية أعلى
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد وبلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

قد تشتمل أعراض فرط الجرعة على نعاس، ارتباك، تعب. في حالات خطيرة قد تظهر اختلالات في التناسق الحركي، انخفاض في التوتر العضلي، نقص ضغط الدم، كبت تنفسي، غيبوبة (نادر) وموت (نادر جداً).

إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الوقت المنتظم، فيجب تناول الجرعة القادمة كالمعتاد. ليست هناك حاجة إلى "التعويض" عن جرعة منسية ولا يجوز بتاتا تناول جرعتين معاً. إذا تناولت خطأ جرعة مضاعفة، فيجب مراجعة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء

حتى لو طرأ تحسن على وضعك، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بشكل فجائي دون استشارة الطبيب. هذه التعليمات مهمة خاصة لدواء مثل بروتيزولام تيفع (انظر "مقدمة").

• في بعض الأحيان بعد إيقاف استعمال الدواء قد تنجم في البداية عودة مشاكل النوم أو تفاقمها، وأيضاً في حالات نادرة تملّل، تغيرات في المزاج، قلق وتوتر. يكون خطر حدوث ذلك أعلى عند الإيقاف الفجائي للعلاج أو عند انخفاض الفجائي للجرعة الدوائية.

• كذلك يُحتمل حدوث أعراض انسحاب بعد الإيقاف الفجائي للدواء (خاصة إذا تطور اعتماد على الدواء) مثل: صداع، آلام في العضلات، قلق شديد، توتر، مشاكل في النوم، تملّل، ارتباك، عصبية. في الحالات الخطيرة يُحتمل نشوء خطأي للواقع، تغيرات في الشخصية، انعدام الإحساس (خدر) ورخ في اليدين والرجلين، حساسية مفرطة للضوء، للضحج والمس؛ هوسات، نوبات سرعية. قد تحدث هذه الأعراض أيضاً بعد إيقاف استعمال الدواء بضععة أيام. يرجى استشارة الطبيب إذا نشأت لديك أعراض الانسحاب هذه.

• بموجب ذلك، سيقيم الطبيب بخفض الجرعة الدوائية بالتدرج في نهاية العلاج. ستتم ملامعة الانخفاض التدريجي لمتلقي العلاج بشكل شخصي لأنه يتعلّق بعدة عوامل (مثلاً مثلما كنت بحاجة للمس؛ هوسات، نوبات سرعية. قد تحدث هذه الأعراض أيضاً بعد إيقاف استعمال الدواء بضععة أيام. يرجى استشارة الطبيب إذا نشأت لديك أعراض الانسحاب هذه.

• بموجب ذلك، سيقيم الطبيب بخفض الجرعة الدوائية بالتدرج في نهاية العلاج. ستتم ملامعة الانخفاض التدريجي لمتلقي العلاج بشكل شخصي لأنه يتعلّق بعدة عوامل (مثلاً مثلما كنت بحاجة للمس؛ هوسات، نوبات سرعية. قد تحدث هذه الأعراض أيضاً بعد إيقاف استعمال الدواء بضععة أيام. يرجى استشارة الطبيب إذا نشأت لديك أعراض الانسحاب هذه.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بروتيزولام تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. إذا ظهر عرض جانبي أو إذا كانت الأعراض الجانبية غير عابرة أو كانت مزعجة أو أخذت بالتفاقم، فيجب استشارة الطبيب. لا تتلق عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

• ردود فعل تفاعلية مثل: تملّل، هياج، عصبية، غضب، عوارض، تزايد الأرق، كوابيس، هوسات، حالات دهان، تغيرات في أنماط السلوك بما في ذلك التصرف غير اللائق، الارتباك وفرط الحركة (الهيدان) (أعراض جانبية غير شائعة).

• قد تحدث ردود الفعل هذه أثناء العلاج بالبنزوديازيبينات وخاصة لدى المسنين.

• أعراض جانبية إضافية:

• أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

• صداع، إحساس بالدوخة، اضطرابات في الجهاز الهضمي.

• أعراض جانبية غير شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1,000):

• كوابيس، اكتئاب، تغيرات في المزاج، قلق، اعتماد على الدواء، اضطرابات عاطفية، تغيرات سلوكية، هياج، تغيرات في الرغبة الجنسية، دوار، تهتهة (تشوش، تعب)، انعدام التناسق الحركي، وخلل في تناسق حركات الجسم (رتج)، اضطرابات في الذاكرة، خرف، اختلالات عقلية وحركية-نفسية، اضطراب في الروية (مثل الروية المزوجة)، اضطرابات في الكبد (بما في ذلك اليرقان والتغيرات في القيم في فحوص وظائف الكبد)، جفاف في الفم، ردود فعل جلدية، ضعف العضلات، أعراض انسحاب وعودة مشاكل النوم وقلقها بعد إيقاف استعمال الدواء. نغاس (خلال النهار)، عصبية، ارتفاع الخطر للحواث والوقوع.

• أعراض جانبية نادرة (تتظهر عند 10-1 مستعملين من بين 10,000):

• ارتباك، تملّل، انخفاض في اليقظة وفي التأهب.

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فطليك استشارة الطبيب.

• قد تظهر الأعراض الجانبية التالية، خاصة في بداية العلاج: نغاس في يوم الغد، عطاطفي، انخفاض في اليقظة وفي التأهب، الارتباك، تعب، دوار، صداع، ضعف العضلات، انعدام التناسق الحركي وخلل في تناسق حركات الجسم (رتج)، اضطرابات في الروية (رؤية مزدوجة). تقل هذه الأعراض عادة خلال فترة العلاج.

• نظراً لوجود التأثير المرخي للعضلات، يجب توخي الحذر، خاصة لدى المسنين (خطر الوقوع).

• تم التبليغ عن حالات عرفت فيها البنزوديازيبينات (أسوء استخدامها).

• أعراض الانسحاب – قد يتطور أثناء العلاج اعتماد بدني ونفسي. إيقاف العلاج بشكل فجائي قد يسبب أعراضاً معينة (انظر "إذا توقفت عن استعمال الدواء" في البند 3).

• يُحتمل أن يُكتشف خلال فترة العلاج اكتئاب كان قائماً قبل العلاج ببروتيزولام تيفع.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة بالتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امن **تستعمل!**
أدوية الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وكذلك متنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) المدوّنة على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• **يجب التخزين في مكان جاف، فيما دون 25°C.**

6. معلومات إضافية

يتخوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, sodium starch glycolate, povidone, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مستدير لونه أبيض - كريمي (شميتن)، يوجد على أحد جانبي القرص خط الشطر.

تحتوي العبوة على 10 أو 20 قرصاً. قد لا تسوّق فعلياً جميع أجام العبوات.

اسم المصنّع وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ص، شارع دفورا هانفيقيّا 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير هذه النشرة في تموز/يوليو 2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 119.95.30040

من أجل التبسيط والتسهيل للقراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المفرد. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

BROTIZOLAM TAB PL MW0723

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040

119.95.30040