

## עלון לצרכו לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

### **אסאקוול 1600**

טבליות שחרור מושהה

**חומר פעיל:**

כל טבלייה מכילה 1600 מ"ג מסאלאלזין (mesalazine 1600 mg/tablet)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את **העלון עד סוףו** בטרם **תשתחמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעכיר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

אסאקוול מיועדת:

- לטיפול בדלקת כיבית חריפה של המעי הגס (קוליטיס) בדרגה קלה עד בינונית.
- לשמירה על הפוגה מהמחלה (רימייסיה).

**קבוצה רפואיית:** נגד דלקת מעיים

אסאקוול היא תרופה אנטि-דלקתית המשמשת לטיפול בקוליטיס כיבית. קוליטיס כיבית היא מחלת שבה דופן המעי הגס או המעבר האחורי (פי הטבחת) נעשים דלקתיים (אדומיים ונפוחים). זה עשוי להוביל למثان צואה בתכיפות ולצואה דמית, המלויים לעיתים קרובות בהתכווצויות בבטן.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) למסאלאלזין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אתה רגיש (אלרגי) לסליצילטים (לדוגמה, חומצה אצטילסליצילית).
- אתה סובל מבעיות חמורות בכבד.
- אתה סובל מבעיות חמורות בכליות.

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני התחלת הטיפול באסאקוול, ספר לרופא אם אתה סובל ממלחמות כלשהן, במיוחד אם:**

- אתה סובל מבעיות כלשהן בראיות, כמו אסתמה.
  - אתה סובל מתפקיד לקי של הכליות, הכבד או הריאות, במיוחד אם אתה קשיש.
  - סבלת בעבר מאלגיה לסולפואסאלאלזין.
- הייתה לך תגובה אלרגית של הלב כמו דלקת שריר הלב או דלקת כיס הלב. אם היו לך בעבר תגובות אלרגיות בלב שנחקרו כי נגרמו מסאלאלזין, אסור להשתמש באסאקוול. ניתן להשתמש באסאקוול תחת השגחה, אם הייתה לך תגובה אלרגית קודמת של הלב שלא נגרמה מסאלאלזין.
- אם אי פעם פיתחת פריחה עורית חמורה או קילוף העור, שלפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר שימוש במסאלאלזין.

תגובהות עוריות חמורות, כולל תגובהה תרופתית עם אודינופיליה וטסמיינים מערכתיים (DRESS), תסמנת סטיבנו-ג'ונסון (SJS) ונקרוליזה רעילה של האפידרמיס (TEN), דווחו בהקשר של טיפול במסאלАЗין. הפסק את השימוש באסאקסול ונונה לעזרה רפואיית מיד אם אתה מב Hin באחד התסמינים הקשורים לתגובהות עוריות חמורות אלו, המתוירות בפרק 4.

אם אתה סובל מכיב בקיבה, עליך להשתמש באסאקסול תחת השגחה.

abenims בבעיות עלולות להתפתח עם השימוש במסאלАЗין. התסמינים יכולים לכלול כאב בצד הבטן ודם בשתן. הקפד לשנות כמות מספקת של נזלים במהלך הטיפול במסאלАЗין.

מסאלАЗין עשוי ליצור שני צבע השתן לאדום-חום לאחר מגע עם מל宾ן גתרן היפוכלוריט (אקוונומיקה)umi האסלה. זה נובע מתגובה כימית בין מסאלАЗין לакוונומיקה ואינו מסיק.

#### **ילדים ומתבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים או למתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. אין מידע על עילויות ובתיות התרופה בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

#### **בדיקות ועקב**

לפני ובמהלך נטילת אסאקסול יתכן שהרופא ירצה לבדוק שחכבד, הכליות, הדם והריאות פועלם באופן תקין.

#### **תגובהות בין-תרופתיות**

אם אתה לוקה, או אם לך חותם לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקה:

- תרופות המונעות היוציארות קריישי דם (נוגדי קריישה, כמו אורפרין). השפעתן של תרופות אלה עלולה להיות מגברת או מופחתת, והשפעה שעלולה להיות לכך עלייך אינה ברורה.
- תרופות המשפיעות על מערכת החיסון (לדוגמה, אזטיופרין, 6-מרקפטופורין או תיוגואנין). כאשר משתמשים בהן יחד עם אסאקסול, תרופות אלה עלולות להוביל לזרימות מסכני חיים (ראה פרק 4).
- תרופות נגדות דלקת ללא סטרואידים (לדוגמה, תרופות המכילות חומצה אצטילסליצילית, איבופרופן או דיקלופנק).

#### **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול אסאקסול עם מזון או ללא מזון.

#### **הירון והנקה**

אין מידע מספק על השימוש בתרופה בהירון. אם אתה בהירון או מיניקה, חושבת שעת בהירון או מתכוונת להרות, עליך להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

מאחר שתרופה מופרשת בחלב אם בכמויות קטנות, יש לנוקוט זהירות רואה אם משתמשים בתרופה בזמן ההנקה. אם התינוק מפתח שלשול, יש להפסיק את ההנקה.

#### **נהיגה ושימוש במכוניות**

לאסאקסול השפעה זניחה על היכולת נהוג ולהפעיל מכונות. עם זאת, אם אתה מושפע בדרך כלל לשמי עלייך להימנע מנהיגה או הפעלת מכונות.

#### **אסאקסול מכילה גתרן**

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

### 3. كيف تستخدم الترופה

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

#### המינון המקובל בדרך כלל הוא:

##### **מבוגרים**

שלב פעיל של המחלת: כאשר המחלת חמירה, ניתן להגדיל את המינון עד 4,800 מ"ג (שלוש טబליות) הנלקחות בכל יום פעם ביום או לטבלייה אחת 2 עד 3 פעמים ביום.  
טיפול שוטף: מינון של 1,600 מ"ג הנלקח בכל יום.

##### **אין לעבר על המנה המומלצת.**

יש בלועו את הטబליות בשלמותן, רצוי עם כוס מים. אין ללווע, למעורר או לשבור את הטబליות לפני הבליעה. דבר זה חשוב עבור טబליות שחרור מושהה. אם הטబליות אינן נבלעות בשלמותן, הן עלולות שלא לפעול כפי שנועדו.

#### אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מלבד מינון התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

#### אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול מנת תרופה בזמן הדרוש, קח את המנה הבאה כרגיל. אין ליטול מנת כפולה כדי לפצות על מנת שנשכחה.

#### אם אתה מפסיק להשתמש באסאקוול

השתמש באסאקוול במשך הזמן שנרשם לך על ידי הרופא. דבר עם הרופא לפני שתנסה או תפסיק את הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

### 4. تופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באסאקוול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. "תיכון שלא תסבול מכך אחד מהן".

#### הפסק את השימוש באסאקוול ופנה לעזרה רפואי מיד אם אתה מביח **באחד התסמינים הבאים:**

- כתמים אדומים לא מורמים, דמו"י מטרה או עגולים על הגו, לעיתים תכופות עם שלפוחיות במרקץ, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים, פריחה מופשטת, חום ובלוטות לימפה מוגדלות. "תיכנו חום ותסמים דמו"י שפעת טרם הופעת פריחה עורית חמורה זו.
- שטפי דם בלתי מוסברים (לא פצעה), דימום מתחת לעור, נקודות סגולות או כתמים סגולים מתחת לעור, אנמיה (תחושת עייפות, חולשה וחיוורון, במיוחד בשפטים ובציפוריים), חום (טמפרטורה גבוהה), התכווצויות בבטן, כאב בטן חריף, כאב גרון, כאב ראש חמוץ, או דימום חריג (כגון דימומים מהאף).

אסאקוול יכולה להשפיע במקרים נדירים מאוד על תאי הדם הלבנים, כך שבקרים אלה עלולה לחול הרעה במערכת החיסון. אם תסבול מזיהום המלווה בתסמים כמו חום המלווה בהחמרה של מצב הרקל' או חום עם תסמים מוקומיים של זיהום כמו כאב גרון/לוע/פה או בעיות בשתן, עליך להגיע לרופא מיד. ניתן אז לבצע בדיקות דם כדי לבדוק חוסר של תאי דם לבנים (אגרנולוציטוזיס). חשוב שתדוח לרופא על כל התרופות שאתה נוטל.

## תופעות לוואי גסיפות

### תופעות לוואי שכיחות: תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מtower 10

- פריחה
- קשיי עיכול

### תופעות לוואי שאין שכיחות: תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מtower 100

- ספירה גבוהה של תאי דם לבנים הנקראט גרנולוציטים אודינופיליים
- תחושת עקצוץ, דקירות וחוסר תחושה
- עור מגרד, סרפדת
- כאב בחזה

### תופעות לוואי נדירות: תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מtower 1,000

- כאב ראש
- סחרחות
- דלקת של הלב עם סימנים כמו כאבים בחזה או דפוקות לב
- שלשול, כאב בטן, גזים, תחושת אי-נעימות ואי-נוחות בבטן עם דחף להקייא והקאה
- רגשות מגברת של העור לשמש ולאור אולטרא-סגול (רגשות לאור)

### תופעות לוואי נדירות מאוד: תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מtower 10,000

- ירידה חמורה בתאי הדם שיכולה לגרום לחוילשה, לחבות או לעלייה בסיכון לחיומים, ספירות נמוכות של תאי דם; ירידה בטסיות דם שmbiahela לעלייה בסיכון לדימום
- תגובות אלרגיות כמו פריחה
- חום שמתרחש בזמן נטילת התרופה ונעלם כשמפסיקים את התרופה (חום הנגרם מתרופה)
- מחלת של מערכת החיסון שיכולה לערב איברים ומפרקים
- קוליטיס כיבית המערבת את המעי הגס כלו
- עצבים לא תקינים או פגעים הגורמים לחוסר תחושה או עקצוץ
- מחלת ריאות (הצטלקות של רקמת הריאה, תגובה אלרגית) הגורמת לקשיי נשימה או צפצופים והצטברות נזלים בריאות, דלקת ריאות
- דלקת בלבל (קשרורה לכאב בבטן העליונה והגב ולבחילה)
- תוצאות לא תקין בבדיקות תפוקדי כבד, הפטיטיס (דלקת כבד הגורמת לתסמינים דמווי-שפעת ולצ hepatitis)
- נשירת שיער
- כאבים בשירים ובמפרקים
- בעיות בכליות (כמו דלקת והצטלקות של הכליה), אי ספיקת כליות, שעשויה להיות הפיכה אם מפסיקים את הטיפול מוקדם
- ירידה בייצור זרע שהוא הפיכה

### תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- הפרעה במערכת החיסון (تسمונת דמוית-זבתת) שיכולה לגרום לדלקת של רקם הלב או של הקרומים סביב הריאות והלב, פריחה ו/או כאב ממפרקים
- דלקת ביריות המקיים את הריאות וחלל החזה (דלקת הצדר)
- אי סבילות למסאלАЗין /או החמרת המחלת
- אבנים בכליות וכאב כליות הקשור בCCR (ראה גם פרק 2)
- ירידה בממשק
- תוצאות בבדיקות מעבדה אשר חרוגות מהטוווח התקני

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עיר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים / או תנוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזקה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.  
**תנאי אחסון:** אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.

## 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

microcrystalline cellulose	-
methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:2)	-
sodium starch glycolate (type A)	-
hypromellose	-
triethyl citrate	-
maize starch	-
glycerol monostearate (40-55)	-
macrogol	-
ferric oxide red (E 172)	-
polysorbate 80	-
colloidal anhydrous silica	-
magnesium stearate E 470B	-
ferric oxide yellow (E 172)	-
potassium dihydrogen phosphate	-

**כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזקה:**

אסאקול 1,600 מ"ג טבליות שחרור מושהה הן מאורכות בצבע אדמדם נוטה לחום. הטבליות זמיןות באזיות המכילות מגשיות. המגשיות ארוזות בתוך קרטון המכיל 30 טבליות, 60 טבליות או 90 טבליות.yticן שלא כל גודלי האזיות ישווקו.

**בעל הרישום והיבואן וכתובתו:**

טרדייס גת בע"מ, רח' שחם 32, פתח תקווה 4951727

**שם היצרן וכתובתו:**

Tillotts Pharma GmbH (subsidiary of Tillotts Pharma AG, Switzerland), Warmbacher Strasse 80, 79618 Rheinfelden, Germany.

**נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99-36782-09-174

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.