

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

سمبليكس 20 ملغ سبمليكس 40 ملغ أقراص مطليّة

مادة فعّالة

سمبليكس 20 ملغ: يحتوي كل قرص مطلي على أسيمينيّب هيدروكلوريد، الذي يعادل بقيمته ل أسيمينيّب 20 ملغ

سمبليكس 40 ملغ: يحتوي كل قرص مطلي على أسيمينيّب هيدروكلوريد، الذي يعادل بقيمته ل أسيمينيّب 40 ملغ

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر - أنظر الفصل 2 الـبند "معلومات مهمّة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة يَتمتّع حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدليّ. هذا الدواء وصف لك. لا تعطيه لآخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتهك وحالتهم الصحيّة.

1. لم أعد هذا الدواء؟

لعلاج البالغين الذين يعانون من:

- سرطان الدم النخاعي المزمن الإيجابي لكروموسوم فيلادلفيا (Ph+ CML) في مرحلة مُزمنة (CP)، والذين تمّ علاجهم في السابق بدوائين من نوع مثبّطات التيزوزين كيناز أو أكثر.
- سرطان الدم النخاعي المزمن الإيجابي لكروموسوم فيلادلفيا (Ph+ CML) في مرحلة مُزمنة (CP) مع الطفرة T3151.

المجموعة العلاجية: أدوية مضادة لتورم، مثبّطات التيزوزين كيناز

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

وُجدت لديك حساسية (البرجي) للمادة الفعّالة أسيمينيّب أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء التي تتشكّل خطراً على الحياة (أنظر الفصل 6).

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ سمبليكس، أخبر الطبيب بخصوص أي حالة طبيّة لديك، بما في ذلك إذا:

- كان تعداد خلايا الدم لديك منخفضاً (تنثبيط نخاع العظم)
- عانيت في الماضي من التهاب في البنكرياس (Pancreatitis) و/أو ارتفاع في مستويات إنزيمات في الدم التي تدعى *عمايلز* و*ليباز*
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم)
- كنت تعاني من ردود فعل تحسّسية (فرط حساسيّة)
- عانيت في الماضي من مشاكل في القلب أو من تحنّرات دموية في الشرايين والأوردة (أنواع من الأوعية الدموية)

- كنت حاملاً أو تخططين أن تحملي
- كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع

أنظر الفصل 4 "أعراض جانبية" والفصل 2 الـبند "الحمل، الإرضاع والحساسية".

الأطفال والمراهقون

سمبليكس ليس معداً لاستعمال الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً.

لا توجد معلومات بالنسبة لسلامة وفعّالية استعمال هذا المستحضر لدى الأطفال والمراهقين.

الفحوصات والمتابعة

خلال العلاج بـ سمبليكس ستخضع لفحوصات دم وفحوصات لضغط الدم بشكل دوري.

تفاعلاتأرودو فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيّة ومكمّلات غذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

تأثير أدوية أخرى على سمبليكس

مثبّطات قويّة لـ- CYP3A4

إعطاء مدمج من سمبليكس مع مثبّط قوي لـ- CYP3A4 (مثل كلاريثروميسين، تليثروميسين، ترولانDOMيسين، إيتراكونازول، كيتوكونازول، فوريكونازول، ريتونايفر، إيندينافير، نيليفينايفر أو ساكرونيفير) الذي يرفع من مستويات أسيمينيّب في الدم، الأمر الذي قد يزيد خطر ظهور أعراض جانبية. في حال علاج مدمج ما بين سمبليكس 200 ملغ مرتين في اليوم سوياً مع مثبّط قوي لـ- CYP3A4، ستحتاج إلى متابعه عن كثب من قبل الطبيب للأعراض الجانبية.

محلول للشرب من إيتراكونازول الذي يحتوي على هيدروكسي بروبيل-β-سيكلوديسترين

إعطاء مدمج من سمبليكس مع محلول للشرب من إيتراكونازول الذي يحتوي على هيدروكسي بروبيل-β-سيكلوديسترين، يقلّل من مستويات أسيمينيّب في الدم، مما قد يقلّل بالتالي من فعّالية سمبليكس. امتنع عن استعمال مدمج لـ سمبليكس بكل الجرعات الموصى بها، سوياً مع محلول للشرب من إيتراكونازول الذي يحتوي على هيدروكسي بروبيل-β-سيكلوديسترين.

تأثير سمبليكس على أدوية أخرى

رُكائز معيّنة لـ- CYP3A4

إعطاء مدمج من سمبليكس مع رُكائز CYP3A4 (مثل فينتانيل، الفينثانيل، ثنائي هيدروار غوتامين أو إرغوتامين) يرفع من مستويات رُكائز CYP3A4 معيّنة في الدم، مما قد يزيد من خطر ظهور أعراض جانبية لهذه الرُكائز.

في حالة علاج مدمج من سمبليكس بجرعة يومية من 80 ملغ مع رُكائز CYP3A4 معيّنة، في الحالات التي قد تؤدي التغييرات الصغيرة في التركيز إلى أعراض جانبية خطيرة، ستحتاج لأن تكون تحت مراقبة عن كثب من قبل طبيب للأعراض الجانبية. امتنع عن استعمال مدمج من سمبليكس بإعطاء 200 ملغ مرتين في اليوم مع رُكائز CYP3A4 معيّنة، في الحالات التي تؤدي تغييرات صغيرة في التركيز إلى أعراض جانبية خطيرة.

رُكائز CYP2C9

إعطاء مدمج من سمبليكس مع رُكائز CYP2C9 (مثل فينتونين أو وارفارين) يرفع من مستويات رُكائز CYP2C9 معيّنة في الدم، مما قد يزيد من خطر ظهور أعراض جانبية. امتنع عن علاج مدمج من سمبليكس بإعطاء يومي 80 ملغ مع رُكائز CYP2C9 معيّنة، في الحالات التي قد تؤدي تغييرات صغيرة في التركيز إلى أعراض جانبية خطيرة. إذا لم يكن ممكناً تجنب العلاج المدمج، سيرشدك الطبيب إلى خفض جرعة رُكائز CYP2C9.

امتنع عن استعمال مدمج من سمبليكس بإعطاء 200 ملغ مرتين في اليوم مع رُكائز CYP2C9 حساسة ورُكائز CYP2C9 معيّنة، في الحالات التي قد تؤدي التغييرات الصغيرة في التركيز إلى أعراض جانبية خطيرة. إذا لم يكن ممكناً تجنب العلاج المدمج، سيرشدك الطبيب إلى فحص إمكانية علاج بديل مع رُكيزة ليست من نوع CYP2C9.

رُكائز معيّنة لـ- P-gp

إعطاء مدمج من سمبليكس مع رُكائز P-gp (مثل ديجوكسين) يرفع مستويات رُكائز P-gp في الدم، مما قد يزيد من خطر ظهور أعراض جانبية لهذه الرُكائز.

في حالة علاج مدمج مع سمبليكس بإعطاء يومي 80 ملغ سوياً مع رُكائز P-gp، سيوظب منك الطبيب مراقبة الأعراض الجانبية عن كثب.

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول سمبليكس بدون طعام. **عليك الامتناع عن تناول الطعام** لمدة ساعتين على الأقل قبل وساعة بعد تناول سمبليكس.

الحمل، الإرضاع والحساسية

يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملاً أو تخططين الحمل. قد يسبب سمبليكس ضرراً للجنين. سوفوم الطبيب بإجراء فحص للحمل قبل بدء العلاج بـ سمبليكس.

- يجب على النساء القدرات على الحمل استعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال العلاج، ولمدة أسبوع واحد بعد الجرعة الأخيرة من سمبليكس. تحدثي مع الطبيب عن وسائل منع الحمل التي قد تلائمك.
- إذا حملت أو إذا كنت تعتقدين أنك قد تكوني حاملاً خلال العلاج بـ سمبليكس، إبغني الطبيب فوراً.

الإرضاع

يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. ليس معروفاً إذا كان سمبليكس ينتقل عبر حليب الأم. يُمنع الإرضاع خلال العلاج ولمدة أسبوع واحد بعد الجرعة الأخيرة من سمبليكس.

الحساسية

قد يسبب سمبليكس مشاكلًا في الحساسية لدى النساء. وهذا الأمر قد يضعف القدرة على الحمل. تحدثي مع الطبيب إذا كان هذا الأمر يسبب لك القلق.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يوجد لـ أسيمينيّب أيّ تأثير أو هناك تأثير ضئيل على القدرة على السياقة وتشغيل ماكينات.

إذا كنت تشعر بدوار، تعب أو أعراض جانبية أخرى التي قد تؤثر على القدرة على السياقة بحذر أو استعمال الماكينات بعد تناول الدواء، يجب عليك الامتناع عن هذه الفعاليات حتى اختفاء تأثير الدواء.

معلومات مهمّة عن قسم من مركّبات الدواء

سمبليكس يحتوي على لاكتوز

إذا أخبرك الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، يجب عليك الاتصال بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

سمبليكس يحتوي على صوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليول صوديوم (23 ملغ) في القرص، أي أنه يعتبر عملياً "خالٍ من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

الجرعة المتّبعة عادة للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي المزمن الإيجابي لكروموسوم فيلادلفيا في مرحلة مُزمنة هي:

80 ملغ مرّة في اليوم في ساعة ثابتة أو **40 ملغ مرتين** في اليوم بفاقر زمني يبلغ تقريباً 12 ساعة.

الجرعة المتّبعة عادة للمرضى الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي المزمن الإيجابي لكروموسوم فيلادلفيا في مرحلة مُزمنة مع الطفرة **T3151** هي:

200 ملغ مرتين في اليوم بفاقر زمني يبلغ تقريباً 12 ساعة.

يجب تناول سمبليكس بدون طعام. **عليك الامتناع عن تناول الطعام** لمدة ساعتين على الأقل قبل وساعة بعد تناول سمبليكس.

يُمنع تغيير الجرعة أو الجدول الزمني أو التوقف عن تناول سمبليكس، إلا إذا حصلت على تعليمات للقيام بذلك من قبل الطبيب.

قد يغير الطبيب الجرعة أو قد يوقف العلاج بصورة مؤقتة أو لألأبد إذا ظهرت لديك أعراض جانبية معينة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع أقراص سمبليكس كاملة. **يُمنع** كسر، سحق أو مضغ أقراص سمبليكس.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمّيّة من الدواء عن طريق الخطأ فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبّلة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

- إذا كنت تتناول سمبليكس مرّة **واحدة في اليوم** وفوتت جرعة بأكثر من 12 ساعة، يجب تجاوز الجرعة التي فوتتها وتتاول الجرعة التالية في موعدھا الاعتيادي.
- إذا كنت تتناول سمبليكس مرتين **في اليوم** وفوتت جرعة بأكثر من 6 ساعات، يجب تجاوز الجرعة التي فوتتها وتتاول الجرعة التالية في موعدھا الاعتيادي.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرّة تتناول فيها دواء. **ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.**

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال سمبليكس أعراضًا جانبيةً لدى قسم من المستخدمين. لا نلتدش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

قد يسبب سمبليكس أعراضًا جانبيةً خطيرة، التي تشمل:

- **تعداد خلايا دم منخفضة.** قد يسبّب سمبليكس تعداد منخفض لصفائح الدم (قلة الصفائح)، وتعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات) وتعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم). سيقيم الطبيب بإجراء فحوصات دم لفحص تعداد خلايا الدم، كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج، وبعد ذلك مرّة في الشهر أو بحسب الحاجة خلال العلاج بـ سمبليكس. إبغ الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من نزيف غير متوقّع أو من كدمات (نزف دم) التي تتكوّن بسهولة، إذا كنت تلاحظ وجود دم في البول أو في البراز، وإذا كنت تعاني من سخونة أو من علامات أيا كانت لحالات عدوى.

- **مشاكل في البنكرياس.** قد يسبّب سمبليكس ارتفاعاً في مستويات الإنزيمات *عمايلز* و*ليباز* في الدم، الذي قد يكون علامة لوجود التهاب في البنكرياس. قد يقوم الطبيب بإجراء فحوصات دم مرّة في الشهر أو بحسب الحاجة خلال العلاج بـ سمبليكس من أجل تشخيص مشاكل في البنكرياس. إبغ الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من ألم أو من شعور بعدم الراحة فحامين في منطقة المعدة، ومن غثيان أو تقيؤ.

- **ضغط دم مرتفع.** قد يقوم الطبيب بفحص ضغط الدم لديك وعلاج ضغط دم مرتفع خلال العلاج بـ سمبليكس بحسب الحاجة. إبغ الطبيب إذا كان يتطور لديك ضغط دم متزايد أو أعراض لضغط دم مرتفع، بما في ذلك، ارتفاع حالات صداع، دوام، في الصدر أو ضيق تنفّص.

رد فعل تحسّسي. توفّق عن تناول سمبليكس وتوجه للحصول على مساعدة طبيّة فوراً إذا تطوّرت لديك أي علامات أو أعراض لرد فعل تحسّسي، بما في ذلك:

- صعوبة في التنفّص أو البلع
- انتفاخ الوجه، الشفتين أو اللسان
- طفح جلدي أو تورّد الجلد
- شعور بالدوار أو إغماء
- سخونة
- تسارع نبض القلب

● **مشاكل قلب وأوعية دموية (قلبي وعائي).** قد يسبب سمبليكس مشاكلًا في القلب وفي الأوعية الدموية بما في ذلك نوبة قلبية، سكتة دماغية، فترات دموية أو انسداد الشرايين، قصور في القلب ونظم قلب غير سليم، والتي قد تكون مشاكل خطيرة والتي يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى الوفاة. هذه المشاكل في القلب وفي الأوعية الدموية يمكن أن تظهر لدى أشخاص لديهم عوامل خطيرة أو مع سابقة لهذه المشاكل، و/أو لدى أشخاص تم علاجهم في الماضي بأدوية أخرى مثبطة لـ تيروزين كيناز. قد يقوم الطبيب بإجراء متابعة من أجل تشخيص مشاكل في القلب والأوعية الدموية ومعالجتها حسب الحاجة خلال العلاج بـ سمبليكس. ابلغ الطبيب أو توجه للحصول على مساعدة طبية فورًا إذا تطوّر لديك:

- ضيق تنفس
- ألم أو ضغط في الصدر
- الشعور بأن نظم القلب متسارع جدًا أو إذا كنت تشعر بأن خفقان القلب غير سليم
- انتفاخ الكاحلين أو القدمين
- دوام
- زيادة في الوزن
- انعدام الإحساس أو ضعف في جهة واحدة من الجسم
- تراجع في الرؤية أو فقدان الرؤية
- صعوبة في الكلام
- ألم في اليدين، في القدمين، في الظهر، في الرقبة أو في الفك
- صداع
- ألم شديد في منطقة المعدة

● سخونة

- **عدوى في مسالك البول**
- صداع
- ألم بطن
- تقيؤ
- عدوى في الرئتين (التهاب رئوي)
- آلام في العضلات، في العظام أو في المفاصل
- نزيف
- إمساك
- ألم في الصدر، سعال، فواق، تسارع في التنفس، تراكم سائل في الفراغ ما بين الرئتين والصدر، وفي حال كان وخيما قد يؤدي إلى ضيق التنفس (انصباب جنبي)

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لـ سمبليكس تشمل (تظهر لدى واحد أو أكثر من بين عشرة مستعملين):

- حالات عدوى في الأنف، في الحلق أو في الجيوب الأنفية (مجري التنفس العلوية)
- ألم في العضلات، في العظام أو في المفاصل
- صداع
- تعب
- غثيان
- طفح جلدي
- إسهال
- تقيؤ
- نزيف
- ألم في المفاصل (ألم مفصلي)
- انتفاخ عام (وذمة)
- حكة
- سعال

- ضغط دم مرتفع
- ألم بطن

أمراض الدم

● انخفاض في تعداد الصفائح، خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء

كيمياء حيوية

- ارتفاع في مستويات الدهون (الدهون ثلاثية، كوليسترول) في الدم
- ارتفاع في مستويات كيناز الكرياتين في الدم
- ارتفاع في مستويات إنزيمات الكبد في الدم
- ارتفاع في مستويات إنزيمات البنكرياس (عميلاز وليپاز) في الدم
- ارتفاع في مستويات حمض البوليك في الدم
- انخفاض في مستويات الفوسفات
- انخفاض في مستويات الكالسيوم المصححة
- ارتفاع في مستويات الكرياتينين في الدم
- ارتفاع في مستويات الفوسفاتز القلوي
- ارتفاع في مستويات البيلوروبين في الدم
- ارتفاع أو انخفاض في مستويات البوتاسيوم في الدم

أعراض جانبية إضافية تشمل:

- قصور القلب
- سخونة
- عدوى في مسالك البول
- عدوى في الرئتين (التهاب رئوي)
- إمساك

نظم قلب غير سليم، وهذا يشمل تغييرات في النشاط الكهربائي في القلب (اضطرابات في نظم القلب (Arrhythmia))، وهذا يشمل إصابة مقطع QT في التخطيط الكهربائي للقلب)

- ألم في الصدر، سعال، فواق، تسارع في التنفس، تراكم سائل في الفراغ ما بين الرئتين والصدر، وفي حال كان وخيما قد يؤدي إلى ضيق التنفس (انصباب جنبي)
- ضيق تنفس، صعوبة في التنفس
- دوام

● مستويات مرتفعة من الدهون/ الشحم (dyslipidemia)

- انخفاض في الشهية
- طفح جلدي مصحوب بحكة (شرى)
- عدوى في الرئتين والشعب الهوائية (مجري التنفس السفلية)
- انفلونزا
- شعور بنض سريع وقوي (خفقان)
- عدم وضوح الرؤية
- جفاف في العين
- قصور الغدة الدرقية مع ارتفاع محتمل في الوزن، احتباس السوائل، إمساك، حساسية للبرد (قصور الغدة الدرقية)
- سخونة فوق 38°C المرتبطة مع مستوى منخفض من خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات الحموية)
- التهاب البنكرياس (Pancreatitis)
- ضرر عصبي (اعتلال عصبي محيطي)
- حساسية مفرطة

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة والشريط (البليستر).
- تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يُمنع التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25°C. يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء، أيضًا على:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose (E460), hydroxypropylcellulose, low-substituted (E463), croscarmellose sodium (E468), polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), magnesium stearate, talc (E553b), colloidal silicon dioxide, lecithin (E322), xanthan gum (E415), iron oxide red (E172)

أقراص مطلية 20 ملغ تحتوي كذلك على:

iron oxide yellow (E172)

أقراص مطلية 40 ملغ تحتوي كذلك على:

iron oxide black (E172)

انظر الفصل 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

● **سمبليكس 20 ملغ:** قرص مطلي، مستدير، بدون خط شطر، محذب من الجانبين مع أطراف مائلة، ذو قطر بنحو 6,2 ملم، بلون أصفر فاتح. يوجد على كل قرص ختم للرقم "20" من جهة واحدة والعلامة التجارية لـ نوفارتيس من الجهة الثانية.

● **سمبليكس 40 ملغ:** قرص مطلي، مستدير، بدون خط شطر، محذب من الجانبين مع أطراف مائلة، ذو قطر بنحو 8,2 ملم، بلون بنفسجي وأبيض. يوجد على كل قرص ختم للرقم "40" من جهة واحدة والعلامة التجارية لـ نوفارتيس من الجهة الثانية.

تحتوي كل عبوة على 20 أو 60 قرصًا مطليًا.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل والمستورد وعنوانه: نوفارتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحرير هذه النشرة في آب 2023 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

سمبليكس 20 ملغ: 172-84-37483-99

سمبليكس 40 ملغ: 172-85-37484-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا الدواء معدّ لكلا الجنسين.