

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986** התרופה הנושקת על פי מרשם רופא בלבד

## המנג'יול™ תמיסה לבליעה

**חומר פעיל**: החומר הפעיל הוא פרופראנולול (Propranolol). כל 1 מ"ל של תמיסה מכיל 3.75 מ"ג פרופראנולול (אקויוולנטי ל- 4.28 מ"ג פרופראנולול הדרורכולריד).

חומרים בלתי פעילים ולארגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נשמעה עבור ילדך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעלון זה, לתרופה המנג'יול קיימת חוברת מידע להורי המטופל. חוברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב, שעליו לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בהמנג'יול ולפעול על פיו. יש לעיין בחוברת המידע להורי המטופל ובלעול לצרכן בטרם תחילת השימוש בתרופה. יש לשמור את חוברת המידע לעיון נוסף במידת הצורך.

**1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בהמניגומה משגשגת בגיל הניקות אשר דורשת טיפול מערכתי:

- המניגומה מסכנת חיים או ספקוד.
- המניגומה כיבית עם כאב ו/או חוסר תגובה לאמצעי טיפול פשוטים בפצע.

- המניגומה עם סיכון להצטלקות או עיוות קבועים.

יש להתחיל את הטיפול בהמנג'יול בפעוטות בגיל 5 שבועות עד 5 חודשים.

המניגומה הינה צבר של כלי דם עודפים אשר יוצרים גוש בעור או מתחתיו. המניגומה יכולה להיות שטחית או עמוקה. לעיתים היא נקראת "סימן תות" כי פני השטח שלה מזכירים במראה צורת תות.

**קבוצה תרופוטיית:**

החומר הפעיל פרופראנולול משתייך לקבוצת תרופות הידועה כחוסמי בטא.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- ילדך נולד פג ולא הגיע לגיל המתוקן של 5 שבועות (גיל המתוקן מתייחס לגיל שמינוק פג אמור להיות בו אם היה נולד בתאריך הלידה המשוער שלו).
- ילדך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פרופראנולול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף" בעלון זה). תגובה אלרגית עלולה לכלול פריחה בעור, גירוד או קוצר נשימה.
- ילדך יש אסתמה או היסטוריה של קשיי נשימה.
- ילדך יש קצב לב נמוך עבור גילו. פנה לרופא אם אינך בטוח.
- ילדך יש בעיה בלב (כגון הפרעות בקצב הלב או אי ספיקת לב).
- ילדך יש לחץ דם נמוך מאוד.
- ילדך יש בעיה במחזור הדם הגורמת לכך שהאצבעות והבהונות חסרות תחושה וחיוורת.
- ילדך נטייה לרמת סוכר נמוכה בדם.
- ילדך יש לחץ דם גבוה כתוצאה מגידול בבלוטת יורתת הכליה (האדרנל). גידול זה נקרא פאוורוכרומוציטומה (phaeochromocytoma).
- אין לתת** תרופה זו לילדך אם הנך מניקה ואת נוטלת תרופות שאסורות לשימוש יחד עם המנג'יול (ראי סעיף "הנקה" וסעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני מתן המנג'יול לילדך, ספר לרופא אם:**

- לילדך יש בעיות בכבד או בכליות. תרופה זו אינה מומלצת במקרה של בעיות בכבד או בכליות.

ילדך הייתה בעבר תגובה אלרגית, לא משנה מה מקורה (למשל מתרופות או מרכיב תזונתי וכו'). תגובה אלרגית עלולה לכלול פריחה, גרד או קוצר נשימה.

ילדך סובל מספחת (פסוריאזיס) [מחלת עור הגורמת להיווצרות פלאקים (רדדים) אדומים ויבשים של עור מעובה], שכן תרופה זו עלולה להחמיר את ההסמינים של המחלה הזו.

ילדך סובל מסוכרת: במקרה זה יש לנטר את רמת הסוכר בדם שלו לעיתים קרובות יותר.

ילדך סובל מסתמונת PHACE (מצב המשלב המניגומה עם הפרעות בכלי הדם כולל כלי דם במוח), שכן תרופה זו עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי.

**סימנים שחשוב לשים לב אליהם לאחר מתן המנג'יול לילדך:**

- **סיכון לרמת סוכר נמוכה בדם** (היפוגליקמיה) תרופה זו עלולה למסך סימני אזהרה של היפוגליקמיה (הידועה גם כרמת סוכר נמוכה בדם). התרופה עלולה גם להחרף היפוגליקמיה בילדים, במיוחד בינן צום (לדוגמא: אכילה מועטה, זיהום קיים, הקאות) או כאשר הדרישות לגלוקוז עליות (קור, לחץ, חיומים) או במקרה של מנת יתר. סימני האזהרה עלולים להיות:
  - מתנוני (מינורי): חיוורון, עייפות, העה, רעד, דפיקות לב (פלפליטציות), חרדה, רעב, קושי בהתעוררות.
  - חמורים (מייורי): יותר שינה מהרגיל, קושי בתגובה, אכילה מועטה, ירידה במטפרסות, הגוף, פרכוסים, הפסקות נשימה קצרות, איבוד הכרה.

הסיכון להיפוגליקמיה נשאר משמעותי לאורך כל תקופת הטיפול בתרופה.

**בכדי להימנע מסיכון של רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה), עליך ליתן לילדך המנג'יול במהלך הארוחה או לפני אחריה ולהימנע מליתת את המנה האחרונה בסמוך לשינת הלילה (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?"). יש להאכיל את ילדך במידה מספקת ובאופן סדיר במשך הטיפול. אם ילדך אינו אוכל מפסיק או שהוא מקיא, מומלץ לדלג על המנה. אין לתת המנג'יול לילדך עד אשר הוא יש לאכול באופן תקין.**

**אם ילדך מראה סימנים כלשהם של רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) בזמן נטילת המנג'יול, הפסק את הטיפול בתרופה וצור קשר מיידי עם הברכה, יש לתת לו משקה נוזלי המכיל סוכר.**

- **סיכון לעווית הסימפונות (ברונכוספזם)** יש להפסיק את הטיפול וליצור קשר מיידי עם רופא אם לאחר מתן המנג'יול לילדך אתה מבחין באחד מהסמנים הבאים, שעלולים להעיד על עווית הסימפונות (קשיי נשימה בשל הצירות זמנית של דרכי האוויר בריאות): שיעול, נשימה מואצת או קושי בנשימה או צפצופים עם או ללא עור בגוון כחלחל.

**הפסק את הטיפול בתרופה וצור קשר מיידי עם רופא אם ילדך מראה חסמינים של הצטננות המלווים בקשיי נשימה ו/או צפצופים במהלך הטיפול בהמנג'יול.**

- **סיכון ללחץ דם נמוך (ברידיקדיה)**

המנג'יול עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם ובקצב הלב (ברידיקדיה), לכן על ילדך להיות במעקב רפואי צמוד וניטור קצב הלב במשך שעותיים לאחר מתן המנה הנטולה או לאחר העלאת מנת התרופה. לאחר מכן, על הרופא לבדוק את הילד במהלך הטיפול באופן קבוע.

**הפסק את הטיפול בתרופה וצור קשר מיידי עם רופא אם ילדך מראה סימני עייפות, תחשת קור, חיוורון, עור בגוון כחלחל או עלילפון בתקופת השימוש בהמנג'יול.**

- **סיכון לרמת אשלגן גבוהה בדם (היפרקלמיה)** המנג'יול עלולה להגביר את רמת האשלגן בדם (היפרקלמיה). במקרה של המניגומה כיבית גדולה יש לנטר את רמת האשלגן בדם של ילדך.

**אם ילדך מותכן לעבור הרדמה כללית**

עליך לומר לרופא שילדך מקבל המנג'יול. זאת מכיוון שילדך עלול לסבול מלחץ דם נמוך אם תינתנה לו תרופות מרדמיות מסוימות בזמן נטילת תרופה זו (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות"). ייתכן שיהיה צורך להפסיק לטיפול המנג'יול לפחות 48 שעות לפני ההרדמה.

- בידיקות ומעקב** אם יש לילדך סוכרת, יש לנטר את רמת הסוכר בדם שלו לעיתים קרובות יותר (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- המנג'יול עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם ובקצב הלב. לכן, על ילדך להיות במעקב רפואי צמוד עם ניטור קצב הלב שעתיים לאחר מתן המנה הראשונה או לאחר העלאת מינון התרופה. לאחר מכן, על הרופא לבדוק את הילד במהלך הטיפול באופן קבוע (ראה "**סימנים שחשוב לשים לב אליהם לאחר מתן המנג'יול לילדך**").
- המנג'יול עלולה להגביר את רמת האשלגן בדם. במקרה של המניגומה כיבית גדולה יש לנטר את רמת האשלגן בדם של ילדך ("ראה **סימנים שחשוב לשים לב אליהם לאחר מתן המנג'יול לילדך**").

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

- אם ילדך לוקח או לקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** זאת משום שהמנג'יול עלולה לשנות את דרך הפעולה של תרופות אחרות וייתכן שלתרופות אחרות תהיה השפעה על האופן בו המנג'יול פועלת.
- אם הנך מניקה את ילדך, חשוב לעדכן את הרופא או הרוקח או הצוות הרפואי אם את נוטלת תרופה כלשהי, שכן התרופה עלולה לעבור דרך חלב האם ולהשפיע על הטיפול של ילדך. הרופא ייעץ לך האם עלייך להפסיק הניקה או לא.**

ספרי/י לרופא או לרוקח אם ילדך לוקח או אם את מניקה ולוקחת:

- תרופות לטיפול בסוכרת.
- תרופות לטיפול בבעיות בלב או בכלי הדם, כגון הפרעות בקצב הלב, כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה), לחץ דם גבוה, אי ספיקת לב.
- תרופות לטיפול בחרדה ובדיכאון, כמו גם תרופות לבעיות נפשיות נשמות יותר ואפילפסיה.
- תרופות לטיפול בשחפת.
- תרופות לטיפול בכאב ובדלקת.
- תרופות להורדת רמת השומנים בדם.
- תרופות להרדמה.

אם יש לך שאלות נוספות היוועץ ברופא שלך או ברוקח.

**שימוש בתרופה ומזון**

יש לתת את התרופה מייד לאחר האכלת הילד או במהלך האכלתו.

**הנהגה**

**אם הנך מניקה את ילדך**

- ספרי לרופא טרם נתינת תרופה זו לילדך.
- אל תניי תרופה זו לילדך אם את נוטלת תרופות שאסורות לשימוש עם המנג'יול (ראי סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה (למעשה "נטולת נתרן").

התרופה מכילה 2.08 מ"ג של פרופילן גליקול/ג' אוס. אם תינוקך בגיל הקטן מ-4 שבועות, היוועץ ברופא או ברוקח לפני מתן תרופה זו. בייחוד אם התינוק נוטל תרופות נוספות המכילות פרופילן גליקול או אלכוהול.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

הטיפול בילדך הוא בהתאם להמלצת רופא בעל מומחיות באבחון ובטיפול בהמניגומה בגיל הניקות. יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **עלולם אל תשנה את המינון שניתן לילדך על דעת עצמך. כל עלייה במנה או התאמת מנה בהתאם למשקל של תינוקך חייבים להיעשות על ידי הרופא המטפל בלבד.**

**מינון:**

המינון יקבע בהתאם למשקל תינוקך, לפי משטר המינון הבא:

שבועות (מנה יומית)	מנה לבליעה	תזמון המנות
שבוע ראשון (1 מ"מ"ג/ג'יום)	0.5 מ"ג/ג'ג	• מנה אחת בבוקר
שבוע שני (2 מ"מ"ג/ג'יום)	1 מ"ג/ג'ג	• מנה נוספת בשעות אחר הצהריים המאוחרות
שבוע שלישי והשבועות שלאחריו (3 מ"מ"ג/ג'יום)	1.5 מ"ג/ג'ג	• במרווח של לפחות 9 שעות בין 2 המנות

אם יש צורך, ניתן לערבב את התרופה עם **כמות קטנה** של חלב המיועד לתינוקות או מיץ תפוחי עץ ו/או מיץ תפוחים המתאים לגילו, ולתת את המזון לילדך במקבוק לתינוקות. אין לערבב את התרופה עם בקבוק מלא של חלב או מיץ פירות. ילידים שמשקלם עד 5 ק"ג ניתן לערבב את המנה עם כפית אחת (בערך 5 מ"ל) של חלב המיועד לתינוקות. לילדים שמשקלם מעל 5 ק"ג ניתן לערבב את המנה עם כף אחת (בערך 15 מ"ל) של חלב המיועד לתינוקות או מיץ תפוחי עץ או מיץ תפוחים המתאים לגיל ילדך.

יש להשתמש בתערובת עד שעתיים מהכנתה.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

- אין לתת המנג'יול לילדך:**
- המנג'יול מיועדת לבליעה בלבד.**
  - יש לתת את התרופה מייד לאחר האכלת הילד או במהלך האכלתו.
  - עליך תמיד למדוד את המנה על ידי שימוש במקווק למתן דרך הפה המסופק יחד עם הבקבוק ואין להחליפו עם אף מוקח אחר. אם איבדת את המרק, צור קשר עם בעל הירושם.
- יש לתת את הממנג'יול ישירות לפה של ילדך בעזרת המזרק למתן דרך הפה שסופק עם הבקבוק.
- האכל את ילדך באופן קבוע בכדי להימנע מצום ממושך.
- אם ילדך לא אוכל במידה מספקת או שהוא מקיא, יש לדלג על המנה.
- אם ילדך ירק את המנה או שאתה לא בטוח אם קיבל את המנה בשלמותה, אין לתת מנה נוספת. יש לחכות עד שגייע מועד מתן המנה הבאה.

מתן הממנג'יול והאכלת הילד צריכים להיעשות על ידי אותו אדם בכדי להימנע מהסיכון של רמת סוכר נמוכה בדם לילדך (היפוגליקמיה).

אם אנשים שונים מעורבים בטיפול בילד, חיוני שתהיה תקשורת טובה בין המעורבים על מנת להבטיח את בטיחות הילד.

**הוראות שימוש:**


- שלב 1 – הוצאת את הפריטים מהקופסא** הקופסא מכילה את הפריטים הבאים להם תזדקק למתן התרופה.
  - בקבוק זכוכית המכיל 120 מ"ל של תמיסה לבליעה של המנג'יול.
  - מזרק מדידה למתן דרך הפה, המסומן בשננות של מיליגרמים, המצורף לתרופה זו.

יש להוציא מהקופסא את הבקבוק ואת המזרק למתן דרך הפה, ויש להוציא את המזרק משקית הפלסטיק.



- שלב 2 – בדוק את המנה**

בדוק מהי מנת המנג'יול במיליגרמים (מ"ג) כפי שרשם אותה הרופא של ילדך. מצא את המספר הזה על המרק למתן דרך הפה.



- שלב 3 – פתח את הבקבוק**

לבקבוק יש מכסה בטיחות העמיד בפני פתיחה של ילדים. יש לפתוח את הבקבוק באופן הבא: יש ללחוץ על מכסה הפלסטיק כלפי מטה תוך כדי סיבובו נגד כיוון השעון (לכיוון שמאל). אין לנער את הבקבוק לפני השימוש.



- שלב 4 – הכנס את המזרק**

הכנס את קצה המזרק למתן דרך הפה לתוך בקבוק העומד אנכית ולחץ את בוכנת המזרק כלפי מטה עד הסוף. אין להסיר את מתאם המזרק (syringe adapter) מצוואר הבקבוק. למדידה ומתן התמיסה יש להשתמש אך ורק במקרק למתן דרך הפה המצורף לתרופה. אין להשתמש בכף או בכל כלי מדידה אחר.



- שלב 5 – הוצאת המנה**

הפוך את הבקבוק כשהמזרק למתן דרך הפה נשאר במקומו. משוך את בוכנת המזרק עד לסימון מספר השימוליגרמים להם אתה זקוק.




- שלב 6 – בדוק הימצאות בועות אוויר**

אם הנך רואה בועות אוויר במזרק, החזק את המזרק באופן אנכי, דחוף את הבוכנה כלפי מעלה עד למצב בועות האוויר הגדולות יצאו החוצה ואז כוון מחדש את המנה אשר נרשמה על ידי הרופא לילדך.



- שלב 7 – הוצאת את המזרק**

הפוך את הבקבוק למצב אנכי והוצאת את כל הבוכנה פנימה במהלך שלב זה.




- שלב 8 – סגור את הבקבוק**

חזרו את פקק הפלסטיק למקומו על הבקבוק על ידי סיבובו בכיוון השעון (לכיוון ימין).



- שלב 9 – תן המנג'יול לילדך**

הכנס את המרק לפיו של תינוקך והצמד אותו כנגד הצד הפנימי של הלחי. כעת אתה יכול להזיף את לאט את הממנג'יול ממזרוק ישירות לתוך הפה של תינוקך. אין להשכיב את התינוק מייד לאחר מתן התרופה.




- שלב 10 – נקה את המזרק**

אין לשלך את המזרק. שטוף את המזרק הריק לאחר כל שימוש לתוך כוס של מים נקיים:

- חק כוס של מים נקיים
- מזוק את הבוכנה
- שפוך את המים לכיור

**4. חזור על פעולת ניקוי זו 3 פעמים**



אל תשתמש בסבון כלשהו או בתכשיר המבוסס על אלכוהול לניקוי. נגב את החלק החיצוני עד יבושו. אל תשים את המזרק במכשיר לחיטוי (סטריליטור) או במדיח כלים. אחסן את הבקבוק והמזרק יחדיו באריזת התרופה במקום בטוח שילדך לא יוכל לראותה או להגיע אליה, עד לשימוש הבא. לאחר סיום הבקבוק זרוק את המזרק.

**אם נתת לילדך בטעות מינון גבוה יותר מהנדרש של התרופה** היוועץ ברופא מייד או פנה לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת לתת את התרופה לילדך**

דלג על המנה שנשכחה ואל תיתן מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. המשך בטיפול בתדירות הקבועה: מנה אחת בבוקר ומנה אחת בשעות אחר הצהריים המאוחרות. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

**אם אתה מפסיק לתת את התרופה לילדך**

ניתן להפסיק את המתן של התרופה בבת אחת בתום הטיפול, לפי החלטת הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

**4. תופעות לוואי**

**כמו בכל תרופה, השימוש בהמנג'יול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תירבה לתקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שילדך לא יסבול מאף אחת מהן.**

לאחר מתן המנג'יול יש לשים לב לסימני אזהרה חשובים הקשורים לתופעות הלוואי האפשריות הבאות: לחץ דם נמוך, קצב לב איטי, רמת סוכר נמוכה בדם ועווית בסימפונות (ברונכוספזם, קשיי נשימה). ראה סעיף 2 בעלון זה.

**תופעות לוואי שכוחות מאד (תופעות שמופיעות יבוצת ממשמשש אחד מעשרה):**

- דלקת בסימפונות (ברונכיטיס)
- הפרעות שינה (נדודי שינה, איכות ירודה של השינה וקשיים בהתעוררות)
- שלשול והקאה

**תופעות לוואי שכוחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):**

- עווית סימפונות - ברונכוספזם (קשיי נשימה)
- דלקת סימפונות (ברונכיוליטיס) - דלקת של הסימפונות (דרכי הנשימה) הקטנות בריאות, כולל קשיי נשימה וצפצופים בחזה, המלווים בשיעול וחום
- ירידה בלחץ הדם
- ירידה בתאבון
- עצבנות (אגיטציה), סיודים, רגזנות
- יעונויות
- גפיים קרות
- עצירות, כאב בטן
- אדם בעור
- תפחת חיתולים

**תופעות לוואי שאינן שכוחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

הפרעות בהולכת הלב או בקצב הלב (פעילות לב איטיות או לא סדירות)

סרפדת (אורטיקריה - תגובה אלרגית בעור), נשירת שיער (אלופסיה)

ירידה ברמות הסוכר בדם

ירידה בכמות תאי הדם הלבנים

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):**

פרוכוסים המקשירים לרמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה)

ברדיקדיה (קצב לב איטי מהרגיל)

לחץ דם נמוך
רמות נמוכות מאוד של תאי דם לבנים נוגדי זיהום

בעיות במחזור הדם שגורמות לחיוורון וחוסר תחושה באצבעות ובבהונות

עלייה ברמת האשלגן בדם

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר ילדך סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפרנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובת הבאה: **Padagis.co.il**

**5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה ותוית הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנ**