

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

פטיר קرم

החומר הפעיל ורכיביו ביחידת מינון:
טריבינfine הידרוקלוריד 1%

Terbinafine Hydrochloride 1%

לרישימת החומרים הבaltı פיעלים והאלרגניים הנוספים, ראה סעיף 6 וסעיף 2 תחת כותרת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קיים עיין את העלון עד סוףו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון לעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא במידה ותסמנני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר שבוע (7 ימים).

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה הינה בעלת פעילות אנטיפטריאטיבית רחבה טווח לטיפול בפטרת העור.
קבוצה רפואיית: אנטיפטריאטיבית.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה(המפורטים בסעיף 6).
- אין להשתמש בתרופה אם את מניקה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפטיר קرم, ספר לרופא אם אתה סובל ממחלת אחרת או מאלגיות.

- פטיר קرم אינו מומלץ לשימוש ילדים מתחת לגיל 12.
- פטיר קرم מיועד לשימוש חיצוני בלבד.
- אין להשתמש בקרם בפה ואין לבלווא אותו.
- יש להימנע מגע עם העיניים, האף, הפה או רקמות ריריות אחרות. אם הקرم בא במגע עם העיניים, יש לשטוף היפט鬓 במים זורמים. יש לפנות לרופא במידה ומורגשת אי נוחות בעיניים.
- במקרה של פטרת נרחבת בכף הרגל או אם הzi'hom הפטרייטי מערב גם את הציפורניים, יש לפנות לרופא.

תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לך חותם לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אין למרוח תכשירים רפואיים נוספים על האזור המטופל.

ילדים ומטופרים:

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 12.

הרין והנקה:

- אין להשתמש בקרם אם את בהריון, אלא אם כן השימוש הכרחי בהוראת הרופא.
- אם את מתכוננת להיכנס להריון, היועצץ ברופא לפני השימוש בפטיר קرم.

הנקה:

- אין להשתמש בקרם אם את מניקה.
- יש להימנע מגע של תינוקות באזור המטופל בתרופה.

נהייה ו שימוש במכונות:

לפיטר קرم אין השפעה על היכולת לנוהג ולהפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- פיטר קرم מכיל צטיל אלכוהול(Cetyl alcohol) וסטאריל אלכוהול (Stearyl alcohol) העולאים לגרום לתגובה בעור, למשל אקזמה(כגון: contact dermatitis).
- פיטר קرم מכיל 1% בנזיל אלכוהול (Benzyl alcohol) העולול לגרום לתגובה אלרגית וגירוי מקומי בעור.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם ניתן בטוח בוגע לנגע ולופן הטיפול בתרופה. בטרם השימוש בפיטר קرم, יש לשטוף את האזור הנגע וליבשו היטב. לשימוש מבוגרים ובילדים מעל גיל 12.

ניתן למרוח פיטר קرم פעמיים ביום (בוקר ו/או ערב). יש למרוח בעדינות שכבה דקה של פיטר קرم על האזור הנגע וסבירו.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- עבור פטרת כף הרגל המופיעה בין אצבעות הרגליים (Tinea Pedis), פטרת המפשעה, פטרת הגוף - למרוח פעמיים ביום במשך שבוע ימים.
- עבור פטרת כף הרגל המופיעה על סוליות כף הרגל ו/או על צידי כף הרגל [] Plantar - type Tinea Pedis Type Moccasin - למרוח פעמיים ביום במשך שבועיים.
- עבור פטרת בעור מסווג קנדידיאזיס (skin candidiasis) - למרוח פעמיים ביום עד פעמיים ביום, במשך שבוע.
- עבור פיטיריאטיס ורסיקולור (פטרת השימוש) - למרוח פעמיים ביום, במשך שבועיים.

במידה והטיפול הינו בקפלן עור, ניתן לכנות את האזור בחבישת גזה, כיסוי האזור מומלץ במיוחד בלבד בלילה. יש להחליף את הגזה בכל מריחה. יש לשטוף את הידיים לאחר כל מריחה על האזור הנגע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

למניעת זיהום חוזר, יש לטפל בפטרת על פי ההוראות בעלון זה. אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע יש לפנות לרופא.

יש לטפל בפטרת במינונים המצויים בעולון. אם אתה מרגיש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלהה מדי, פנה לרופא או לרוקח.

אין לבלווע, התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם השתמשת בטיעות במינון גבוה יותר:

אם השתמשת במנת יתר או אם בטיעות בלבד ליד מן התרופה, פנה מיד לחדר מין של בית החולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת למרוח את הקرم בזמן המועד, אין למרוח מנה כפולה. מרוח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחוושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה ذוק להם.

כיצד תוכל לסייע בהצלחת הטיפול?

על מנת להימנע מפטרת בכף הרגל יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש להחליף בכל יום בגדים שהיו ב מגע עם האזור הנגע.
- יש להימנע מלביישת בגדים צמודים או כאלו שאינם אפשריים אוורור של העור.
- יש ליבש בעדינות את האזור הנגע לאחר רחיצתו.
- יש להחליף מגבות בכל יום.

אם אתה סובל מפטרת בכף הרגל, אל תלך יחף. בנוסף, יש לפזר או לרסס את הנעלים ב מוצרים "יעוד"ם נגד פטרת בכף הרגל. יש לשטוף את הידייםabisודות לאחר שימוש בתרופה ומגע עם העור הנגע על מנת למנוע את התפשטות הדיזוזם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או רוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפטיר קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק משתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת או יותר מההתופעות הבאות, היכלותה להיעיד על תגובה אלרגית:

- קשיי נשימה ובליעת התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון
- גרד חמוץ בעור בלתי-אדמדומיות או שלפוחיות מורמות

תופעות לוואי של המערכת החיסונית:
נדירות מאד (תופעות שמופיעות לפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000): סרפדת

תופעות לוואי של העיניים:
נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000): גירוי

תופעות לוואי עוריות:
שכיחות(תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100): התקלפות, גרד אין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1000): פצעים, גלדים, הפרעות בעור, שינוי בגוון עור, אדמדומיות, תחושת צריבה
נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000): יובש בעור, אקזמה, דלקת עור מגע ישיר (contact dermatitis) נדירות מאד (תופעות שמופיעות לפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000): פריחה או פצעונים בעור

תופעות לוואי כליליות ותופעות לוואי באזורי המטופל:
אין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1000): כאב, כאב או גירוי באזורי המטופל
נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000): החרפה של הפטרת

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעлонן, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי"
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעת לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסון מתחת ל- 25° C. ניתן להשתמש עד 6 חודשים מיום פתיחת השפופרת, אך לא יותר מתאריך התוגה המוטבע על-גביה האריזה.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Isopropyl myristate, cetyl alcohol, sorbitan monostearate, cetyl ester wax , stearyl alcohol, polysorbate 60, benzyl alcohol, sodium hydroxide , HCl, purified water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה: קרם בצבע לבן בשפופרת אלומיניום המכילה 15 גרם או 30 גרם. יתכן ולא כל גודלי האריזות משוקרים.

היצן ובעל הרישום: מעבדות רפואי בע"מ ת.ד. 405, ירושלים, 9100301, ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרכופות הממלכתי במשרד הבריאות: 134-66-31200

נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

I-261006-I