

ديكلوفيت، جل، 1% W/W

التركيز:

يحتوي كل أنبوب على: ديكلافيناك صوديوم 1% W/W (Diclofenac Sodium 1% W/W).
مركيبات غير فعالة ومسربات حساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركيبات الدواء".

إنّ النشرة يمكّنها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. إنّشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات (أعراض) المرض أو إذا لم يحدث تحسن خلال 7 أيام.

1. لأيّ غرض مُخصص هذا الدواء؟

علاج ذاتي لدواعي الاستعمال التالية:

العلاج الموضعي للألم، الالتهاب والانتفاخ بسبب:

- الآلم، الالتهاب والانتفاخ عند إصابة: الأوتار، الأربطة، العضلات والمفاصل، مثلاً نتيجة لالتواءات، حالات الشد، الكدمات و/ أو ألم الظهر (مثل: الإصابات الرياضية).
- الالتهابات الروماتيزمية الموضعية في النسيج الرخو مثل التهاب الأوتار (مثلاً مرفق لاعب التنس)، بورسيتيس (التهاب الجراب).

تنبأ لارشد الطبيب:

الآلم الناتج من الفصال العظمي (التهاب المفاصل التكتسي) في المفاصل المحاطية، مثل الركبة أو الأصابع.

الفصيلة العلاجية: يحتوي ديكلافيناك على المركب الفعال ديكلافيناك، الذي ينتمي لفصيلة الأدوية المسماة مضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs).

2. قيل استعمال الدواء

يمكن استعمال الدواء إذا:

- كنت تعاني من الحساسية (الرجي) للمركب الفعال (ديكلوفيناك الصوديوم) أو لأحد المركيبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت في الثلث الأخير من حملك (انظر البند 2 "الحمل والرضاع").
- حدث لديك في الماضي رد فعل تحسسي على ديكلافيناك أو على أدوية أخرى لعلاج الألم، الحمى أو الالتهاب، مثل: الأسبرين (حمض الأسبيتيل ساليسيليك) أو الإيبوبروفين. قد تشمل أعراض رد الفعل التحسسي على هذه الأدوية: الربو، الأزقز عند التنفس أو ضيق التنفس؛ الطفح الجاهي أو الشرى؛ انتفاخ الوجه أو اللسان؛ سيلان الأنف.
- كنت تستعمل أدوية أخرى تحتوي على ديكلافيناك أو كنت تستعمل أدوية من فصيلة NSAIDs، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين الذين يتم تناولهما عن طريق الفم.
- كنت تبلغ أقل من 12 سنة من العمر.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

يحتوي هذا الدواء على كحول. لا تشعل سيجارة أو تتعرض للنار حتى يجف المستحضر تماماً.

لا يجوز دهن الجل على جلد مصاب بـ:

(1) الطفح أو الإكزيما.

(2) الشفق أو الجروح المفتوحة.

توقف العلاج إذا تطور طفح جاهي بعد دهن الدواء.

تجنب الدهن على مناطق شاسعة من الجلد لفتره زمنية متواصلة، إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

يجب اتخاذ الحيوطة عند التسخن بالأشعة الشمس أو التسخن باستعمال مصايد التسخن لأن جلدك قد يصبح أكثر حساسية لضوء الشمس.

إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من فرحة المعدة أو من فرحة الآثى عشر، فأخير الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال الدواء.

إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من الربو، فأخير الطبيب أو الصيدلي بذلك قبل استعمال الدواء.

الأطفال والنشاشين:

هذا الدواء غير مخصوص لأولاد دون سن 12 سنة.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا تستعمل ديكلافيناك إذا كنت تتناول أفراد ديكلافيناك أو أفراد أخرى من مضادات الألم/الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs) (مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين).

الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، فاستشيري الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال هذا الدواء.

لا يجوز استعمال ديكلافيناك أو من الصيادي أو الصيدلي أو يسبب المشاكل عند الولادة.

يمكن استعمال ديكلافيناك، فقط بإرشاد طبيب خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل مع الحفاظ على أقل جرعة دوائية ممكنة وأقصر مدة علاجية.

هناك عرض جانبى محتمل لهذا الدواء وهو التصرّر الكلوي لدى الجنين وقلة السائل السلوى (الأمنوسى) ابتداء من الأسبوع الـ 20 من الحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من فصيلة NSAIDs، ابتداء من الأسبوع الـ 20 من الحمل واستشارة فرد من الطاقم الطبي عند الحاجة.

يجب استعمال ديكلافيناك بحسب إرشاد الطبيب فقط خلال فترة الإرضاع لأن ديكلافيناك ينتقل بجرعات صغيرة إلى حليب الأم. لكن، لا يجوز دهن ديكلافيناك على صدر الأمهات المرضعات أو على مواضع شاسعة أخرى من الجلد لفتره زمنية متواصلة.

استشيري الطبيب أو الصيدلي الخاص بك بالنسبة لمعلومات إضافية إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

السيادة واستعمال الآلات:

عند الاستعمال بحسب التعليمات، فإنه من غير المتوقع أن يؤثر ديكلافيناك على قدرتك على السيادة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي الدواء بروبيلين جليкол (Propylene Glycol) الذي قد يسبب تهيج الجلد.

يحيى الدواء (E 321)، الذي قد يسبب تفاعلات جلدية محلية (مثلاً، التهاب الجلد التماسي- Contact Dermatitis)، أو تهيج العين والأنسجة المخاطية.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن متقدماً بخصوص الجرعة وكيفية العلاج.

الجرعة الدوائية الاعتيادية هي:

تدرك كمية صغيرة من ديكلافيناك داخل الجلد في موضع الألم و/ أو الانتفاخ 4-3 مرات في اليوم.

تعلق كمية الجل بحجم الموضع المصايب. تكتفي عادة كمية بحجم يتراوح بين الكرز والجوز (4-2 غرام).

قد تشعر ببرودة خفيفة أثناء تدليك الجلد. أغلل يديك بعد استعمال ديكلافيناك، إلا إذا كانتا هما ذاتهما الموضع المصايب.

تتعلق مدة العلاج بالإصابة وبردة الفعل السرييري. لا يجوز استعمال ديكلافيناك لأكثر من 14 يوماً لإصابات الأنسجة الرخوة، إلا بتوصية الطبيب، ولا يجوز استعماله لأكثر من 21 يوماً لللام الناتجة عن الفصال العظمي.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 7 أيام أو إذا طرأ تدهور، فيجب مراجعة الطبيب.

يجب الامتناع عن استعمال مستحضرات إضافية للدهن على الموضع المعالج بديكلوفيناك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

لا يجوز بلعه! هذا الدواء مخصوص للاستعمال الخارجي فقط.

لا يجوز الدهن على الجلد المصايب أو الجروح المفتوحة. احذر من ملامسة الدواء للعينين والأنسجة المخاطية. إذا حدث ذلك، فيجب شطف العينين بالماء وإخبار الطبيب.

يمكن دهن ديكلافيناك تحت ضمادة لكن ليس تحت ضمادة مانعة للهباء.

إذا دهنت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم

إذا دهنت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببعض الدواء خطأ، فتوّجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت دهن هذا الدواء في الوقت المطلوب، فادهنه الدواء فوراً تذكر، ثم واصل العلاج بالدواء كالمعتاد. لا يجوز دهن كمية مضادة كتعويض عن الجرعة المنسية.

لا تتناول الأدوية في الضلام! يجب فحص الملصق على العبوة والتتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال ديكلافيناك أعراض جانبية لدى بعض مستخدمي الدواء. لا تلقى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تعاني من أي منها.

قد تكون بعض الأعراض الجانبية نادرة جداً، خطيرة. يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب أو الصيدلي إذا ظهرت علامات الحساسية التالية:

طفح جاهلي، حكة، احرار أو الم شديد في الجلد.

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

قد يصبح الجلد أكثر حساسية للشمس. العلامات المحتلة هي: حرق شمسى مصاحب بالحكمة، انتفاخ وحويصلات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط: "إبلاغ عن أعراض جانبية بسبب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي

يصلك باستمارة للتبلغي عن أعراض جانبية او بالدخول على الرابط: <http://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- الاضافية للمركب الفعال، يحتوي الدواء على:

 - ٦. معلومات إضافية

بالإضافة للمركب الفعال، ي

ethyl Eucalyptus Oil, Propylparaben,

باف، بوله الماء و ماء هم و محتوى، العلبة.

نـيـكـوـفـيـت عـلـى جـلـ (ـهـامـ) بـالـلـونـ الـأـبـيـضـ حـتـىـ الـاـصـفـارـ،ـ مـعـبـاـ فـيـ أـنـوـيـةـ الـوـمـيـنـيـوـمـ.ـ حـجـامـ الـعـبـوـاتـ الـمـصـادـقـ عـلـىـهـاـ 50ـ غـرامـ،ـ 100ـ غـرامـ.ـ بـنـ الـمـمـكـنـ أـلـاـ تـسـوقـ جـمـيعـ الـعـبـوـاتـ.

شارع هتحانا 6، ص.ب. 114، بنیا

مَّ التحرير في يونيو (حزيران) 1923

يقوم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

111-42-29399-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الم