



## עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תקשיירט) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **ונטולין תמייסה לשאיפה**

חומר פעיל:

**סאלבוטאמול (כסולפאט) 5 מ"ג/מ"ל**

לרשימת החומרים הבלטי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".  
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש במבוגרים, מתבגרים וילדים.  
ונטולין תמייסה לשאיפה מיועדת לשימוש טיפול בעת התקף חריף של עווית סمفונות (ברונוכוספازם) כרונית אשר אינה מгиיבת לטיפול המקבול וכן לטיפול באסתמה חריפה חמורה.

**קבוצה רפואיית:**  
מרחיבי סمفונות מהיר פעולה, אגוניסט סלקטיבי של רצפטורי בטא-2, בעל פעילות קצרת טווח.

ונטולין תמייסה לשאיפה מכילה את החומר הפעיל סאלבוטאמול המשתייך לקבוצה של תרופה הנקראת מרחיבי סمفונות מהיר פעולה.  
• מרחיבי סمفונות עוזרים לדרכי האויר בריאות להישאר פתוחות, דבר המקל על כניסה ויציאת אויר.  
• הם עוזרים להקל על לחץ בית החזה, צפופים ושיעול.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין לשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגיס (אלרגי) לסאלבוטאמול סולפאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**  
**לפני הטיפול בונטולין תמייסה לשאיפה, ספר לרופא אם:**

- האסתמה שלך פעילה (לדוגמא, יש לך התלקחות או תסמיינים תכופים או יכולת גופנית מוגבלת). יתכן שהרופא יתחיל או יעלה מינון לתרופה הנינתנת לשילטה באסתמה כמו קורטיקוסטרואיד בשאיפה.
- יש לך לחץ דם גבוה.
- יש לך סוכרת.
- יש לך פעילות יתר של בלוטת התריס.
- יש לך היסטוריה של בעיות לב כמו דופק לא סדיר, דופק מהיר או תעוקת חזיה.

- אתה משתמש בתמיסה אחרת למכשיר אינהלוציה כמו איפראטרופים ברומיד, יש לוודא כי האדים לא נכנסים לעינך. ניתן למנוע זאת על ידי שימוש בפייה במקום מסכת פנים או שימוש במשקפי מגן.
- אתה נוטל נגזרות קסנטין (כמו תאופילין) או סטרואידים לטיפול באסתמה.
- אתה נוטל משתנים, המשמשים לעיתים לטיפול בחץدم גבוה או מחלת לב.
- נטלת תרופות אחרות המשמשות להקלת על אף גדוש (כמו אפדרין או פסאודואפדרין) או תרופות אחרות המשמשות לטיפול באסתמה.

#### **אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות**

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. יש לידע במียוחד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- תרופות לדופק לא סדייר או מהיר (במיוחד מקבוצת חוסמי בטא כגון פרופרנולול).
  - תרופות אחרות לאסתמה שלך.

#### **הירון והנקה**

אם את בהירון או מניקה, חשוב שיתacen שאתה בהירון או אם את מתכונת להרות, התייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

#### **היגיה ושימוש במכונות**

לא סביר שתרופה זו תשפיע על יכולתך לנוהג או להשתמש בכלים או במכונות.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
**ונטוליןTamishe לשאיפה מכילה 0.1 מ"ג/מ"ל בנזאלקוניום כלורייד (benzalkonium chloride) בכל יחידת מינון.**  
 בנזאלקוניום כלורייד עלול לגרום לצפצופים וקשה נשימה (ברונכוספאזם), ביחוד אם יש לך אסתמה.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעוח בנווגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
**יש להשתמש בתרופה רק בשאיפה** למכשיר אינהלוציה, ואסור להזריק או לבלווע אותה. מכשיר האינהלוציה מייצר אדים עדינים אותם אתה שואף פנימה דרך מסכת פנים או פייה. וזה שאתה יודע כיצד להשתמש בו כיאות. אם אתה נתקל בעורית, היועץ ברופא, באחות או ברוקח. אל תאפשר לתרופה או לאדים המיצרים על ידי מכשיר האינהלוציה להיכנס לעיניך.  
 השתמש במכשיר האינהלוציה בחדר מאוורר היטב מפני שחלק מהאדים ישחררו לאוויר ועלולים להישאף פנימה על ידי אחרים.  
 וזה שאתה יודע איך, מתי ובכמה Tamishe להשתמש.

הרופא המטפל יכול להתחילה ולנטר קלינית את השימוש הביתי במכשירי אינהלוציה ואת התרופות המיעודות לשאיפה באינהלוציה לטיפול אקווטי באסתמה בילדים ובמתבגרים.

השתמש רק במכשיר אינהלוציה שהומליך על ידי הרופא והשכח על יליך בזמן שהם משתמשים במכשיר האינהלוציה.

פנה לקבלת עזרה רפואיית דחופה במידה והתרופה לשימוש באינהלוציה אינה משפיעה, גם אם ישנה הטבה לפrek זמן קצר לאחר השימוש בתרופה שנרשמה לך.

"יתכן כי הרופא רשם לך טיפול לסירוגין (להתקלחויות קצרות אקריאיות) או טיפול רציף בונטולין Tamishe לשאיפה.  
 המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

### **טיפול לסירוגין (Intermittent treatment)**

- **מבוגרים ותבגרים בני 12 שנים ומעלה – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של נטולן תמיסה לשאייה עד 2.5 מ"ג סאלבוטאמול).** חלק מהמטופלים עשויים לצורק עד 2 מ"ל (10 מ"ג סאלבוטאמול).
- **ילדים בני 12 חודשים עד 12 שנים – 0.5 מ"ל עד 1 מ"ל של נטולן תמיסה לשאייה (2.5 עד 5 מ"ג סאלבוטאמול).**

יתכן שהרופא אמר לך לדלл את נטולן תמיסה לשאייה עם תמיסת מלח סטרילית (סליין) לפני השימוש בה במק Shir אין הילצה. צור לעקב אחריו הוראות הדילול.

### **טיפול רציף (Continuous treatment)**

1 עד 2 מ"ג של סאלבוטאמול לשעה. ניתן להגיע למנה זו על ידי דילול של 1 או 2 מ"ל של נטולן תמיסה לשאייה ל-100 מ"ל עם תמיסת מלח (סליין) סטרילית ליצירת תמיסת המכילה 50 או 100 מיקרוגרם/מ"ל של סאלבוטאמול, לשאיפת האדים ממ Shir אין הילצה מתאים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

### **איך להשתמש בתרופה**

- 1 הcn את מכ Shir אין הילצה למילוי.
- 2 מדוד את הכמות הנכונה של נטולן תמיסה לשאייה והכנס אותה לקערית מכ Shir אין הילצה.
- 3 הוסיף את הכמות הנכונה של תמיסת מלח (סליין) סטרילית (וזא כי הרופא הנחה אותך בכמות שצריך להשתמש).
- 4 הנח את המכסה על קערית מכ Shir אין הילצה ונער אותה בעדינות כדי לערוב את התcola.
- 5 הרכב את מכ Shir אין הילצה והשתמש בו על פי ההנחיות.
- 6 לאחר השימוש השLR כל תמיסה שנותרה בקערית מכ Shir אין הילצה. נקה את מכ Shir אין הילצה בדרך המומלצת.

### **אם נטלה בטיעות מינון גבוה יותר**

אם נטלה מינון גבוה יותר ממה שהיה צריך, דבר עם הרופא בהקדם האפשרי. התופעות הבאות עלולות להתרחש:

- הלב שלך יפעם מהר יותר מהרגיל
- אתה תרגיש רעד
- פעילות יתר (היפראקטיביות).

תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך כמה שעות.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

### **אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, קח אותה ברגע שאתה נזכר. אולם, אם זה הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אל טיפול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

### **אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרומות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהןך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

#### 4. תופעות לוואי

אם נשיםתך או היצפזפים מחייבים מיד לאחר נטילת תרופה זו, הפסיק להשתמש בה מיד, וספר לרופא בהקדם האפשרי.

כמו בכל תרופה, השימוש בנטולין תמיסה לשאייה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן. תופעות הלואן הבאות עלולות להופיע עם תרופה זו:

**תגובה אלרגית** (עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10,000** אנשים)

אם יש לך תגובה אלרגית, הפסיק לקחת ונטולין תמיסה לשאייה ופונה לרופא מיד. סימנים של תגובה אלרגית כוללים: התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או האגרון אשר עלולים לגרום לקשיים בבליעה או בנשימה, פריחה מוגדת, תחושת חולשה וסחרורת והתקוממות.

##### פונה לרופא בהקדם האפשרי אם:

- אתה מרגיש שלבר פועם מהר יותר או חזק יותר מהרגיל (דפיקות לב). תופעה זו בדרך כלל אינה מזיקה, ולרוב חולפת לאחר שהשתמשת בתרופה במשך זמן מה.
  - יתכן שתargin שחדוזף שלר לא סדיר או שהוא פועם פעימה נוספת.
  - תופעות אלה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים.
- אם אחת מתופעות אלה מופיעה אצלך, פונה לרופא בהקדם האפשרי. אל **פסיק להשתמש בתרופה זו** אלא אם נאמר לך לעשות זאת.

ספר לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלואן הבאות אשר עלולות להופיע גם הן עם תרופה זו:

##### תופעות לוואי שכיחות

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים:

- תשושת רعد
- כאב ראש.

##### תופעות לוואי לא שכיחות

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים:

- גירוי בפה ובגרון
- התכווצויות שריריים.

##### תופעות לוואי נדירות

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000** אנשים:

- רמת אשלגן נמוכה בدم
- עליה בזרימת הדם לגפיים (התרחבות פריפריאלית).

##### תופעות לוואי נדירות מאוד

אללה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10,000** אנשים:

- שינויים בדףו השינה ושינויים בהתנהגות, כמו חוסר מנוחה והתרגשות יתר.

##### תופעות הלואן הבאות עשוות להופיע **בנוסף** אר שיכחותן אינה ידועה:

- כאב בביית החזה עקב בעיות לב כמו תעוקת חזה. ספר לרופא, לאחות או ברוקח אם זה מתרחש. אל **פסיק להשתמש בתרופה זו** אלא אם נאמר לך לעשות זאת.
- מצב הידוע כחמתת לקטית (Lactic acidosis) העולם לאחוט כאבי בטן, נשימת יתר (היפרונטילציה), קוצר נשימה, כפות רגליים וידיים קרות, דופק לא סדיר או צמא.

אם אתה חושב שתרופה זו **לא פועלת מספיק טוב עבורך**

אם נראה לך שהתרופה שלך אינה פועלת כrangle, פנה לרופא בהקדם האפשרי. יתכן כי בעיית הנשימה שלך מחייבת ויתכן שתצטרכך תרופה אחרת. אל טיפולמנה נוספת של ונטולין תמייסה לשאייה אלא אם הרופא הורה לך על כך.

אם הופיעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא צוינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

#### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם ותווךראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. יש לאחסן את הבקבוק בקרטון החיצוני כדי להגן מפני אור.
- אל תשאיר תמייסה במכשיר האינhalbזיה לאחר שסיימת את הטיפול.
- לשימוש עד חודש ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה ולא יותר מתאריך התפוגה של התכשיר.
- לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, יש לרשום על גבי אריזת הקרטון את תאריך הפתיחה במקום המועד.
- אין להשיליך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

#### **6. מידע נוסף**

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Benzalkonium chloride solution, sulphuric acid dilute and purified water.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: ונטולין תמייסה לשאייה מגיעה בבקבוק זכוכית צבע ענבר המכיל 10 מ"ל או 20 מ"ל. התמייסה נטולת צבע עד צבע צהוב בהיר. יתכן שלא כל גדרי האריזות משווים.
- בעל הרישום: גלקסומימיקליין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.
- ץ'ן: גלקס אופריזנס (אנגליה) בע"מ, ברנדד קאסל, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 021-21046-021.
- לשם הפשתות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.  
© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלו.

Ven RS PT v9