

דולוקסטין סנדוז®

60 מ"ג ג'י.אר.ס'

כמוסות עמידות בחומציות הקיבת

דולוקסטין סנדוז®

30 מ"ג ג'י.אר.ס'

כמוסות עמידות בחומציות הקיבת

חומר פעיל:

דולוקסטין (כהידרוקלוריד) 60 מ"ג
duloxetine (as hydrochloride) 60 mg

חומר פעיל:

דולוקסטין (כהידרוקלוריד) 30 מ"ג
duloxetine (as hydrochloride) 30 mg

חומרים בלתי פיעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2
ופrisk 6 " מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סוף בטרכם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקה. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

תרופות נוגדות דיכאון וחרדה מעילות את הסיכון להתקנחות ומחשובות אובדןיות בילדים, מתבגרים
ומבוגרים צעירים עד גיל 24.

עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילים וקרובייהם, לעקוב אחר שינויים בתננויותם כגון החמרה
הדיינון, מחשובות אובדןיות, תוקפנות וכדומה.
אם חלים שינויים כאלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

דולוקסטין סנדוז ג'י.אר.ס' משמשת לטיפול במבוגרים הסובלים מ:

- מופעים של דיכאון מאזרוי.
- כאב נוירופטי הקשור לננוירופתיה סוכרטית הייקפית (generalized anxiety disorder, GAD)
- הפרעת חרדה כללית (generalized anxiety disorder, GAD)
- פיבромיאלגיה
- כאב כרוני של שריר השילד כאשר לא ניתן לתת טיפול אחר או טיפול קודם נכשל. התויה זו מבוססת על מחקרים בחולים עם כאב כרוני של הגב התחתון (CLBP) וכואב כרוני כתוצאה מאוטו-arteritis.

קבוצה Terapeutic: Doloxetin SN-IR ג'י.אר.ס' הינה משפחת תרופות ה-IRIs וגורמת לעלייה של רמות הסרotonin (serotonin) והנוורדרנילין (noradrenaline).

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").
- הינך סובל ממחלת כבד.
- הינך סובל ממחלת כליות קשה.
- הינך נוטל או נטלת-ב-14 הימים האחרונים תרופה אחרת שידעה כמעכבת monoamine oxidase inhibitor (MAOI) אוMonoamine Oxidase Inhibitor (MAOI)
- להתחילה טיפול בתרופות מסווג מעכבי monoamine oxidase, אם לא עברו לפחות 5 ימים מזמן הפסקת הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'י.אר.ס'; ראה "תגובה בין תרופות".
- הינך נוטל תיורידאי.

ażhorot miyachdot haengutot leshimush batarofah:

גלאוקומה נוגדות צוית (Angle Closure Glaucoma) - הרחבת האישונים, שנגרמת לעתים כתוצאה מטיפול בתרופות נגד דילאכטין סנדוז ג'י.אר.ס., יכולה לגרום למטופלים בעלי מבנה צוית צר שלא עבר ניתוח לכריית קשתית, לאירוע של גלאוקומה מסווג צוית צרה.

בעיות של תפקוד מיני לקין
דבר עם הרופא שלך אם יש לך שינוי בתפקוד המיני, או אם יש לך שאלות או חששות בגין תפקוד המיני במהלך הטיפול בדילאכטין סנדוז ג'י.אר.ס. יתכן שהרופא יוכל להציג לך פתרונות.

לפני הטיפול בדילאכטין סנדוז ג'י.אר.ס ספר לרופא אם אתה:

- סובל ממחלת כליות
- סובל או סבלת בעבר מפרוסים (התקפים)
- סובל או סבלת בעבר מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דרסיה) או מאניה
- סובל מבעיות בעיניים, כגון סוגים מסוימים של גלאוקומה (לחץ תוך עין מוגבר)
- סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד או אם אתה צריך כמויות גדולות של אלכוהול – צריכה אלכוהול מופרחת במקביל לנטיילת דילאכטין סנדוז ג'י.אר.ס. עלולה להזיק לך
- סובל או סבלת בעבר מדימומים לא תקינים (נטיה לפתח חבורות)
- סובל מרמות נתן נמוכות או אתה בסיכון לירידה ברמות הנתן (למשל אם אתה נוטל תרופות משתנות, במיוחד אם אתה קשיש)
- סובל מבעיות לב או לחץ דם גבוה ואם אתה נוטל תרופות להורדת לחץ דם
- סובל מסוכרת (טיפול בדילאכטין סנדוז ג'י.אר.ס. עלול לפגוע באיזון רמות הסוכר אצל חלק מהמטופלים)
- סובל מקצב התrokerות איטי של הקיבה
- בעל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות

מחשבות על התאבדות והחומרת הדיכאון או הפרעת החרדה שלך

דיכאון והפרעות פיסיולוגיות חמורות נוספות יזעום הסיכון הגבוהים ביותר לך以外 לאובדן. למרות זאת, במקרים מסוימים, המתבגרים והבוגרים הצעירים אשר לך תרופות נגד דיכאון, נצפתה עלייה במחשבות ובמעשים אובייניים, בעיקר בתחילת הטיפול, או כשהם נזקם מחדש. אם אתה מדויק או סובל מהפרעות חרדה, יכולות עלות בדיון לפעמים מחשבות על גרים נזק לעצמך או על התאבדות. מחשבות אלה עלולות להופיע בשיכחות גבוהה יותר כאשר מתחילה ליטול תרופות נגד דיכאון, בדרך כלל בחודשים הראשונים של הטיפול, או כשהם נזקם מחדש.

יתכן שתהיה לך נטיה רבה יותר לחשוף מחשבות כאלה אם:

- הוא לך בעבר מחשבות על התאבדות או על גרים נזק לעצמך
 - אתה מבוגר צער. מידע שנאוסף בנייטוים קליניים הראה סיכון מגבר להtanegot אובדן אצל מבוגרים בני-פחות מ-24 שנים הסובלים ממצביים פיסיולוגיים ואשר טופלו בתרופות נגד דיכאון
 - אתה סובל (או יש לך היסטוריה משפחתית) מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דרסיה)
- שים לב לכל שינוי במצב הרוח, בהtanegot, בנסיבות, בנסיבות, בנסיבות, ובמיוחד לשינויים פתאומיים. אם בזמן כלשהו יש לך מחשבות על גרים נזק לעצמך או על התאבדות, התקשר לרופא שלך או גש מיד לבית-חולים. שים לב במקרה לשינויים אלו בתחילת טיפול ולאחר שינוי במיןון.

התסמינים הבאים דומים מבוגרים, ילדים ומתבגרים שתופלו בתרופות נגד דיכאון: חרדה, חוסר שקט, התקף פאניקה, חוסר שינה, עצבנות, עוניות, אגרסיביות, אימפלסיביות, אקאתיזיה (חוור מנוחה פיסי-OMETORI), היפומאניה, מאניה. הקשר בין הופעת תסמינים אלה להחומרת הדיכאון או הופעת דחפים אובדן לא הוכח, אולם נראה כי הם מהווים סימנים ראשוניים להtanegot אובדן.

יתכן שיעיל שתידע קרוב משפחה או חבר קרוב שאתה סובל מDICAOON או שיש לך הפרעת חרדה, ותבקש מהם לקרוא את העalon הזה. אתה יכול לבקש מהם לומר לך לדעתם הדיכאון או החרדה שלך מחקרים, או אם הם מודאגים ממשיים בהtanegot שלך. כמו כן, הקפד להגיע לכל הפגישות עם הרופא המטפל.

מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים במצב הרוח ובהtanegot כגון הגברת חרדה, התקף פאניקה, חוסר מנוחה ואי שקט, מאניה או היפומאניה, תוקפנות או הפרעות בשינה, במיוחד בתחילת הטיפול או כאשר המיןון משתנה. במקרה שחלו שינויים כגון אלה, יש לפנות מיידית לרופא. יש להזכיר הקפדה

יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגלאי 18-24.

שימוש בילדים ומתבגרים בני פחות מ-18 שנים

Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס' אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים בני פחות מ-18 שנים.

תగובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרופך. במילוי לךחת את הרופא אם אתה לוקח:

- תכשירים אחרים המכילים Dolokostenin במינונים שונים להתיוויות אחרות - יש להימנע משימוש בו בזמן עם תרופה זו. בדוק עם הרופא שלך האם כבר נטול תרופות אחרות שמכילות Dolokostenin.
- מעכביmonoaminergic אוקסידאז (Monoamine Oxidase Inhibitors – MAOIs): עליך להימנע מליטול Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס' אם אתה נטול או אם נתלת לאחרונה (ב- 14 הימים האחרונים), תרופה מסווג מעכב monoaminergic אוקסידאז (MAOI). נטילת מעכבי monoaminergic אוקסידאז (כגון מתילן בלו טור-ורידי או לינזolid) יחד עם תרופות מרשם רבota, כולל Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס', עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות עד כדי סכנת חיים. עליך להמתין 14 ימים לפחות לאחר שהפסיקת ליטול מעכבי monoaminergic אוקסידאז לפני שתוכל ליטול Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס'. כמו כן, עליך להמתין 5 ימים לפחות לאחר שאתה מפסיק ליטול Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס' לפני שתוכל ליטול מעכבי monoaminergic אוקסידאז.
- תרופות שימושיות את רמת הסרוטונין - תרופות אלו מגבירות את הסיכון בינהן לתסמונות סרוטוניין (ראה פרק 4 "תופעות לווא")
- משככי כאבים חזקים כגון טראמאдол (tramadol) ופנטניל, מפירידין (meperidine), מתאדון (methadone) או אופיאודים אחרים.
- טריפטאנים (tryptans) (לטיפול במיגרנה)
- טריפטופאן (tryptophan) - חומצה אמינית המופיעה במזונות, תמייסות עירוי להזנה ותוספי מזון
- נוגדי דיכאון טריציקליים (St. John's Wort – SNRIs)
- תרופות נוגדות דיכאון מקבוצת SSRI ו- SNRIs
- בוספירון (buspirone)
- אמפטמינים
- ליתאים

• תרופות המשפיעות על קריית הדם והיווצרות קריישים כגון:

- וארפין (קומדין) – אם אתה נטול וארפין, יתכן שהרופא יעקב אחריו מצבך בתחילת ובסיומו של הטיפול ב-Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס'.
- תרופות נוגדות דלקת שאין סטרואידליות (NSAIDs) כגון איבופרופן, נפרוקסן או אספירין. תרופות אלו עלולות להגבר את הסיכון לדם.

• תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית

- משתנים
- תרופות שמוריידות את רמת החומציות בקיבה (עלולות לגרום לשחרור מוקדם של התרופה)
- תרופות המוריידות לחץ דם

• Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס' משפיעה על ריכוז תרופות אחרות בدم:

- תאופילין (לטיפול באסתמה)
- נוגדי דיכאון טריציקליים כגון דספראמין (desipramine), נורטראיפטילין (nortriptyline), אМИטריאפטיין (amitriptyline) ואמיפראמין (imipramine)
- פנותיאזינים (phenothiazines)
- תרופות לטיפול בהפרעות קצב: פלקאייניד (flecainide), פרופfenון (propafenone), תיורידזין (thioridazine), השילוב עלול לגרום לביעות קשות בקצב הלב או מוות פתאומי.

• התרופות הבאות המשפיעות על הריכוז של Dolokostenin סנדוז ג'. א.ר.ס' בדם:

- צינידין (quinidine) לטיפול בהפרעות קצב
- פלאוקסטין (fluoxetine), פלובוקסמין (fluvoxamine), פרוקסטין (paroxetine)
- סימטידין (cimetidine)

- תרופות אנטימיקרוביאליות ממשפחת הקווינולוניים כגון ציprofולוקסאצין (ciprofloxacin) או אנווקסאצין (enoxacin)

אם אתה חווה תסמן יוצא דופן כלשהו בעת לחיות תרופה כלשהי מבין התרופות האלה יחד עם דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס., עליך לגשת לרופא שלך.

הרופא שלך צריך להחליט האם אתה יכול ליטול דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. יחד עם תרופות אחרות. אל תתחיל ואל תפיסך ליטול אף תרופה, כולל תרופות שנקרו ללא מרשם רפואי וצמחי רפואי, לפני שאתה מתייעץ עם הרופא שלך.

שימוש בתרופה ומזהן

ניתן ליטול דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

נטילת דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. יחד עם צריכת אלכוהול גדולה עלולה לגרום לנזק חמור לכבד. המנע מצריכת אלכוהול מרובה בזמן נטילת דולוקסtein ג'י.אר.ס.

הירון והנקה

התיעיצי עם הרופא או עם הרוקח שלך לפני שאתה נוטלת תרופה כלשהי.

- הודיעי מיד לרופא שלך אם הרית או את חשבות שתאת בהירון בזמן שאתה נוטلت דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. עלולה לפגוע בעובר שלך. עליך להשתמש בדולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. אך ורק לאחר שדנתה עם הרופא בתוצאות האפשרויות ובנזקים שעולאים להיגרם לעובר שלך.
- ודאי שהמיילדת שלך ו/או הרופא יודעים שאתה מטופלת בדולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. כאשר נוטלים תרופות מסוג SSRI ו-SNRI, כולל דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס., במהלך סוף השלישי של ההירון, עלול להגיד הסיכון לשיבוכים שייצרכו אשפוז לתקופה ממושכת של הלידות, תמייכה נשימתית והזנה על ידי צינורית הזנה. הסיבוכים הנ"ל יכולים לאחר הלידה ויכולים לכלול מצוקה נשימתית, כיחלון, הפסיקת נשימה, עוויותות, חוסר יציבות של טמפרטורת הגוף, קשיי אכילה, הקאות, היפוגליקמיה, רפioxן שרירים, נקשות שרירים, רפלקסים מגברים, רעד, עצבנות, אי שקט ובכי ללא הפסקה. אם לאחר הלידה מופיע אצל התינוק שלך תסמן כלשהו מבין אלה, או אם את מודאגת באשר לבリアותו של התינוק שלך, התיעיצי עם המילדת או עם הרופא שלך.
- יודיע את הרופא שלך אם אתה מיניקה או מתכונת להניק. דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. עוברת לחלב אם ועלולה להזיק לתינוק. שימוש בדולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. בתגובה להניקה אינם מומלץ. התיעיצי עם הרופא שלך לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך בזמן נטילת דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס.

גהיגה ושימוש במكونות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לשינויות או להשפייע על יכולתך להחליט החלטות, לחשב בהירות או להגיב בנסיבות. ועל כן השימוש בתרופה זו מחייב זהירות בניהלה ברכב, בהפעלת מكونות מסוימות ובכל פעילות המחייבת ערנות. אל תנהג ואל תשתמש במכשירים או במكونות לפני שאתה יודע כיצד דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. משפיעו עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

דולוקסtein סנדוז ג'י.אר.ס. מכילה לקטוז, Allura Red AC, נתרן -(E 129) (Sunset Yellow FCF (E 110)). תרופה זו מכילה לקטוז. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי-סבלות לסוגים מסוימים של סוכר, התיעיצי עם הרופא לפני שאתה נוטל תרופה זו.

תרופה זו מכילה (E 129) Allura Red AC, אשר עלול לגרום לתגובה אלרגית. תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל כמוסה, ולכן ניתן לומר שהיא "נטולת נתרן". בסופו, דולוקסtein סנדוז 60 מ"ג ג'י.אר.ס. מכילה גם את (Sunset Yellow FCF (E 110)), אשר עלול לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד משתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. יתכן שהרופא י策ר לשנות את המינון עד אשר ימצא את המינון המתאים לך. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

• לכאוב נוירופטי הנובע מוסכרת: המיןון הרגיל של דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. הוא 60 מ"ג פעם ביום. הרופא שלך יקבע את המיןון המתאים לך.

• לכאוב שריר שלד כרוני ולהפרעת חרדה כללית: רוב המטוטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום, הרופא שלך יקבע לך את המיןון המתאים לך. אצל חלק מהמטוטופלים יש צורך במיןון ההתחלתי של דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'.אר.ס. פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המיןון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

• לדיכאון: רוב המטוטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום. אצל חלק מהמטוטופלים יש צורך במיןון ההתחלתי של דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'.אר.ס. פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן המיןון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום. קשיים - יש להתחיל את הטיפול ממיןון ההתחלתי של 30 מ"ג פעם ביום למשך שבועיים ורק לאחר מכן לשקל ולהעלות את המיןון ל - 60 מ"ג פעם ביום.

• פיבромיאלגיה: המיןון ההתחלתי של דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. הינו 30 מ"ג פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המיןון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לרוב, השפעת הטיפול התורופתי בדולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. ניכרת לאחר 4-2 שבועות של טיפול.
אין לעבור על המנה המומלצת.

דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. נועדה לנטילה דרך הפה. עליך לבלווע את כל הcumosa בשלהמתה עם מים. אין ללעוס או לכתוש את תכולת הcumosa ואין לפתח את הcumosa ולפזר את תוכנה באוכל או שתיה. התורופה אינה מיועדת לנטילה דרך זונדה היות שתכולת הcumosa עלולה לחסום את הצינורית.

דבר עם הרופא שלך לגבי משך הזמן שאתה צריך ליטול דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. אל תפסיק ליטול דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. בלי לדבר תחילת עם הרופא שלך.

אם **נטלת בטיעות מיןון גבוה יותר**, עליך להתקשר מיד לרופא או לרוקח שלך. התסמינים של מיןון יתר יכולים לכלול ישננות, תרדמת, תסמנת סרוטוני (תגובה שיכולה לגרום להזיות, עצבנות, תרדמת, קצב לב מהיר, לחץ דם לא יציב, סחרחות, הזעה, הסמקה, חום, רעד, נזקשות שרירים, כיווץ שרירים, רפלקסים מוגברים, חסור קווארדיינציה, בחילה, הקאה ושלשול), פרוכוסים, התעלפות, לחץ דם נמוך, לחץ דם גבוה, הקאות ודופק לב מהיר.

אם **נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעליל** מן התורופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי של בית חולים, והבא את אריזת התורופה איתך.

אם שכחת ליטול את התורופה, אנא טול את המנה ששכחת ברגע שאתה נזכר. אם זה מועד הקروب למועד נטילת המנה הבאה, דילג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בלבד. אל תיטול מנה נוספת של דולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתורופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התורופה: אם הרופא חושב שאתה זקוק עוד לדולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס., הוא יורה לך להקטין את המיןון שאתה נוטל בהדרגה לפני הפסקת הטיפול לחלווטין. אין להפסיק ליטול תרופה זו לצורך פתאומית בלי להיוועץ ברופא. כאשר אתה מפסיק את נטילת התורופה מהר מדי או עבר מרטרופה נוגדת דיכאון מהר מדי יתכן שתתחש בתסמינים החמורים הבאים: סחרחות, כאב ראש, בחילה, שלשול, תחושת נימול (עקבוציות ודקירות), אי-שקט ועצבנות, הקאות, נזקי שינה, חרדה, בלבול, תחושת חסור יציבות רגשית, תופעה של היפומאניה, טנתון (شمיעת צלצול באוזן בעת שאין שום צליל חיצוני), עוויתות, הצעת יתר ותשישות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדולוקסטיין סנדוז ג'.אר.ס.י עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

- **סימנים לפגעה בכבד:** גירוד, כאב בחלק עליון ימי של הבطن, שタン כהה, הצהבה של העור או של הלבן בעיניים (צחבת), כאב מוגדל, עליה חזה באণימי הכבד. במקרה של סימנים של פגעה בכבד יש לפנות מיד לרופא.
- **תגובה עור חמורת - Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י** עלולה לגרום לתגובה עור חמורת שיתכן שתתרגונה להפסקת השימוש. יתכן והיה צריך לטפל בתופעות אלו בבית החולים והן עשויות להיות מסכנות חיים. פנה מיד אל הרופא או לשירות חירום רפואי אם יש לך שלפוחיות עור, פריחה בעור שמתකפת, פצעים בפה, סרפדת או תופעות אלרגיות אחרות.

מחשבות והתנהגות אובדן

- **יש לפנות לרופא מיד אם הינך חש באחת מההתופעות הבאות, במיוחד אם הן חדשות, חמימות או שהן מדאיות יותר:**

ניסיונות התאבדות, דחפים מסוכנים, תוקפנות, כאס, אלימות, מחשבות על התאבדות או מוות, הופעת דיכאון או החמרה של דיכאון, הופעת חרדה או החמרה של חרדה, התקפות פאניקה, תחששה חזקה של נסערות, חוסר שקט, הופעת עצבנות או החמרה של עצבנות, בעיות שינה, עליה קיצונית בפעולות או בדיבור (מאניה), שינויים אחרים בהתנהגות או במצב הרוח.

- **تسمונת סרטוניין:** מצב שלועל להיות מס肯 חיים. התסמינים עלולים לכלול: תגובה שיכולה לגרום לתחששה של שינויים במצב הנפשי (כגון עצבנות, הזרות, תרדמת), חוסר יציבות אוטונומית (דופק מהיר, לחץدم בלתי יציב, סחרחות, הצעת יתר, הסמקה, עליה בחום הגוף), בעיות נוירומוסקולריות (רעד, נזקשות, עוויתות בשירים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה), עוויתות ו/או תסמים במערכת העיכול (כגון בחילה, הקאה, שלשול). פנה מיד לעזרה רפואי אם אתה חווה תסמים אלו.

- **שינויים בלחץ הדם ונפילות:** בדוק את לחץ הדם לפני ובמהלך הטיפול. Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י עלולה להעלות את לחץ הדם, להויריד את לחץ הדם כאשר נעדים ולגרום לSchedulerות או התעלפות בעיקר כאשר מתחילים לחתול Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י לראשונה או כאשר מגדלים את המינון. Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י עלולה להגדיל את הסיכון לנפילות, בעיקר בקשישים.

- **dimom חריג:** Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י ותרופות נוגדות דיכאון אחירות יכולות להגביר את הסיכוי לדימומיים וחברות בעיקר אם אתה נוטל גם תכשיר מדיל דם כגון אפרפין, תרופות נוגדות דלקת שאין סטרואידליות (NSAIDs) או אספירין. יתכן גם דימום לאחר לידה בשיכחות גבוהה יותר.

- **מושעים של מאניה:** אנרגיה מוגברת מאוד, הפרעות שינה קשות, מחשבות תציגתיות, התנהגות פוחצת, רעיזונות גדולים באופן לא רגיל, עצבנות או שמחה קיצונית, דיבור רב או מהיר מהרגיל.
- **גלאוקומה צרת זווית (Angle Closure glaucoma) (בעיות ראייה):** כאבי עיניים, שינוים בראיה, נפיחות או אדומות מושגים מסביב לעין.

רק חלק מהאנשים נמצאים בסיכון לתופעות לוואי אלו. יתכן ותרצה לבצע בדיקה של העיניים כדי לדעת האם אתה בסיכון ולקבל טיפול מניעתי במידה וכן.

פרכוסים והתקכוויות

- **רמת נמכות של נתן בدم:** קשיים נמצאים בסיכון מוגבר לתופעה זו: התסמינים יכולים לכלול תחששת כאב ראש, חולשה או חוסר יציבות, בלבול, קשי להתרכז, לחשוב או בעיות זיכרון. תסמים חמורים יותר הם הזרות, איבוד הכרה, פרכוסים, תרדמת, דום נשימה וממות.

- **בעיות הקשורות במתן שני:** התסמינים יכולים לכלול זרם מופחת של שタン, חוסר יכולת להשתין.
- **הפרעות בתפקוד המיני:**

נטילת סרטוניין ומעכבי ספיגת חזרת של סרטוניין ונווראפיג'רין (ZNR), כולל Dolokstein Sandoz ג'.אר.ס.י, עלול לגרום לביעות בתפקוד המיני.

התסמינים אצל גברים עשויים לכלול:

- שפיכה מאוחרת או חוסר יכולת לבצע שפיכה
- ירידה בחשך המיני
- בעיות בהשגת זקופה או שמירה עליה

התסמינים אצל נשים עשויים לכלול:

- ירידה בחשך המיני
- עיכוב הארגזמה או חוסר יכולת לקבל ארגזמה

דבר עם הרופא שller אם יש לך שינויים בתפקוד המיני, או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתפקיד המיני במהלך הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'.אר.ס. יתכן שהרופא יוכל להציג לך פתרונות.

תופעות הלואי השכיחות ביותר בקרב מבוגרים שנצפו בניסויים הקליניים

توفעות اللواي שנצפו בשכיחות הגבוהה ביותר בקרב מבוגרים שטופלו בדולוקסטין הן (לפי ההתווות השונות):

- כאב נירופטי הקשור לנירופתיה סוכרתית היקפית: בחילה, תחושת נמנום, תיאבן מופחת, עצירות, הצעת יתר ויבש בפה.
- פיבромיאלגיה – בחילה, יובש בפה, עצירות, הצעת נמנום, הצעת יתר, נסערות, תיאבן מופחת.
- כאב קרוני כתוצאה מאוטוarteritis – בחילה, עיפות, עצירות, יובש בפה, נזודי שינה, תחושת נמנום וסחרחות.
- כאב קרוני של הגב התיכון – בחילה, יובש בפה, נזודי שינה, תחושת נמנום, עצירות, סחרחות ועיפות.

توفעות לוואי שנצפו בשכיחות של 5% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בניסויים קליניים במבוגרים:
בחילה, כאב ראש, יובש בפה, תחושת נמנום, עיפות, נזודי שינה, עצירות, סחרחות, שלשלולים, תיאבן מופחת, הצעת יתר, כאב בטן

תופעות לוואי שנצפו בשכיחות של 2% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בניסויים קליניים במבוגרים שסובלים

מדיכאון מ阿姨ורי והפרעת חרדיות כללית:

- הפרעות לב – פלפיטציות (הלומות לב)
- הפרעות עיניהם – ראייה מטושטשת
- הפרעות במערכת העיכול – בחילה, יובש בפה, עצירות, שלשלולים, כאב בטן, הקאות
- הפרעות כליות – עיפות
- הפרעות מתאbowitz (חלוף חומרים) ותזונה – תיאבן מופחת
- הפרעות במערכת העצבים – כאב ראש, סחרחות, תחושת נמנום, רעד
- הפרעות פסיכיאטריות – תחושת נמנום, נסערות, חרדות
- הפרעות במערכת המין ובشد – חוסר יכולת להשיג זיקפה, עיכוב בשפייה, הפחמת הלבידון, ארגזמה חריגה
- הפרעות נשימתיות ובছזה – פיהוק
- הפרעות עור – הצעת יתר

תופעות לוואי שנצפו בשכיחות של 2% או יותר ביחס לקבוצת הביקורת בניסויים קליניים במבוגרים שסובלים

מכאב נירופטי הקשור לנירופתיה סוכרתית היקפית, פיבромיאלגיה, אוטוarteritis וכאב קרוני של הגב התיכון:

- הפרעות במערכת העיכול – בחילה, יובש בפה, עצירות, שלשלול, כאב בטן, הקאות, קשיי עיכול (dyspepsia)
- הפרעות כליות – עיפות
- зиhomים ונגעים – דלקת בלוע האפי (nasopharyngitis), זיהומיים במערכת הנשימה העליונה, שפעת
- הפרעות מתאbowitz (חלוף חומרים) ותזונה – תיאבן מופחת
- שריר השילד וركמות החיבור – כאב של שריר השילד, התכווצות שרירים
- הפרעות במערכת העצבים – כאב ראש, תחושת נמנום, סחרחות, פאראסטזיה (paraesthesia), תחושה לא רגילה בעור), רעד
- הפרעות פסיכיאטריות – נזודי שינה, נסערות
- الفراعات بمعרכת المين وبشد – חוסר יכולת להשיג זיקפה, הפרעות בשפייה
- الفراعات نشيميات وبছزة – שיעול
- الفراعات عور – הצעת יתר
- الفراعات شل كل الدم – הסמקה, עליה בליח הדם

توفעות לוואי אחרות שנצפו במהלך הערצת הניסויים הקליניים של Doloksitin במבוגרים:

- الفراعات لب – שכיחות: הלומות לב (פלפיטציות). לא שכיחות: התקף לב (myocardial infarction), קצב לב מהיר (tachycardia), תסמונת הלב השבור (tachycardia).

- **הפרעות באוזניים ובשוווי המשקל** – שכיחות: רוטיגו. לא שכיחות: כאב אוזניים וטנטון.
- **הפרעות אנדרוקריניות** – לא שכיחות: היפו-תירואידיזם.
- **הפרעות ראייה** – שכיחות: ראייה מוטושטשת. לא שכיחות: ראייה כפולה (diplopia), יובש בעיניים וליקויים בראייה.
- **הפרעות עיכול** – שכיחות: גזים במערכת העיכול. לא שכיחות: קושי בבליעה (dysphagia), גיהוקים, דלקת של הקיבה (גסטראיטיס), דימום במערכת העיכול, ריח רע מהפה (halitosis), דלקת של הפה והשפתיים (stomatitis). נדירות: כיבים בקיבה.
- **הפרעות כלויות** – שכיחות: צמרורות. לא שכיחות: נפילות, הרגשה חריגה, תחושת חום /או קור, הרגשת חוסר נוחות וצמא. נדירות: הפרעות הליכה.
- **זיהומיים ונגעים** – לא שכיחות: דלקת הקיבה והמעיים (gastroenteritis) ודלקת של מיתרי הקול (laryngitis).
- **בדיקות נסיפות** – שכיחות: עליה במשקל, ירידה במשקל. לא שכיחות: עליה בקולוסטרול בדם.
- **מטבוליים והפרעות תזונה** – לא שכיחות: התיבשות ועליה בשומנים בדם (hyperlipidemia). נדירות: חוסר איזון של שומנים בדם (dyslipidemia).
- **הפרעות בשיריר השلد וברקמות החיבור** – שכיחות: כאב בשיריר השلد. לא שכיחות: מתיחות של שרירים ועויות בשירירים.
- **הפרעות של מערכת העצבים** – שכיחות: שינוי של תחושת הטעם, עייפות ותחושה לא רגילה בעור (paresthesia/hypoesthesia). לא שכיחות: הפרעה בתשומת הלב, תנעות חוזרות ולא רצוניות (dyskinesia), התכווצויות לא רצוניות של שרירים (dysonus) ואיכות שינה גרועה. נדירות: חוסר יכולת לדבר (dysarthria).
- **הפרעות פסיכיאטריות** – שכיחות: חולומות לא שגרתיים והפרעות שינה. לא שכיחות: אפאתיות, חריקת שיניים, חוסר התמצאות במרחב/בלבול, עצבנות, שינויים במצב הרוח וניסיונות התאבדות. נדירות: התאבדות.
- **הפרעות בצליות ובמערכת השתן** – שכיחות: השנתנה תכופה. לא שכיחות: חוסר יכולת להשתין, דחף חזק להשתין, השנתנה לילה, השנתנה יתר וריח שtan לא רגיל.
- **הפרעות במערכת המין והשדיים** – שכיחות: חוסר יכולת לחוות אורגזמה/orгазמה חריגה. לא שכיחות: תסמיינים של גיל הבלוטות(menopausal), חוסר תפקוד מיני וכאב באשכים. נדירות: הפרעות במחזור החודשי.
- **הפרעות נשימה ובחזה** – שכיחות: פיהוק, כאב בלווע. לא שכיחות: לחץ בגרון.
- **הפרעות בעור וברקמות העור** – שכיחות: גירוד. לא שכיחות: זיהעה קרה, דלקת עור, אדמנת (erythema), נתיה מוגברת לפתח חבורות, הזעת לילה ורגישות לעור. נדירות: אקיומוזיס (escess, סוג של חבורה).
- **הפרעות בכלי הדם** – שכיחות: גלי חום. לא שכיחות: הסמקה, תת לחץ דם בעמידה והרגשת קור בגפיים.

תופעות לוואי שנצפו לאחר התחלת השימוש:

דלקת לבלב חריפה, שוק אנאפילקטִי, תוקפנות וכעס (ביחוד בשלבים מוקדים של הטיפול או לאחר הפסקה), בזקת בפנים, בחלל הפה, בטן ובഗיפים, גלאוקומה סגורה צוית, דלקת של המעי הגס (КОЛІТИС), מיקרוסקופי או שאינו מובהן), דלקות של כלי הדם שעל פני הגוף (vasculitis, cutaneous), לעיתים במעורבות סיסטמית), הפרעות אקסטראפרימידליות, זיבת חלב (galactorrhea), דימום גניאוקולוגי, הזרות, יתר סוכר בדם (הירגאליקמיה), יתר פרולקטין בדם (hyperprolactinemia), רגישות יתר, משבר של יתר לחץ דם, עוויות שירירים, פריחה, תסמנות חוסר המנוחה של הרגליים (restless legs syndrome), פרוכסימים לאחר הפסקת הטיפול, פרופורחרדים (supraventricular arrhythmias, טנטון (לאחר הפסקת הטיפול), עווית (צביתת) לסתות (trismus) וsurfadt (urticaria).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מטופעת הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הזכרה לעלון, עלייך להתיעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעללה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוחן ראייתם של ילדים

- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הארץיה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן מעל 25°C.
- אין להשילר תרופות לביבום או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך איך להיפטר מתרופות שאין נוחצות עוד. זה יסייע להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

תכולת הרכmosה:

microcrystalline cellulose (type 102), hypromellose acetate succinate, povidone, starch maize pregelatinised, titanium dioxide (E171), lactose monohydrate, HPMC 2910/hypromellose 15cP, 3cP, 50cP (E464), macrogol/PEG MW 4000 (E1521), talc, magnesium stearate, sodium stearyl fumarate

מעטפת הרכmosה:

gelatin, titanium dioxide (E171), Brilliant Blue FCF (FD&C Blue No. 1, E133), Allura Red AC (FD&C Red No.40, E129)

מעטפת הרכmosה של דולוקסטין סנדוז 60 מ"ג ג'י.אר.ס' מכילה בנוסף גם את הבאים:
Sunset Yellow FCF (FD&C Yellow No.6, E110), Quinoline Yellow (E104)

צבע הדיו של הכתיבה:

shellac glaze~45% (20% esterified) in ethanol, FD&C blue#2 indigo carmine aluminum lake (E132), N-butyl alcohol, titanium dioxide (E171), propylene glycol (E1520), isopropyl alcohol.

כל כמiosa של דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'י.אר.ס' מכילה 1.95 מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל כמiosa של דולוקסטין סנדוז 60 מ"ג ג'י.אר.ס' מכילה 3.9 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה:
דולוקסטין סנדוז ג'י.אר.ס' היא כמiosa ג'לטינ קשה עמידה בפני עיכול בקיבה.

דולוקסטין סנדוז ג'י.אר.ס' משווקת בשני מידות: 30 מ"ג ו-60 מ"ג.

כמיסות דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'י.אר.ס'.
מכסה הרכmosה הינו בצבע כחול כהה אטום, וגוף הרכmosה הינו בצבע לבן אטום, גודל 2, ומוטבע עליו הכתיבה "30".
הרכmosה מכילה 4 טבליות "מיני" עגולות הקモרות משני הצדדים בצבע לבן עד אופ-וויט.

כמיסות דולוקסטין סנדוז 60 מ"ג ג'י.אר.ס'.
מכסה הרכmosה הינו בצבע כחול כהה אטום, וגוף הרכmosה הינו בצבע צהבהב - יrox אטום, גודל E0, ומוטבע עליו הכתיבה "60". הרכmosה מכילה 8 טבליות "מיני" עגולות הקמוות משני הצדדים בצבע לבן עד אופ-וויט.

כמיסות דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ו-60 מ"ג ג'י.אר.ס' מסופקות באריזות של 30, 28, 24, 14, 7 כמוסות.
יתכן שלא כל גודלי הארץיות משוווקים.

בעל הרישום והיבואן וכותבותו: נוברטייס ישראל בע"מ, תד. 7126, תל אביב
נערכ באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מוס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

**דולוקסטין סנדוז® 30 מ"ג ג'י.אר.ס': 167-67-35796-00
דולוקסטין סנדוז® 60 מ"ג ג'י.אר.ס': 167-68-35797-00**

לשם הפניות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.