

رافيسيكا®

كبسولات

المادة الفعالة وكميتها

تحتوي كل كبسولة على:

ميجلوستات 100 ملг (Miglustat 100 mg)

للقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر، انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة مع مرض غوشيه من نوع 1.

السيادة واستعمال الماكنا

قد يسبب إستعمال هذا الدواء الدوار لذلك لا يجوز السيادة أو تشغيل الماكنا الخطيرة إذا شعرت بالدوار.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء صوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمل من الصوديوم (23 ملخ) في الكبسولة، أي أنه فعلياً "حال من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب إستعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

- بخصوص مرض غوشيه من نوع 1

الكبار: المقدار الدوائي هو عادة كبسولة واحدة (100 ملخ) 3 مرات في اليوم (في الصباح، بعد الظهر، وفي المساء). الكمية القصوى هي 3 كبسولات (300 ملخ) في اليوم.

- بخصوص مرض نيمان-بيك من نوع 2

الكبار والراهقون (فوق عمر 12 سنة): المقدار الدوائي هو عادة كبسولاتان (200 ملخ) 3 مرات في اليوم (في الصباح، بعد الظهر، وفي المساء). الكمية القصوى هي 6 كبسولات (600 ملخ).

الأطفال دون عمر 12 سنة: سيلائم الطبيب المقدار الدوائي.

إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى من الجائز أن يُوصى لك مقدار دوائي إبتدائي أخف.

إذا كنت تعاني من الإسهال خلال تناول رافيسيكا، سيفحص الطبيب خفض المقدار الدوائي خاصتك، مثلًا لكتنز واحدة (100 ملخ) مرة أو مرتين في اليوم (أنظر الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"). سوف يشرح لك الطبيب مدة فترة العلاج.



لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.
- يجب بلع الكبسولات بشكلها الكامل مع كأس من الماء.

تعليمات الفتاح:

إخراج الكبسولة:

1. إفصل على طول الخط المثقب.
2. قم بتنقش الورق وفقاً للأسماء
3. إدفع الكبسولة عبر الألومنيوم



1) لأي غرض مخصص الدواء؟

- معالجة مرض غوشيه من نوع 1 (type 1) طفيف حتى متوسط لدى مرضى الذين وُجدوا غير ملائئتين لعلاج إنزيمي بديل.
- معالجة أمراض عصبية متقدمة بشكل تدريجي لدى الكبار والأطفال الذين يعانون من مرض نيمان-بيك من نوع C.

الفصيلة العلاجية: مثبط إنزيمي، الذي يؤثر على الإستقلاب.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (أميرجي) للمادة الفعالة (ميجلوستات) أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى.
- لا تستعمل الدواء عندما تكونين حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ رافيسيكا إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من مرض كلوبي.
- كنت تعاني من مرض كبد.
- كنت حساساً لغذاء أو دواء أيًا كان.

إذا كنت تعاني من الإسهال، من الجائز أن يوصي لك الطبيب بتغيير نظامك الغذائي لخفض كمية الكلتوز والكريبوهيدرات المستهلكة (مثل سكروز)، أو عدم تناول رافيسيكا مع الطعام، أو خفض المقدار الدوائي بشكل مؤقت. في حالات معينة قد يفحص الطبيب في إعطاء مستحضر ضد الإسهال مثل لوبيراميد. في حال لم يتحسن الإسهال في أعقاب هذه الخطوات، أو إذا كنت تعاني من مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي، يجب إستشارة الطبيب. في هذه الحالة من الجائز أن يقرر الطبيب إجراء إستياضاح إضافي.

يتوجب على المتعالجين الرجال إستعمال وسائل منع حمل موافقة خلال العلاج بـ رافيسيكا ولمدة ثلاثة شهور بعد نهاية العلاج.

الفحوص والمتابعة

قبل وخلال فترة العلاج بهذا الدواء، سيوجهك الطبيب لإجراء الفحوصات التالية:

- فحص أعصاب في اليدين والرجلين

• قياس نسب فيتامين B12

- متابعة النمو لدى الأطفال والراهقين مع مرض نيمان-بيك من نوع C

• مراقبة تعداد الصفائح الدموية

السبب لهذه الفحوصات هو أن مرض معيين قد يشعرون بخدر أو بوخذ في اليدين وراحتي القدمين، أو إنخفاض الوزن خلال العلاج بالدواء. تساعد الفحوصات الطبيب على أن يقرر إذا كانت هذه التأثيرات هي نتيجة للمرض، نتيجة لمشاكل قائمة أخرى، أو نتيجة من أعراض جانبية لـ رافيسيكا (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول: أدوية تحتوي على إيميجلوسيراز التي تُعطى أحياناً سوية مع رافيسيكا، وقد تقلل كمية رافيسيكا في الجسم.

إستعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة

لا يجوز إستعمال رافيسيكا إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. عليك إستعمال وسائل منع

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Sodium starch glycollate, povidone (K30), magnesium stearate, gelatin, water, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172), shellac.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة
كبسولات بيضاء مع "OGT 918" معلم بأسود على غطاء الكبسولة وـ "100" معلم
بأسود على جسم الكبسولة.
الدواء معبأ ضمن علب ذات 4 لوبيات (بليستيرات); كل لوبية تحتوي على 21 كبسولة
– بالإجمال 84 كبسولة.

المستورد وصاحب الإمتياز وعنوانه:
جيـيـ سـيـ هـيلـثـ كـيرـ مـضـ، كـيـوـتـسـ شـفـاـيـمـ 6099000، إـسـرـائـيلـ.
رـقـمـ سـجـلـ الدـوـاءـ فـيـ سـجـلـ الأـدـوـيـةـ الـحـكـومـيـ فـيـ وزـارـةـ الصـحـةـ:
128 34 30714 00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
تم إعدادها في تشرين الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر معك علبة الدواء.
خلال إستعمال زافيسيكا في الأبحاث السريرية وبمقادير دوائية حتى 3000 ملخ، شوهد إنخفاض في كريات الدم البيضاء وأعراض جانبية إضافية تشبه تلك المذكورة في الفقرة 4 من هذه النشرة.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب. لا يجوز تناول مقداراً مضاعفاً للتعويض عن المقدار المنسي. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء
لا يجوز التوقف عن العلاج من دون إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال زافيسيكا قد يسبب أعراض جانبية لدى بعض المستعملين.
لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أيًّا منها.

توجه إلى الطبيب بشكل فوري إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

• الأعراض الجانبية الأكثر خطورة:

قد يشعر بعض المرضى بالوخز أو بالتنميل في اليدين وراحتي القدمين (شوهدت بشكل شائع). قد تكون هذه الأعراض علامات لمرض عصبي محطي (اعتلال عصبي)، نتيجة للأعراض الجانبية لـ زافيسيكا أو نتيجة أمراض قائمة. سببها الطبيب لإجراءفحوصات قبل وخلال العلاج بـ زافيسيكا للإستيقاظ عن ذلك (أنظر الفقرة 2 "الفحوص والمتابعة").

• في حال كنت تشعر ببرحة خفيفة، عادة في اليدين، عليك التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن. في أغلب الحالات ستختفي الرحة دون الحاجة إلى إيقاف العلاج، لكن أحياناً يفحص الطبيب خفض المقدار الدوائي أو إيقاف العلاج بـ زافيسيكا بهدف إيقاف الرحة.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 متعالجين:
إسهال، إنتفاخ البطن (غازات)، ألم في البطن، إنخفاض الوزن، إنخفاض الشهية للطعام.
إذا كنت تفقد وزنك عند بداية العلاج بـ زافيسيكا لا تقلق. هذا العرض يتوقف عادة لدى المتعالجين خلال الإستمرار بالعلاج.

أعراض جانبية شائعة - تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين:
صداع، دوار، شعور بالتنميل أو الوخز، خلل في التنافس، إنخفاض حاسة اللمس، حرقان، غثيان، إمساك، تقيؤات، نفخة أو إنزعاج في المعدة، إنخفاض نسبة الصفيحات في الدم (قلة الصفيحات). قد تنتج الأعراض العصبية وإنخفاض في نسبة الصفيحات في الدم عن المرض ذاته.

أعراض جانبية أخرى تشمل تشنج العضلات، ضعف العضلات، إرهاق، قشعريرة، والشعور بوعدة، إكتئاب، أرق، فقدان الذاكرة، إنخفاض في الرغبة الجنسية.
يشعر معظم المتعالجين بواحد أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه، عادة في بداية العلاج أو بالتناوب خلال العلاج. في معظم الحالات تكون هذه الأعراض طفيفة وتختفي بشكل سريع نسبياً. إذا سببت هذه الأعراض مشاكل، يجب التوجه إلى الطبيب. سيفحص الطبيب خفض المقدار الدوائي من زافيسيكا أو بدلًا عن ذلك يوصي بأدوية أخرى لعلاج هذه الأعراض الجانبية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (il. www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (Expiry. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• خزن في درجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.