

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקטים (תקנירט) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אימסיברי
תמייסה להזרקה

החומר הפעיל ורכזו:

כל בקבוקון של אימסיברי מכיל 10 מ"ג של סטמלנותיד – Setmelanotide ב-1 מ"ל תמייסה. חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוספת". ראה גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2.
קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אימסיברי מיועדת לטיפול בהשמנת יתר ולשליטה בתוחשת הרעב הקשורות למצבים הגנטיים המוכחים הבאים: תסמנונת ברדט-בידל (BBS), אובדן בתפקוד שני האללים של הגנים (POMC) או opiomelanocortin-PCS1, אובדן בתפקוד שני האללים של הגן (LEPR), leptin receptor, מבוגרים ובילדים בני 6 שנים ומעלה.

קובוצה רפואיית: טרם הוקצה

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל (סטמלנותיד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוספת").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- במהלך השימוש בתרופה עלולים להופיע סימנים להופיע סימנים או כתמים כהים על העור. ביצוע בדיקה לפני תחילת הטיפול יעזור לך לזהות סימנים חדשים המופיעים עם תחילת השימוש בתרופה.
- זקיפות ספונטניות הין שכיחות מאוד בקרב מטופלים המשתמשים בתרופה זו. אם הזקפה נמשכת מעל 4 שעות, אנא פנה לרופא בדחיפות. זקיפות ממושכות (פריאפיזם) שאינן מטופלות עלולות להפחית את יכולתך לקבל זקיפות בעתיד.

ילדים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 שנים.
לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 6 שנים.

בדיקות ומעקב

- לפני תחילת הטיפול ובמהלך הטיפול בתרופה על הרופא לבחון את עורך לסימנים או כתמים כהים.
- יש לעקב אחר ההשפעה על הירידה במשקל וכן אחר הגידלה וההתפתחות בילדים ובתבגרים.

אינטראקציות/תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקח, לקחת לאחרונה או אם אתה עשי ל开玩笑, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן להשתמש בתרופה ללא קשר למזון.

הירין והנקה
אם את בהירין, מניקה, חושבת שאתה בהירין או מתכוונת להרhot, היועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

הירין

השימוש בתרופה אינו מומלץ במהלך ההריון או במהלך הניסיון להריון, מכיוון שהתרופה לא נבדקה בנשים בהריון. רידה במשקל במהלך ההריון עלולה לפגוע בעובר.

הנקה

היווצי ברופא לפני השימוש בתרופה אם את מניקה. הרופא ישוחח איתך לגבי היתרונות והחסרונות של השימוש בתרופה בהנקה.

נigeria ו שימוש במכונות

לאMISSיברי לא אמורה להיות כל השפעה על יכולתך לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

בנזיל אלכוהול

תרופה זו מכילה 10 מ"ג בנזיל אלכוהול בכל 1 מ"ל תמישה, אשר שוו ערך ל-1 מ"ג עבור כל מ"ג במינון שלך. בנזיל אלכוהול עלול לגרום לתגובה אלרגית. אם את בהריון או מניקה היוציאי ברופא או ברוקח. בנזיל אלכוהול עלול להצטבר בגוףך ועשוי לגרום לתופעת לואוי המכונה "חמצת מטבולית".

אם אתה סובל ממחלה כבד או כלויות היוציאי ברופא או ברוקח. בנזיל אלכוהול עלול להצטבר בגוףך ולגרום לתופעת לואוי המכונה "חמצת מטבולית".

נתן

אMISSיברי מכילה פחות מ-23 מ"ג נתן במנה, כך שלמעשה נחשבת "נטולת נתן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אMISSיברי ניתנת צריכה תת עורית, פעם ביום, בתחילת היום. התרופה מיועדת לשימוש ארוך טווח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

אובדן בתפקוד שני האללים של הגנים pro-opiomelanocortin (POMC, PCSK1-I-1, leptin receptor (LEPR) או אובדן בתפקוד שני האללים של הגן

המינונים המומלצים מבוגרים ובתבגרים בני 12 שנים ומעלה הינם:

שבוע הטיפול	מינון ליום במ"ג	נפח להזרקה
שבועות 1-2	0.1 מ"ג פעם ביום	1 מ"ל פעם ביום
שבוע 3 ואילך	0.2 מ"ל פעם ביום	2 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואוי נסבלות	0.25 מ"ל פעם ביום	2.5 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואוי נסבלות	0.3 מ"ל פעם ביום	3 מ"ל פעם ביום

המינונים המומלצים בילדים בני 6 עד פחות מ-12 שנים הינם:

שבוע הטיפול	מינון ליום במ"ג	נפח להזרקה
שבועות 1-2	0.5 מ"ג פעם ביום	0.05 מ"ל פעם ביום
שבועות 3-5	1 מ"ג פעם ביום	0.1 מ"ל פעם ביום
שבוע 6 ואילך	2 מ"ג פעם ביום	0.2 מ"ל פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואוי נסבלות	2.5 מ"ג פעם ביום	0.25 מ"ל פעם ביום

במטופלים עם מחלת כלות קלה או מתונה, אין צורך בשינויים במשטר המינון.

המינונים המומלצים במתבגרים בני 12 עד 17 שנים עם מחלת כלות חמורה הינה:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מינון ליום במ"ג
שבועות 1-2	0.05 מ"ל פעם ביום	0.5 מ"ג פעם ביום
שבוע 3 ואילך (אם תופעות הלואין נסבלות)	0.1 מ"ל פעם ביום	1 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואין נסבלות	0.2 מ"ל פעם ביום	2 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואין נסבלות	0.25 מ"ל פעם ביום	2.5 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואין נסבלות	0.3 מ"ל פעם ביום	3 מ"ג פעם ביום

אם תופעות הלואין של המינון ההתחלתי 0.5 מ"ג אין נסבלות, המינון יופחת ל-0.25 מ"ג (0.025 מ"ל) פעם ביום.

אם תופעות הלואין של המינון 0.25 מ"ג פעם ביום נסבלות, תבוצע עלייה הדרגתית במינון.

לאחר קבלת המינון ההתחלתי, אם תופעות הלואין של המינון שאחורי אין נסבלות, המינון יופחת למינון הקודם שבטבלה. אם תופעות הלואין של המינון המופחת נסבלות, העלייה במינון תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואין של מינון 3 מ"ג אין נסבלות, המינון יופחת ל-2.5 מ"ג, ויהיה עליך להמשיך במינון זה.

המינונים המומלצים בילדים בני 6 עד פחות מ-12 שנים עם מחלת כלות חמורה הינה:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מינון ליום במ"ג
שבועות 1-2	0.025 מ"ל פעם ביום	0.25 מ"ג פעם ביום
שבועות 3-5 (אם תופעות הלואין נסבלות)	0.05 מ"ל פעם ביום	0.5 מ"ג פעם ביום
שבוע 6 ואילך (אם תופעות הלואין נסבלות)	0.1 מ"ל פעם ביום	1 מ"ג פעם ביום
אם המינון אינו מספיק ותופעות הלואין נסבלות	0.2 מ"ל פעם ביום	2 מ"ג פעם ביום

אם תופעות הלואין של המינון ההתחלתי 0.25 מ"ג אין נסבלות, הטיפול יופסק.

לאחר קבלת המינון ההתחלתי, אם תופעות הלואין של המינון שאחורי אין נסבלות, המינון יופחת למינון הקודם שבטבלה. אם תופעות הלואין של המינון המופחת נסבלות, העלייה הדרגתית במינון תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואין של המינון 2 מ"ג אין נסבלות, המינון יופחת ל-1 מ"ג, ויהיה עליך להמשיך במינון זה.

تسمונת ברדט-בידל

המינונים המומלצים במוגרים ובמתבגרים בני 16 שנים ומעלה הינה:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מינון ליום במ"ג
שבועות 1-2	0.2 מ"ל פעם ביום	2 מ"ג פעם ביום
שבוע 3 ואילך (אם תופעות הלואין נסבלות)	0.3 מ"ל פעם ביום	3 מ"ג פעם ביום

אם תופעות הלואין של המינון ההתחלתי 2 מ"ג אין נסבלות, המינון יופחת ל-1 מ"ג (0.1 מ"ל). אם תופעות הלואין של 1 מ"ג פעם ביום נסבלות, העלייה הדרגתית במינון תימשך בהתאם לטבלה.

לאחר קבלת המינון ההתחלתי, אם תופעות הלואין של המינון שאחורי אין נסבלות, המינון יופחת למינון הקודם

שבטבלה. אם תופעות הלואן של המין המופחת נסבלות, הعليיה הדרגתית במין תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואן של המין 3 מ"ג אינן נסבלות, המין יופחת ל-2 מ"ג, ויהיה עליך להמשיך במין זה.

המינים המומלצים בילדים ובמבוגרים בני 6 עד פחות מ-16 שנים הינם:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מיןין ליום במ"ג
שבוע 1	1 מ"ג פעם ביום	0.1 מ"ל פעם ביום
שבוע 2 (אם תופעות הלואן נסבלות)	2 מ"ג פעם ביום	0.2 מ"ל פעם ביום
שבוע 3 ואילך (אם תופעות הלואן נסבלות)	3 מ"ג פעם ביום	0.3 מ"ל פעם ביום

אם תופעות הלואן של המין התחלתי 1 מ"ג אינן נסבלות, המין יופחת ל-0.5 מ"ג (0.05 מ"ל). אם תופעות הלואן של 0.5 מ"ג נסבלות, הعليיה הדרגתית במין תימשך בהתאם לטבלה.

לאחר קבלת המין התחלתי, אם תופעות הלואן שאחורי אינן נסבלות, המין יופחת למין הקודם שבטבלה. אם תופעות הלואן של המין המופחת נסבלות, הعليיה הדרגתית במין תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואן של המין 3 מ"ג אינן נסבלות, המין יופחת ל-2 מ"ג, ויהיה עליך להמשיך במין זה.

במטופלים עם מחלת כליות קלה או מתונה, אין צורך בשינויים במשטר המין.

המינים המומלצים במבוגרים בני 16 עד 17 שנים עם מחלת כליות חמורה הינם:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מיןון ליום במ"ג
שבועות 1-2	0.5 מ"ג פעם ביום	0.05 מ"ל פעם ביום
שבוע 3 ואילך (אם תופעות הלואן נסבלות)	1 מ"ג פעם ביום	0.1 מ"ל פעם ביום
אם המין אינו מספיק ותופעות הלואן נסבלות	2 מ"ג פעם ביום	0.2 מ"ל פעם ביום
אם המין אינו מספיק ותופעות הלואן נסבלות	2.5 מ"ג פעם ביום	0.25 מ"ל פעם ביום
אם המין אינו מספיק ותופעות הלואן נסבלות	3 מ"ג פעם ביום	0.3 מ"ל פעם ביום

אם תופעות הלואן של המין התחלתי 0.5 מ"ג אינן נסבלות, המין יופחת ל-0.25 מ"ג (0.025 מ"ל). אם תופעות הלואן של 0.25 מ"ג פעם ביום נסבלות, הعليיה הדרגתית במין תימשך בהתאם לטבלה.

לאחר קבלת המין התחלתי, אם תופעות הלואן שאחורי אינן נסבלות, המין יופחת למין הקודם שבטבלה. אם תופעות הלואן של המין המופחת נסבלות, הعليיה הדרגתית במין תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואן של המין 3 מ"ג אינן נסבלות, המין יופחת ל-2.5 מ"ג, ויהיה עליך להמשיך במין זה.

המינים המומלצים בילדים ובמבוגרים בני 6 עד 16 שנים עם מחלת כליות חמורה הינם:

שבוע הטיפול	נפח להזרקה	מיןון ליום במ"ג
שבועות 1-2	0.25 מ"ג פעם ביום	0.025 מ"ל פעם ביום
שבועות 3-5 (אם תופעות הלואן נסבלות)	0.5 מ"ג פעם ביום	0.05 מ"ל פעם ביום
שבוע 6 ואילך (אם תופעות הלואן נסבלות)	1 מ"ג פעם ביום	0.1 מ"ל פעם ביום
אם המין אינו מספיק ותופעות הלואן נסבלות	2 מ"גactus; feasit; 0.2 מ"לactus; feasit; 0.2 מ"לactus; feasit;	0.2 מ"לactus; feasit;

אם תופעות הלואן של המיןון ההתחלתי 0.25 מ"ג אין נסבלות, הטיפול יופסק.

לאחר קבלת המיןון ההתחלתי, אם תופעות הלואן של המיןון שאחורי אין נסבלות, המיןון יופחת למיןון הקודם שבטבלה. אם תופעות הלואן של המיןון המופחת נסבלות, העלייה הדרגתית במיןון תימשך בהתאם לטבלה.

אם תופעות הלואן של המיןון 2 מ"ג אין נסבלות, המיןון יופחת ל-1 מ"ג, יהיה עלייר להמשיך במיןון זה.

הרופא יבדוק באופן קבוע את ייעילות התרופה. הרופא עשוי להתאים לר' את המיןון במידת הצורך.

הרופא עשוי להורות לר' להפסיק את הטיפול באימסיברי אם לא השגת ירידה של לפחות 5% ממשקל הגוף או 5% מה-BMI לאחר 12-16 שבועות של טיפול.

התרופה מיועדת לשימוש ארוך טווח. הפסקת השימוש או שימוש לא סדיר עלולים להוביל לחזרתם או להחמרהם של התסמינים. יש להקפיד להשתמש בתרופה בהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה על ידי הרופא או הרוקח. אין לעבר על המנה המומלצת.

כיצד להזירק אימסיברי

אימסיברי מזרקתו לשכבות השומן שמתוחת לעור, בבטן, הרוקח או האחות ינחו אותו כיצד לבצע זאת. ברגע שתרגיש בנוח להזירק לר' או לילדך, תוכל לבצע זאת בבתך.


יש להזירק אימסיברי בתחילת היום כדי למקסם את ההפקתה בתחשות הרעב כאשר ערבים. ניתן להשתמש באימסיברי ללא קשר לזמן הארוחות.

לפני הזירקת אימסיברי, אנא קרא בעין את ההוראות הבאות:

שלב 1 – התכוון להזרקה

- הוציא את הפריטים והנח אותם על משטח נקי ושטוח.


תזדקק לפריטים הבאים המסופקים בנפרד:



- שטוף את ידיך עם סבון ומים חמים.
- פתח את 2 מגבוני האלכוהול ופָד הגaza.

שלב 2 – בוחן את הבקבוקן


- בדוק את התוקף על גבי תווית הבקבוקן, אשר מופיע אחרי ".EXP."




- הנוזל צריך להיראות צלול עד צהוב.
- אל תשתמש בתרופה אם:
 - תאריך התפוגה חלף
 - הנוזל עכור
 - ישנו חלקיקים צפים בבקבוקן
 - מכסה הפלסטי של הבקבוקן החדש שבור או חסר
 - הבקבוקןओחן בטמפרטורה גבוהה מ-30°C

שלב 3 – הcn את הבקבוקן


- לפני השימוש הנה לבקבוקן להגיע לטמפרטורת החדר. ניתן לעשות זאת על ידי הוצאת הבקבוקן מהמקרר כ-15 דקות לפני ההזרקה או על ידי גלגול הבקבוקן בעדינות בין כפות הידיים במשך 60 שניות.
- אל תשתמש במים חמימים, מקרוגל או מכשיר אחר על מנת לחםם את הבקבוקן
- אל תנער את הבקבוקן



- אם אתה משתמש בבקבוקן חדש, הסר את מכסה הפלסטי והשלך אותו לפחות לפח האשפה.




- נקה את החלק העליון של הפקק האפור עם מגבן אלכוהול. זרוק את מגבן האלכוהול המשומש לפחות לאשפה.
- אין להסיר את פקק הבקבוקן



שלב 4 – הכן את המזרק


- עבור מינון של 0.25 מ"ג (0.025 מ"ג או 2.5 יחידות), השתמש במזרק של 0.3 מ"ל עם 0.5 מ"ל (חצי יחידת רוח ועובי מחט של 6 עד 31 מ"מ, המתאים לזריקה לתissue).

מנה של 0.25 מ"ג = 0.025 מ"ל או 2.5 יחידות (можג כשותות בין המספרים)




- עבור מינון של 0.5 מ"ג עד 3 מ"ג (0.05 מ"ל עד 0.3 מ"ל), השתמש במזרק של 1 מ"ל עם 0.01 מ"ל רוח מינון ועובי מחט של 6 עד 28 עד 29 עד 31 מ"מ, המתאים לזריקה לתissue.

מנה של 0.5 מ"ג = 0.05 מ"ל




מנה של 2 מ"ג = 0.2 מ"ל

מנה של 1 מ"ג = 0.1 מ"ל




מנה של 3 מ"ג = 0.3 מ"ל




- השאר את המכסה המגן על המחט במקומו, ומשור לאחריו את הבוכנה כדי למלא את המזרק באוור השווה לכמות התרופה הנדרשת להזרקה.




- הסר את מכסה המגן מהמזרק. משור את המכסה ישר והרחק מגוף.
- הנח את הבקבוקן זקוֹף על משטח ישר. החזק את המזרק ומיקם אותו ישירות מעל הבקבוקן.
- החדר את המחט פנימה בצורה ישרה למרცד הפוך האפור של הבקבוקן.



- דחוף את הבוכנה כלפי מטה כדי להזריק את האויר מהمزרק לתוך הבקבוקון.
- מבלי להסיר את המחט, הופך בעדינות את הבקבוקון.
- וודא שקצת המחט נמצא במלואו בנזול התרופה ולא באויר שמעל הנוזל.



- משור לאתת הבוכנה לאחר כדילם את המזרק בכמות התרופה הנדרשת למנה שלן.
- בעת מדידת המנה, הקפד לקרוא את היחידות המתחילה מהקצת שקרוב לפקק הגומי השחור שבמזרק.
- שמור את המחט בבקבוקון ובודק אם יש בוועות אויר גדולות במזרק.




- אם אתה מבחין בוועות אויר יש להוציאו ממזרק, באופן הבא:
- הקש בעדינות עם האצבע על צד המזרק כדי להזיז את בוועת האויר לחלק העליון של המזרק
- רוקן את תוכלת המזרק בחזרה לתוך הבקבוקון
- בצע את השלבים לעיל כדי למלא שוב את המזרק. שור את הבוכנה לאט יותר הפעם וודא שקצת המחט נמצא במלואו בנזול שבבקבוקון כדי להפחית את הסיכון לבועות אויר.
- ברגע שאין יותר בוועות אויר גדולים במזרק, הניח את הבקבוקון באופן זקופה על משטח קשיח.
- החזק את הבקבוקון בידי אחת ואת המזרק בין קצות האצבעות של היד השנייה. שור את המחט בצורה ישירה למעלה, החוצה מהבקבוקון.



- הנח את המזרק על המשטח הקשיח, וודא שהמחט לא נוגעת במשטח. אין להלביש חזרה את מכסה המחט.

שלב 5 – הכנן את אתר ההזרקה


- בחר את האיזור בבטן עבור ההזרקה.
- שנה את אתר ההזרקה בכל יום.
- וודא שאזור ההזרקה נמצא למרחק של לפחות 5 ס"מ מהטבור.
- אין להזריק לאזורי אדום, נפוח או מגורה.




- נקה בתנוונות מעגליות את אתר ההזרקה שבחרת עם מגבן האלכוהול השני.
- הנח לעור להתייבש כ-10 דקות.
- אין לגעת, לא Orr או לנשוף על האזור הנקי.

שלב 6 – הזרקת אימוסיברי


- מיקם את המזרק בין האగודל והאצבע המורה של היד אותה כתוב.
- ביד השנייה, צבוט בעדרינות כ-5 ס"מ של העור בין האגודל והאצבע המורה.
- וודא שאתה מחזיק את קפל העור עד להשלמת ההזרקה.



- אחיז בחלקו האמצעי של המזרק בזווית של 90° לעור שלך ודחוף את המחט ישר לתוך אתר ההזרקה.
- עלייך לוודא שהמחט נכנסת פנימה במלואה.
- אין להחזיק או לדחוף את הבוכנה בזמן החדרת המחט.



- החזק את המזרק בין האגודל והאצבע האמצעית והשתמש באצבע המורה כדי לדחוף באיטיות את הבוכנה על מנת להזירק את התורופה.



- ספור עד 5 לאחר הזרקת אימוסיברי כדי לוודא שכל התרופה יצא מהمزרק. שחרר את העור הצבוט ומשורט את המחת החוצה. השתמש בפְּד גָּזָה כדי להפעיל בעידנות לחץ על אתר ההזרקה ולאחר מכן זרוק את פְּד הגaza לפח האשפפה.

זרוק את המזרק המשומש לפחות המחתים. אין לזרוק לפחות האשפפה. אם נשארה תרופה בבקבוקון, החזר את הבקבוקון חוזרת לקרטן ואחסן במקדר או במקום בטוח בטמפרטורה נמוכה מ- 30°C עד לקבלת המנה הבא.

אם אתה או ילך השתמשת בטיעות במינון גבוה יותר או אם בטיעות בלבד מלבד מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להזיריק תרופה זו בזמן המועד

אם שוחחת להזכיר את התהropolis, דילג על המנה והזמין את המנה הבאה בזמן הרגיל. אל תשתמש במנה כפולת כדי לפרט על מנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרכופה

אם תפסיק להשתמש בתהופה זו, תחשות הרעב עלולה לחזור והירידה במשקל עשויה להיפסק.

יש להתמיד בטיפול כפוי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתreatmentה ללא התיעצות עם הרופא, מאחר וזה יכול לגרום לירידה בהצלחת הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהנרג נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרג זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימוסיברי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות לוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לואדי שכיחות מואוד (תופעות שמויפות ביותר ממשתמש אחד מעשרה)

- אזרורים או כתמים כהים על העיר
- כאב, חבורות או דלקת (אדומותיות /או נפיחות) באטר הזרקה
- הרגשה כללית רעה (הקאות)
- כאב ראש
- זקפת מין ספונטנית

תופעות לואדי שכיחות (תופעות שמויפות ב-10-1 משתמשים מתוך 100)

- עור יבש, אדום או מגדר
- כאב
- הזעה מוגברת
- אזרורים או כתמים דהויים על העיר
- געעים על העיר
- נשירת שיער
- עייפות
- חולשה
- יושב בפה
- קשיי עיכול
- שלשלולים
- עצירות
- כאב בטן
- סחרחות מוגברות
- זקפות מוגברות
- בעיות שינה
- הרגשות דכ dozen
- שינוי בగירוי המיני
- חشك מיני מוגבר
- נגע בעור
- כאבגב
- התכווציות שרירים
- כאבים בידים או ברגליים
- גלי חום
- ורטיאגו

תופעות לואדי שאין שכיחות (תופעות שמויפות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- כתמים חומים או נמשים על העיר
- אדומותיות של העיר
- פריחה
- קווים או פסים על העיר
- שינוי בצבע שיער
- בליטה על העיר
- דלקת בעור
- שינוייםocab בצביעון או חריצים בצביעון
- כאבים בחזה
- רגישות לחום או לקור
- גירוד מסביב למקום הזרקה
- צמרמות
- תחששת קור
- הרגשות חום
- חניכיים דהוויות
- נפיחות בבטן
- עלייה בכמויות הרוק
- גזים
- צרבת

- ישנוויות
- עליה ברגשות הראייה, קול, מגע וריח
- כאב ראש מיגרנוטי
- איבוד או שינוי בחוש הריח
- הפרעות בחוש הטעם
- חרדה
- שינוי במצב הרוח
- הפרעות בשפייה
- חוסר יכולת נשית להשיג או לשמור על עוררות מינית
- אי נוחות או רגשות באיבר המין
- ירידה בחשך המין
- הפרעה באיבר המין נשית
- מצב רוח מדויק
- הפרעת שינה
- מגע בעין
- סיטוטים
- שומה שטוחה, צבעונית על העור
- כאבי פרקים
- פיהוקים
- שיעול
- נזלת
- כאבים בשירים או בעצמות החזה
- שינוי לבון העיניים
- הצהבהה של העיניים

אם הופעה תופעת לואו, אם אחת מתופעות הלואו מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לואו שלא צוינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לואו

ניתן לדוח על תופעות לואו למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואו" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לואו, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופة?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווות ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והבקבוקן. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן בקורור (2°C-8°C). אין להקפי. ניתן לאחסן בבקבוקנים שלא נפתחו בטמפרטורת החדר, שאינה עולה על 30°C, במשך 30 ימים או עד תאריך התפוגה, המוקדם מביניהם. יש לאחסן את כל הבקבוקונים (גם את אלו שנפתחו) בקרטון המקורי כדי להגן עליהם מפני אוור.

ח' מדף לאחר פתיחה ראשונה

ניתן לשמר בטמפרטורה שאינה עולה על 30°C במשך 28 ימים או עד לתאריך התפוגה, המוקדם מביניהם.

אין להשתמש בתרופה אם הבקבוק נחשף לטמפרטורה גבוהה מ-30°C.
אין להשתמש בתרופה אם הנוזל עכור או אם אתה מבחין בחלקיים צפים.

יש להשתמש תמיד בمزרק חדש עבור כל הזרקה.

אין להשליך תרופות לכירור או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאין משתמש בהן עוד. צעדים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

mPEG-2000-DSPE, Mannitol, Benzyl alcohol, Carmellose sodium, Phenol, Disodium edetate, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide and Water for injections.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה

אימס'ברי הינה תמיסה חסרת צבע עד צהבהבה. תרופה זו מגיעה בבקבוקונים שקופים מזכוכית עם פקק ומכסה המכילים 1 מ"ל של תמיסה עבור הזרקה.

שם בעל הרישום וכתובתו

מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10, פתח תקווה

שם היצרן וכתובתו

Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Radarweg 29, 1043NX Amsterdam, Netherlands

עלון זה נערך ב-23/08 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99-37060-99-171-28

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.