

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בימצלאס 160 מ"ג/מ"ל

תמיישה להזרקה תת-עורית

החומר הפעיל:

כל עט מוקן להזרקה מכיל 160 מ"ג בימקיזומאב (bimekizumab) ב-1 מ"ל.
לשימוש החומרים הבלתי פעילים בתכשיר, אנא ראה פרק 6: "מיעדנו נספ".

קראו בעיון את העalon עד סוףו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזין להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

בימצלאס מיועד לטיפול בספקת (פסורייזיס) רובדיות ביןנית עד חמורה, במקרים מסוימים לטיפול סיסטי.

קבוצה רפואיית: מDACI מרכיב חיסון, מעכבי אינטראולוקין.

בימקיזומאב פועל על ידי הפחתת פעילות שני חלבונים הנקראים A7-IL-1α ו-F7-IL-1α, המעורבים ביצירת דלקת.
קיימות רמות גבוהות יותר של חלבונים אלה במחלות דלקתיות כמו פסורייזיס.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לဓורר הפעיל בימקיזומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
(ראה סעיף 6).
- יש לך זיהום, כולל שחפת (tuberculosis), שלדעת הרופא שלך הינו ממשמעו.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בימצלאס, ספר לרופא אם:

- יש לך זיהום או שאתה סובל מழיהומים חוזרים.
- קיבלת לאחרונה או שאתה מתכוון לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוימים (חיסונים חיים) במהלך השימוש בימצלאס.
- הייתה לך אי פעם שחפת.
- הייתה לך אי פעם מחלת מעיים דלקטיבית (קרוחן או קוליטיס כיבית).

מחלת מעיים דלקטיבית (קרוחן או קוליטיס כיבית)

הפסק להשתמש בימצלאס וספר לרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי באופן מיידי אם אתה מבחין בدم בצוואה, התכווצויות בטניות, כאב, שלשול או ירידת במשקל. אלו עשויים להיות סימנים למחלת מעיים דלקטיבית (קרוחן או קוליטיס כיבית) חדשה או החמרה שלה.

שים לב לדלקת ותגובהות אלרגיות

בימצלאס יכול לעתים נדירות לגרום לזרמים חמורים. שוחח עם הרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי **בأופן מיידי** אם אתה מבחין בסימנים כלשהם של דלקת חמורה. סימנים אלה מפורטים תחת "תופעות לוואי חמורות" בסעיף 4.

בימצלאס עשוי לגרום לתגובהות אלרגיות חריפות. שוחח עם הרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי **בأופן מיידי** אם אתה מבחין בסימנים כלשהם של תגובה אלרגית חריפה. סימנים אלה עשויים לכלול:

- קושי בನשימה או בבליעה.
- לחץ דם נמוך, שיכל לגרום לך לסתורחות.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון.
- גרד חמוץ של העור, המלווה בפריחה אדומה או בגען עור מורמיים.

ילדיים וمتבגרים

אין לתת תרופה זו לילדיים וצעירים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ומתבגרים.

אינטראקטיות/ תגבות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:

אם את בהריון, חשבת שאט עשויה להיות בהריון או מתכנתת להרות, היועצי עם הרופא לפני שימוש בתרופה. רצוי להימנע משימוש ביבמולקס בהריון. זאת כיוון שלא ידוע כיצד תרופה זו תשפיע על התינוק.

אם את אישת בגיל הפוריות, שעשויה להרות, עליך להשתמש באמצעות מנעה במהלך השימוש בתרופה זו ובמשך 17 שבועות לפחות לאחר המנה האחורה של בימולקס.

אם את מניקה או מתכנתת להניק, שוחחי עם הרופא שלך לפני שימוש בתרופה. את הרופא שלך צריכים להחליט אם את יכולה להניק או להשתמש ביבמולקס.

גהיגת ושימוש במכונות:

לבימולקס אין או יש השפעה זניחה על יכולת הנהוג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה, ככלומר הינה למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל, הניתן כזריקה מתחת לעור שלך (זריקה תת-עורית) הוא כדלהלן:

- 320 מ"ג (ניתן באמצעות שני עיטים מוכנים להזרקה, המכילים 160 מ"ג כל אחד) בשבועות 0, 4, 8, 12, 16.
- משבוע 16, תשתמש ב-320 מ"ג (שני עיטים מוכנים להזרקה, המכילים 160 מ"ג כל אחד) כל 8 שבועות. אם אתה שוקל מעל ל-120 ק"ג, הרופא שלך עשוי להמליץ להמשיך במשך 4 שבועות.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אתה והרופא שלך או האחותות תחלתו האם אתה אמר להזריק תרופה זו בעצמך. אל תזריק תרופה זו אלא אם קיבלת הדריכה על ידי איש צוות רפואי. גם מטפל יכול להזריק לך לאחר קבלת הדריכה.

קרא את 'הוראות השימוש' בסוף עליון זה לפני שתזריק בימולקס בעט מוקן להזרקה לעצמך.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

ספר לרופא שלך אם השתמשת ביוטר בימולקס מהנדרש או שהזרקת את המנה שלך מוקדם מהנדרש.

אם שכחת ליטול את התרופה

שוחח עם הרופא אם שכחת להזריק מנה של בימולקס.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

שוחח עם הרופא לפני שתפסיק להשתמש בבימולקן. אם תפסיק את הטיפול, תסמיini הפסוריאזיס שלך עשויים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנץ זkok להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בבימולקן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואו. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציננה בעלהן, עלייך להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי חמורות

ספר לרופא שלך או פנה לקבלת סיוע רפואי באופן מיידי אם מופיעה אחת מתופעות הלואו הבאות:

זהום חמוץ אפשרי - התסמינים עשויים לכלול:

- חום, תסמיינים דמוני שפעת, הצעות לילה.
- תחששות עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו חולף.
- עור חם, אדום וכואב למגע, או פריחת כואבת בעור עם שלפוחיות.

הרופא שלך יחליט האם תוכל להמשיך להשתמש בבימולקן.

תופעות לוואי אחרות

ספר לרופא שלך, לרוקח או לאחות אם אתה חווה אחת אחת מתופעות הלואו הבאות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שימושיות ביותר המשמש אחד מעשרה

- זהום בדרכי הנשימה העליונות המלאה בתסמיינים כגון כאב גרון וגודש באף.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שימושיות ב-10-1 משמשים מתוך 100

- פטריה בפה או בגרון המלאה בתסמיינים כמו כתמים לבנים או צהובים; אדמדמויות או כאב בגרון וכואב בבליעה.

זהום פטריאטי בעור, למשל פטרת כף הרגל בין אצבעות הרגליים.
זהומים באוזן.

פציע קור (זהומי הרופס סימפלקס).

דלקת הקיבה והמעיים (gastroenteritis).

זקיקי שער דלקתיים שעשוים להיראות כמו פצעונים.

כאב ראש.

עור יבש ומגרד או פריחה דמוית אקזמה המלאה לעיתים בעור נפוח ואדמוני (דרמטיטיס-דלקת בעור).
אקנה.

אדמדמויות, כאב או נפיחות באתר ההזרקה.

תחששות עייפות.

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) – תופעות שימושיות ב-10-1 משמשים מתוך 1000

רמות נמוכות של תא דם לבנים (נויטרופניה).

זהומים פטריאטיים בעור וברקמות ריריות (כולל קנדידה בוושט).

הפרשה מהעין המלאה בגוף, אדמדמויות ונפיחות (דלקת הלחמית).

דם בצואה, התכווצויות בטניות וכואב, שלשול או ירידה במשקיל (סימנים לביעות במעיים).

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה קישור "דוח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> ועל ידי שליחת דואר אלקטרוני ליחידה לבטיחות מטופלים של בעל הרישום ב: drugsafety@neopharmgroup.com.

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנוע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמן הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

יש לאחסן במקror (8°C – 2°C). אין להקפייה.

יש לשמר את העט המוכן להזרקה באירוע הקרטון החיצונית על מנת להגן מאור.

יש לאחסן את העט המוכן להזרקה בטמפרטורת החדר (מתחת ל-25°C) למשך עד 25 ימים לכל היוטר תוך הגנה מאור. לאחר הוצאה מהמקror ואחסן בתנאים אלה, יש להיפטר מהתקשר לאחר 25 ימים או עד לתאריך התפוגה המוטבע על האריזה, המוקדם מבין השניים. יש מקום על האריזה בו תוכל לכתוב את התאריך שבו הוצאה מהמקror.

אין להשליך תרופות לביב או לפחות אשפה ביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד יש להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

glycine, sodium acetate trihydrate, glacial acetic acid, polysorbate 80 and water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

בימזלקס היא תמייסה צולחה עד מעט עכורה, חסרת צבע עד בעלת צבע צהוב-חום בהיר. מגעה בתוך עט מוכן להזרקה לשימוש חד פעמי.

בימזלקס מצוי בamarils המכילים 2 פעמיים מוכנים להזרקה.

יצורן: יוסיבי פארמה A.S, Braine l'Alleud, Belgia.

בעל רישום: ניאופרム בע"מ, רחוב השילוח 6, ת.ד 7063, פתח-תקווה 4917001.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-172-46-37409-00

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.


לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Bimzelx sol for inj PIL vr 02A

הוראות שימוש

קרא את כל ההוראות של להלן לפני השימוש בימצלאקס.

mbut כולל על בימצלאקס בעט מוקן להזרקה (ראה איור א):



מידע חשוב:

- איש הוצאות הרפואי יראה לך כיצד להכין ולהזריק בימצלאקס תוך שימוש בעט מוקן להזרקה.
- אל תזריק לעצמך או למשחו אחר עד שיש לך כיצד להזריק בימצלאקס בצורה הנכונה.
- אתה ו/או המטפל שלך צריכים לזכור את ההוראות שימוש אלה לפני כל שימוש בימצלאקס.
- צור קשר עם איש צוות רפואי אם יש לך או למטפל שלך שאלות כלשון בנוגע לאופן הזרקת בימצלאקס בצורה הנכונה.
- כדי לקבל את המנה המלאה שלך, תצטרכן להשתמש ב-2 עטי בימצלאקס מוכנים להזרקה, אחד אחריו השני.

אל תשימוש בתרופה זו והחדר אותה לבית המrankחת אם:

- תאריך התפוגה (EXP) עבר.
- סוג אריזת הקרטון שבור.
- העט המוקן להזרקה נפל או נראה שבור.
- הנזול או פעם הוקפא (אפילו אם אפשר).

להזרקה נוחה יותר: הוציא את העטים המוכנים להזרקה מהמקרר והנח אותם על משטח ישיר בטמפרטורת החדר למשך **30 עד 45 דקות** לפני ההזרקה.

- אין לחםם בכל דרך אחרת, למשל במיקרוגל או במים חמים.
- אין לנגר את העטים המוכנים לשימוש.
- אין להוריד את המכסה מהעטים המוכנים להזרקה עד אשר אתה מוקן להזריק.

עקבות אחר השלבים המצוינים מטה בכל פעם שאתה משתמש בביימצלאקס.

שלב 1: הכנה להזריקות שלך

הנח את הפריטים הבאים על משטח עבודה נקי, ישר ומואר היטב, למשל שולחן:


- 2 עטי בימצלאקס מוכנים להזרקה
- תצטרכן גם (לא כולל באריזת הקרטון):
 - 2 פדי אלכוהול
 - 2 כדורי צמר גפן נקיים
- 1 מיליל לפסולת חדה. ראה "השלכת עט מוקן להזרקה בימצלאקס לאחר השימוש" בסוף ההוראות שימוש אלה.

התחל עם עט מוקן להזרקה אחד עברו הזריקה הראשונה. למנה מלאה, אתה זקוק ל-2 זריות, אחת אחרי השניה.

שלב 2: בחר את אתר ההזרקה והכן את הזריקה שלן

2א: בחר את אתר ההזרקה שלן

- המקומות בהם תוכל לבחור עבור ההזרקה הם:
 - הבطن שלך או הירך (ראה איור ב).
 - ניתן גם להשתמש בחלק האחורי של הזרוע שלך אם מטפל נוטן לך את הזריקה (ראה איור ג).



בطن או ירך
החלק האחורי
של הזרוע

- אין להזrik לתוך אזורים בהם העור עדין, חבול, אדום, קשקי, קשה או אזורים עם צלקות או סימני מתיחה.
- אין להזrik במרחק של עד 5 ס"מ ממרכז הבطن (טבור).
- יש להשתמש במקומות שונים בכל זריקה. אין להשתמש באותו מקום להזרקה פעמיים ברצף.


2ב: שטוף את ידיך היטב עם סבון ומים ויבש באמצעות מגבת נקייה

2ג: הכן את העור שלן

- נקה את אזור ההזרקה באמצעות פד אלכוהול. הנה לאזרור להתייבש לחלוטי. אין לגעת שוב באזור הנקי לפני ההזרקה.

2ד: בדוק את העט המוכן להזרקה (ראה איור ד)


- וודא שהשם בימצלאס ותאריך התפוגה מופיעים על התווית.
- בוחן את התרופה דרך חלונית התצוגה. בימצלאס היא תמייה צולולה עד מעט עכורה, חסרת צבע עד בעלת צבע צהוב-חום בהיר. אתה עשוי לראות בועות אויר בנזול. זה תקין.
- אין להשתמש בימצלאס עט מוקן להזרקה אם התרופה עכורה,壬ינטה צבע אוו יש בה חלקיקים.




שלב 3: הזרק בימצלאות

3א: הסר את מכסה העט המוון להזרקה

- אחוז בעט המוון להזרקה בחזקה סיבב ידית האחיזה עם יד אחת. משור את המכסה בצורה ישירה הרחק מהעט המוון להזרקה באמצעות היד השנייה (ראה איור ה). למרות שאתה לא יכול לראות קצת מהחט, היאicutת נחשפה.
- אין לגעת במגן המחט או להחזיר את המכסה. זאת כיון שהדבר עשוי להפעיל את העט המוון להזרקה ואתה עשוי לדקור את עצםך.



3ב: אחוז את העט המוון להזרקה בזווית של 90 מעלות לאותו ההזרקה הנוכחי (ראה איור ו)



- 3ג: מיקם את העט המוון להזרקה באורה ישרה כנגד העור, ואז לחץ בחזקה את העט המוון להזרקה כלפי מטה כנגד העור שלך.**
- תשמע צליל "קליק". ההזרקה תחל לאחר הישמעו ה"קליק" הראשון (ראה איור ז).
- אין להרים את העט המוון להזרקה הרחק מהעור.



- 3ד: המשך להחזיק את העט המוון להזרקה במקום וללחוץ בחזקה כנגד העור שלך**
- תשמע "קליק" שני בטור כ-15 שניות לאחר הקлик הראשון.
 - הקлик השני אומר לך של התروفה הזרקה והזרקה הסתיימה. תוכל לראות את הסמן בעל הצבע הצהוב ממלא את חלונית התצוגה (ראה איור ח).




3ה: הסר את העט המוכן להזרקה על-ידי משיכתו הזרירה ישירות מעלה הרוחק מהעור שלך. מגן המחתicas אוטומטית את המחת

- ליחז כדור צמר גוף יבש על פני אתר ההזרקה למשך מספר שניות. אין לשפשף את אתר ההזרקה. יתכן שתוראה דימום קל או טיפת נוזל. זה תקין. תוכל לססות את אתר ההזרקה באמצעות אגד מדבק קטן, אם יש צורך.

שלב 4: השלחת עט מוכן להזרקה בימדליך לאחר השימוש

הנח את העט המוכן להזרקה המשמש במיל לפסולת חדה מיד לאחר השימוש (ראה איור ט).



עבור הזריקה השנייה של המנה שנרשמה לך, השתמש בעט **בימדליך** מוכן להזרקה חדש, וחזרו על **שלבים 2 עד 4**.

הקפיד לבחור אתר הזרקה חדש עבור הזריקה השנייה שלך.