

تاريم 50؛ 100

أقراص مطالية

التركيب:

يحتوي كل قرص مطالي من تاريم 50 على:

سيلدينافيل (على شكل سيرات) 50 ملغم

يحتوي كل قرص مطالي من تاريم 100 على:

سيلدينافيل (على شكل سيرات) 100 ملغم

Sildenafil (as citrate) 50 mg

Sildenafil (as citrate) 100 mg

للقائمة الماء غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر أنظر

الفقرة 2، بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة

6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي

هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفر لديك أسئلة

إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم

حتى ولو بدا لك أن حاليه الطبي مشابهة لحالتك.

الدواء مخصوص للذكور فوق عمر 18 سنة. الدواء غير مخصوص للنساء.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج العجز الجنسي - إضطرابات في انتصاب العضو الذكري.

الخصوبة العلاجية:

متريط الإنزيم PDE5. يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية وبالتالي

إلى تحسين تدفق الدم إلى العضو الذكري عند الإثارة الجنسية.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليجي) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء - انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

- كنت تتناول بشكل متقطع أو بكل متواصل مستحضرات التترات الخصوصية، التتراتيات العضوية أو مانحات أو كسبيد التتريل، مثل نتريت الأميل، بأي شكل كان (مثل أدوية معينة لعلاج الذبحة الصدرية، angina pectoris).

- كنت تتناول في نفس الوقت دواء من مجموعة منشطات الإنزيم riociguat أو guanylate cyclase مثل ريوسيچوات (guanylate cyclase).

- لعلاج فرط ضغط الدم الرئوي).

- كنت تعاني من مرض ضغط في الكبد أو القلب.

- إجتازت أدوية أخرى مسكنة أو نوبية قلبية، أو إذا كنت تعاني من إنخفاض في ضغط الدم.

- أدوية تسمى نيترات، لأن المشاركة مع أدوية من هذا النوع قد يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم، استشر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية من هذا النوع التي تستعمل عادة لعلاج الذبحة الصدرية (الذبحة الصدرية، آلم في الصدر).

- أدوية تسمى مانحات أكسيد النيتروكيل مثل ترتير الأميل، لأن هذه المشاركة هي أيضاً قد تؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم.

- أدوية أخرى (بالاعطاء الفموي أو الموضعي) لعلاج العجز الجنسي (ضعف الإنتصاب) - المشاركة مع تاريم ممنوعة.

- ريوسيچوات (riociguat) أو أدوية أخرى لعلاج ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية في الرئة - المشاركة مع تاريم ممنوعة.

أدوية إضافية

- سيميتينيين (الخفض حموضة المعدة)، كيتوكوتازول (مضاد للقطريات)، إيتروسيبيين (مضاد حيوي).

- أدوية لعلاج الإيدز من نوع مثبطات HIV بروتيات (مثل ساكوبينافير، ريتونافير) لأنها قد ترفع تركيز تاريم في الدم. من الجائز أن يصف لك الطبيب المقدار الدوائي الأقصى.

- أدوية من فصيلة حاجبات الألفا مثل دوكسازوسين (العلاج ارتفاع ضغط الدم أو لعلاج تضخم غدة البروستات) - خشية إنخفاض ضغط الدم، إن شاركت هذا الدواء مع تاريم قد يؤدي إلى الشعور بدوخة أو دوار، جراء إنخفاض ضغط الدم وذلك عند الجلوس أو الوقوف بسرعة. غالباً يحدث ذلك خلال الـ 4 ساعات التي تلي تناول تاريم. من الجائز أن يصف لك الطبيب المقدار الدوائي الأقصى.

- أدوية تحتوي على ساكوبينافيريل / فالسارتان التي تستعمل لعلاج قصور القلب.

استعمال الدواء والطعام

- بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام، لكن بعد تناول وجبة دسمة فقد يحصل تأثير في بدء تأثير الدواء.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

- قد يعرقل إستهلاك الكحول مؤقتاً من حدوث إنتحاب للعضو الذكري؛ للإستفادة القصوى من الدواء، يوصى بعدم إستهلاك كميات كبيرة من الكحول قبل تناول الدواء.

الحمل والإرضاع

- هذا الدواء غير مخصوص للإستعمال لدى النساء.

السياحة وإستعمال الماكولات

- قد يؤدي تاريم إلى دوار ويؤثر على الرؤية. عليك الإنتباه حول كيفية إستجابتكم للدواء وذلك قبل السياحة أو تشغيل الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على صوديوم. يحتوي تاريم على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) لكل قرص وبالتالي يعتبر "خال من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب، عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: قرص واحد حوالي ساعة قبل ممارسة علاقة جنسية.

- كنت تعاني من مرض وراثي نادر معين في العينين (مثلاً إلتهاب الشبكية الصباغي Retinitis pigmentosa)
- كنت تعاني أو عانت في الماضي من فقدان الرؤية بسبب Non-arteric anterior ischemic optic neuropathy (NAION).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ تاريم، إحل للطبيب إذا:

- كنت تعاني من قصر الدم المنجبي sickle cell anemia أو من مرض نخاع المطر، ورم نفوي متعدد (سرطان في نخاع المطر، multiple myeloma) أو من إبيضاض الدم (سرطان خلايا الدم).

- كنت تعاني من تشوہ في العضو الذكري (القضيب) أو من مرض پپرونی (انحناء القضيب).

- كنت تعاني من مشاكل في قلبك، يفحص الطبيب إذا كان قلبك يتأدرأ على تحمل العباءة الإضافية المنشورة بممارسة العلاقات الجنسية.

- كنت تعاني من قرحة في المعدة مثل مشاكل نزفية مثل مرض الناعور.

- كنت تعاني من ضعف مقاوم في الرؤية أو فقدان للرؤية: توقف عن العلاج وتوجه للطبيب حالاً.

- لا يجوز تناول تاريم إذا كنت لا تعاني من عجز جنسي (ضعف الإنتصاب).

- لا يجوز تناول تاريم إذا كنت إمراة.

مرضى الكلية أو الكبد

- إذا كنت تعاني من مرض في الكلية أو الكبد، فمن الجائز أن يقرر الطبيب إعطاء مقدار دوائي أخفض من أجلك.

الأطفال والمرأة حاقدون

- الدواء غير مخصوص للإستعمال لمن هم دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

- قبل تناول الدواء يتوجب على المتعالج إجتناب فحص طبي شامل، للتأكد من أن العلاج مناسب له وبيانه لا يعاني من مشاكل قلبية وعائية (cardiovascular)، لأن النشاط الجنسي أيضاً بحد ذاته منوط ببنية معينة من الجهد القلبي.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

- يجب على الشخص الذي تناول تاريم وإحتقام لتفقي علاج طبي أيًا كان بإلاع الطاقم الطبي المعالج فوراً بأنه تناول هذا الدواء وذلك لتجنب حالة يتم فيها إعطاء علاج بنترات أو بموسعة أخرى للأوعية الدموية.

- إذا كنت تتناول، أو إذا استعملت مؤخرأً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

- بالأخص إذا كنت تتناول:

- إن شاركت تاريم مع أدوية أخرى قد يسبب ضرباً، خاصة الأدوية المخصصة لعلاج آلم الصدر (نبطة صدرية، angina pectoris).

- في حال حدوث حالة طبية طارئة، عليك إطلاع الطبيب، الممرضة / أو الصيدلي بأنك تناولت تاريم وبموعد تناوله. لا يجوز إستعمال تاريم بمشاركة أدوية أخرى إلا إذا أصدر لك الطبيب تعليمات بأنه يمكن ذلك.

- لا يجوز إستعمال تاريم إذا كنت تتناول الأدوية التالية:





لا يجوز تناول أكثر من قرص واحد في اليوم. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يساعدك تاريم على تحقيق إنتصاف للعضو الذكري فقط في حال وجود إثارة جنسية. المدة الزمنية التي يستغرقها الدواء لكي يبدأ عمله تختلف من شخص لآخر وعادة تستغرق حوالي نصف ساعة - ساعة. من الجائز أن تكتشف بأنه يستغرق وقتاً أطول لكي يبدأ الدواء عمله وذلك إذا تم تناوله معوجبة دسمة.

إذا شعرت بأن الدواء أضاعف أو أقوى مما ينبغي بالنسبة لك استشر الطبيب أو الصيدلي.

إذا لم يساعدك تاريم على تحقيق إنتصاف للعضو الذكري أو أن الإنتصاف الذي تم تحقيقه لا يستمر وقتاً كافياً لإتمام علاقة جنسية كاملة، استشر الطبيب.

يجب بلع الدواء من القليل من الماء.

تاريم 50 - لا يجوز شطر القرص

تاريم 100 - بإمكان شطر القرص للاستعمال الفوري عند الحاجة.

لا تتوفر معلومات بخصوص مضاعف أو سحق القرص.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء مملأ.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً، فمن الجائز أن تعاني من تفاقم في الأعراض الجانبية وفي شدتها. مقدار دوائية أكبر من 100 ملغ لا تزيد من نجاعة الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تاريم قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستخدمين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية التي بلغ عنها بإستعمال تاريم هي عادة طفيفة حتى متعدلة وتستمر لوقت قصير.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال حدوث:

• رد فعل تحسسي - غير شائع (من شأنه أن يؤثر على حتى 1 من بين 1000 شخص):

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها بعد التسويق: بلغ عن ذبحة صدرية غير مستقرة، موت مفاجئ في أيديان نادرة. غالباً، لكن ليس كافة الرجال الذين عانوا من هذه الأعراض عانوا من مشكلة كلبية قبل تناول هذا الدواء، لم يكن التحديد فيما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين هذه الأعراض وإستعمال الدواء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• بلغ عن إنتصاف متواصل وأحياناً يتراافق بالآم بعد إستعمال تاريم (شيوخ نادراً). إذا قاسيت من إنتصاف متواصل لأكثر من 4 ساعات، فعليك التوجه إلى الطبيب فوراً.

ضعف مفاجئ في الرؤية أو فقدان الرؤية، نادراً (من شأنه أن يؤثر على حتى 1 من بين 1.000 شخص): يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

- رد فعل جلدي حاد (شيوخ نادراً) - من شأن الأعراض أن تشمل تقرش حاد وإنفاسات الجلد، حويصلات في الفم، في الأعضاء التناسلية، ثوب العينين، وسخونة.
- نوبات أو إختلالات (شيوخ نادراً).

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

دواء، إحمار في الوجه، إضطرابات في الجهاز الهضمي، إحتشاق في الأنف، رؤية الواهن، تنشوش في الرؤية، إضطرابات في الرؤية، غثيان، هبات من الماء (شعور مفاجئ بحرارة في الجزء العلوي من الجسم).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

تقزّيات، طفح، تهيج /آلم في العينين، إحمرار العينين، حساسية للضوء، ومضى من الضوء، سطوع الرؤية، تدمج العينين، ضربات قلب سريعة أو قوية، رد فعل ضغط الدم، إنخفاض ضغط الدم، آلام في العضلات، تبل للنون، إنخفاض في الشعور بالملمس، دوار (فيتفاغر)، رنين في الأذنين، جفاف في الفم، إحتشاق أو إنسداد الجيوب، إلتهاب في粘膜ة الداخلية للأذن (الأعراض تشمل رشح، عطاس، إحتشاق في الأنف)، آلام في الجزء العلوي من البطن، ارتداد معدني مريئي (الاعراض تشمل حرقة)، الشعور بارهاق، وجود دم في البول، آلام في الأطراف، رعاف، الشعور بسخونة.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1.000 شخص):

إغماء، سكتة، ذوبان قلبية، إضطرابات في نظم القلب، ضعف مفاجئ في السمع أو فقدان السمع، إنخفاض مؤقت في جريان الدم إلى أجزاء في الدماغ، الشعور بتضيق في الحنجرة، خدر في الفم، نزف من الجانب الخلفي للعين، إذواج الرؤية، ضعف في حدة النظر، شعور غير إنتشاري في العين، إنفاس في العين أو في الجفن، رؤية حسيمات صغيرة أو ضباب، رؤية حالة حول الأضواء، توسيع الحدقتين، تغير لون بياض العينين، نزف من القصبي الذكري، وجود دم في السائل المنوي، جفاف في الأنف، إنفاس داخل الأنف، عصبية.

أعراض جانبية إضافية بلغ عنها بعد التسويق:

بلغ عن ذبحة صدرية غير مستقرة، موت مفاجئ في أيديان نادرة. غالباً، لكن ليس كافة الرجال الذين عانوا من هذه الأعراض عانوا من مشكلة كلبية قبل تناول هذا الدواء، لم يكن التحديد فيما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين هذه الأعراض وإستعمال الدواء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى الموقع المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم م.ض."

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لفاداري إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على طهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان جاف وجمي في الموضع.

(6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Dicalcium phosphate dihydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Opadry OY-L-30919 (Blue), Opadry fx-63F10239 (Purple), Opadry OY-F-2857 (Red).

يحتوي المستحضران على صوديوم، أنظر الفقرة 2، بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تاريم معبأً ضمن لوحيات (بليستر) داخل علبة كرتون. في كل علبة يوجد 16. 15. 10. 8. 4. 2، قرصاً. من الجائز لا تستوقي كافة أحجام الطبل.

تاريم 50 عبارة عن أقراص مطلية ببصورية الشكل، محدبة من كلا الجانبين، بلون بنفسجي شبيه باللؤلؤة.

تاريم 100 عبارة عن أقراص مطلية مطاولة محدبة من كلا الجانبين، لونها بنفسجي شبيه باللؤلؤة مع خط للشطر من جانب واحد.

اسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يوني فارم م.ض، ص.ب. 21429، كل أبيب، 6121301.

اسم المنتج وعنوانه: يوني فارم م.ض.، بارك الصناعة "ماقو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تاريم 50 - 149 15 33582 01 - 149 16 33583 01

تاريم 100 - 149 16 33583 01 - 149 17 33583 01

تم إعدادها في أيولو 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.