

نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

سياليس 20 ملغ أقراص مطلية	سياليس 10 ملغ أقراص مطلية
التركيب: يحتوي كل قرص على: تادالافيل 20 ملغ (tadalafil 20 mg) للاستعمال "حسب الحاجة"	التركيب: يحتوي كل قرص على: تادالافيل 10 ملغ (tadalafil 10 mg) للاستعمال "حسب الحاجة"
سياليس 5 ملغ أقراص مطلية	سياليس 2.5 ملغ أقراص مطلية
التركيب: يحتوي كل قرص على: تادالافيل 5 ملغ (tadalafil 5 mg) للاستعمال "اليومي"	التركيب: يحتوي كل قرص على: تادالافيل 2.5 ملغ (tadalafil 2.5 mg) للاستعمال "اليومي"

المواد غير الفعالة ومُسببات الحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2، البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

سياليس بجرعة 2.5، 10 و 20 ملغ معدّ لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال.

سياليس بجرعة 5 ملغ معدّ:

لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال.

لعلاج أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد.

لعلاج الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب ومن أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد.

المجموعة العلاجية: مجموعة أدوية المسالك البولية، أدوية تُستعمل لمشاكل الانتصاب.

يحتوي سياليس على المادة الفعالة تادالافيل، التي تنتمي إلى مجموعة أدوية تدعى مثبطات فوسفو دي إستراز من

النوع 5.

اضطراب الانتصاب هو حالة لا يستطيع فيها الرجل التوصل إلى انتصاب العضو الذكري أو الحفاظ عليه منتصبًا بشكل ملائم لممارسة النشاط الجنسي. لقد أثبت أن سياليس يحسن بشكل ملحوظ القدرة على أن يجعل العضو الذكري منتصبًا وصلبًا بحيث يتيح ممارسة النشاط الجنسي. بعد الإثارة الجنسية، يعمل سياليس على إرخاء الأوعية الدموية في عضوك الذكري، وهكذا يحسن تدفق الدم إليه. ونتيجة لذلك يتحسن أداء الانتصاب. لن يساعدك سياليس في حال لم يكن لديك اضطراب في الانتصاب. تجدر الإشارة إلى أن سياليس لا يعمل عند نقص التهيج الجنسي. عليك أنت وشريك حياتك أن تبادرا إلى الإثارة الجنسية تماما كما كنتما ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لاضطراب الانتصاب.

تضخم البروستات (prostate) الحميد هو حالة يزداد فيها حجم غدة البروستات مع التقدم في العمر. تشمل الأعراض على صعوبة في بدء التبول، الشعور بعدم إفراغ المثانة كلياً، والحاجة إلى التبول أكثر في الليل أيضاً. يحسن سياليس تدفق الدم إلى البروستات والمثانة، ويرخي العضلات، ومن شأن هذا أن يقلل أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد. أثبت أن سياليس يحسن أعراض البول هذه خلال 1-2 أسابيع تقريباً بعد بدء العلاج.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا كنت:

- حساساً (لديك أرجية) لتنادالافيل أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).
- تتناول نوعاً معيناً من نترات عضوي أو نوعاً آخر يطلق أكسيد النيتريك مثل: نترات الأميل. هذه مجموعة مستحضرات ("نترات") تُستخدم لعلاج الذبحة الصدرية ("ألم في الصدر"). أثبت أن سياليس يزيد تأثير هذه المستحضرات. إذا كنت تتناول نوعاً معيناً من النترات أو إذا لم تكن متأكدًا، أخبر الطبيب بذلك.
- تعاني من مرض قلب حاد أو تعرضت لنوبة قلبية في آخر 90 يوماً.
- أصبت مؤخراً بسكتة دماغية كانت قد حدثت في الأشهر الستة الأخيرة.
- تعاني من ضغط دم منخفض أو مرتفع لا يمكن السيطرة عليه.
- عانيت ذات مرة من فقدان الرؤية نتيجة non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)، حالة طبية تدعى "سكتة العين".
- تتناول ريوسيجوات (riociguat). هذا دواء يُستعمل لعلاج ضغط الدم الشرياني الرئوي المرتفع (أي ضغط دم مرتفع في الرئتين) وضغط الدم الرئوي الانصمامي الخثاري المزمن (أي ضغط دم مرتفع في الرئتين يحدث بسبب خثرات دموية). لقد أثبت أن مثبطات PDE5، مثل سياليس، تزيد تأثير هذا الدواء على انخفاض ضغط الدم. إذا كنت تتناول ريوسيجوات أو إذا لم تكن متأكدًا، أخبر الطبيب بذلك.

الدواء ليس معداً للاستعمال دون جيل 18 سنة أو لدى النساء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب قبل تناول سياليس.

يجدر بك أن تعرف أن النشاط الجنسي يشكل خطراً محتملاً لدى مرضى القلب لأنه يتطلب جهداً قلبياً كبيراً. إذا كنت تعاني من مشكلة قلبية عليك استشارة الطبيب.

بما أن أعراض تضخم البروستات (prostate) الحميد وأعراض سرطان البروستات قد تكون شبيهة، سيجري الطبيب فحص سرطان البروستات قبل أن يُسجل لك علاجاً بـ سياليس لعلاج تضخم البروستات الحميد. سياليس

ليس معدًا لعلاج سرطان البروستات.

قبل تناول الأقراص، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من فقر الدم المنجلي (خلايا دم حمراء غير سليمة).
- كنت تعاني من الورم النقوي المتعدد (سرطان نخاع العظم).
- كنت تعاني من اللوكيميا (سرطان خلايا الدم).
- كان لديك خلل في مبنى عضوك التناسلي.
- كنت تعاني من مشكلة حادة في الكبد.
- كنت تعاني من مشكلة حادة في الكلى.

ليس معروفًا فيما إذا كان سياليس ناجحًا لدى مرضى اجتازوا:

- عملية جراحية في الحوض.
- استئصالًا جزئيًا أو تامًا لغدة البروستات (prostate) الذي تتم فيه إزالة أعصاب الغدة.

إذا شعرت بانخفاض/فقدان الرؤية المفاجئ أو إذا أصبحت رؤيتك ضبابية، مشوشة أثناء تناولك لـ سياليس، توقف عن تناول سياليس وتوجه فورًا إلى طبيبك.

شوهد انخفاض في السمع أو فقدان السمع المفاجئ لدى بعض متلقي العلاج الذين تناولوا تادالافيل. رغم أنه لا يمكن نسب استعمال تادالافيل مباشرة إلى هذه الظاهرة، فإذا شعرت بانخفاض السمع أو فقدان السمع المفاجئ، توقف عن استعمال سياليس وتوجه فورًا إلى الطبيب.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون جيل 18 عامًا.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يمكن تناول سياليس إذا كنت تتناول مستحضرات من نوع النترات.

قد تتأثر بعض الأدوية بسياليس أو قد تؤثر بعض الأدوية في مدى عمل سياليس. أخبر الطبيب أو الصيدلي، إذا كنت تتناول:

- أدوية من مجموعة محصرات ألفا (تُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع أو لعلاج أعراض البول المرتبطة بتضخم البروستات (Prostate)) الحميد.
- أدوية أخرى لعلاج ضغط الدم المرتفع.
- ريوسيجوات.
- أدوية من مجموعة مثبطات 5 ألفا ريدوكتاز (تُستعمل لعلاج تضخم غدة البروستات الحميد).
- أدوية مثل أقراص كيتوكونازول (لعلاج حالات العدوى الفطرية) ومثبطات البروتياز لعلاج فيروس الإيدز أو عدوى HIV.
- فينوباربيتال، فينيتوين، وكاربامازيبين (أدوية لعلاج الصرع).
- ريفامبيسين، إريثروميسين، كلاريثروميسين أو إيتراكونازول.
- مستحضرات إضافية لعلاج اضطراب الانتصاب.

استعمال الدواء مع الطعام والشراب

أقراص سياليس معدة للاستعمال الفموي لدى الرجال فقط. يجب ابتلاع القرص كاملاً مع القليل من الماء. يمكن تناول الأقراص مع أو بدون طعام.

قد يؤثر عصير الجريب فروت في طريقة عمل سياليس، لهذا يجب تناوله بحذر. تحدّث مع الطبيب للحصول على مزيد من المعلومات.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

قد يلحق استهلاك الكحول ضرراً بقدرتك على الانتصاب، وقد يؤدي إلى انخفاض ضغط دمك بشكل مؤقت. إذا تناولت أو كنت تخطط لتناول سياليس عليك تجنب الإفراط في استهلاك الكحول (نسبة كحول في الدم 0.08% أو أكثر)، لأن هذا الاستهلاك قد يزيد أيضاً خطر الإصابة بالدوخة عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.

الخصوبة

في الفحوصات التي أجريت على الكلاب طرأ انخفاض على إنتاج الحيوانات المنوية. كما شوهد هذا الانخفاض لدى بعض الرجال أيضاً. لا يتوقع أن تلحق هذه الأعراض ضرراً بالخصوبة.

السياقة واستعمال الماكينات

هناك رجال تناولوا سياليس في أبحاث سريرية وأبلغوا عن دوخة. افحص جيداً كيف تستجيب للأقراص قبل السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي سياليس على اللاكتوز

إذا أخبرك الطبيب بأنك تعاني من حساسية لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي سياليس على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، لهذا يُعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة المتبعة لعلاج اضطراب الانتصاب لدى الرجال في غياب تعليمات أخرى من الطبيب:

سياليس 10 ملغ - الجرعة الأولية المتبعة هي قرص واحد مقداره 10 ملغ قبل ممارسة النشاط الجنسي. إذا كان تأثير هذه الجرعة ضعيفاً جداً، قد يزيد الطبيب الجرعة حتى 20 ملغ.

سياليس 20 ملغ - الجرعة الأولية المتبعة هي قرص واحد مقداره 10 ملغ قبل ممارسة النشاط الجنسي. رغم ذلك، وصف لك الطبيب جرعة مؤلفة من قرص واحد مقداره 20 ملغ لأنه قرر أن الجرعة الموصى بها وهي 10 ملغ ضعيفة جداً لك.

يجب تناول قرص واحد من سياليس، قبل ممارسة النشاط الجنسي بـ 30 دقيقة، على الأقل.

قد يستمر تأثير سياليس حتى 36 ساعة بعد تناول القرص.

لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم. سياليس 10 و 20 ملغ مخصصان للاستعمال قبل ممارسة النشاط الجنسي، ولا يوصى باستعمالهما بشكل يومي ومتواصل.

سياليس 2.5 و - 5 ملغ - الجرعة المتبعة هي قرص واحد مقداره 5 ملغ، للتناول مرة في اليوم، في ذات الساعة من اليوم تقريبا. قد يلائم الطبيب الجرعة بحيث تتناول 2.5 ملغ استنادا إلى رد فعلك تجاه سياليس. يتم إعطاء ذلك بقرص 2.5 ملغ.

لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم.
يتيح لك تناول سياليس "يومي" الانتصاب أثناء الإثارة الجنسية، وذلك في أي نقطة زمنية على مدار 24 ساعة في اليوم. قد يكون تناول سياليس "يومي" عمليا للرجال الذين ينون ممارسة النشاط الجنسي مرتين أو أكثر خلال الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن سياليس عندما يؤخذ لعلاج ضعف الانتصاب لا يعمل من دون إثارة جنسية. عليك أنت وشريكة حياتك أن تعملوا للحصول على الإثارة الجنسية تماما كما كنتما ستفعلان لو أنك لم تتناول دواء لاضطراب الانتصاب.

الجرعة الاعتيادية لعلاج أعراض تضخم البروستات (Prostate) الحميد في غياب تعليمات أخرى من الطبيب:
قرص سياليس 5 ملغ مرة واحدة في اليوم في ذات الساعة.

الجرعة المتبعة لعلاج الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب وأعراض تضخم البروستات (Prostate) الحميد في غياب تعليمات أخرى من الطبيب:
قرص سياليس 5 ملغ مرة واحدة في اليوم في ذات الساعة.

لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

السحق/الشطر/المضغ:

ليست هناك معلومات حول سحق/ شطر/ مضغ القرص. يجب تناول القرص بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ليست هناك معلومات حول استعمال المستحضر عبر الأنبوب المعدي المريئي. يجب استعمال هذا الدواء في أوقات ثابتة وفق توصيات الطبيب المعالج.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى
إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ، عليك التوجه إلى الطبيب. قد تشعر بأعراض جانبية كما هو مفصل في البند 4.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحباً معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، تناوله فور تذكرك، ولكن لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة تعويضا عن القرص المنسي. لا يجوز تناول سياليس أكثر من مرة واحدة في اليوم.

يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استعمال هذا الدواء أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها. تكون هذه الأعراض الجانبية طفيفة حتى معتدلة غالبًا.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من:

- رد فعل تحسسي بما في ذلك طفح جلدي (وتيرة غير شائعة).
- آلام في الصدر – لا يجوز استعمال أدوية من نوع نترات، ويجب التوجه فورًا لتلقي علاج طبي (وتيرة غير شائعة).
- انتصاب متواصل، وربما مؤلم بعد تناول سياليس (priapism) (وتيرة نادرة). إذا كان لديك انتصاب كهذا لأكثر من 4 ساعات متتالية، عليك مراجعة الطبيب فورًا.
- فقدان النظر المفاجئ (وتيرة نادرة)، رؤية مركزية مشوهة، ضبابية، مشوشة أو تراجع مفاجئ في الرؤية (وتيرة غير معروفة).

الأعراض الجانبية الأخرى التي تم الإبلاغ عنها:

أعراض جانبية شائعة (تمت مشاهدتها لدى 10-1 مستعملين من بين 100):

- صداع، ألم في الظهر، آلام في العضلات، آلام في اليدين والساقين، احمرار الوجه، احتقان الأنف واضطرابات في الهضم.

أعراض جانبية غير شائعة (تمت مشاهدتها لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000):

- دوخة، ألم في البطن، غثيان، حالات تقيؤ، حرقة، ضبابية في الرؤية، ألم في العينين، صعوبات في التنفس، وجود الدم في البول، انتصاب متواصل، شعور بخفقان في القلب، نبض سريع، ضغط دم مرتفع، ضغط دم منخفض، حالات نزيف من الأنف، صفير أو طنين في الأذن (tinnitus)، وذمة في اليدين، الساقين أو الكاحلين وشعور بالتعب.

أعراض جانبية نادرة (تمت مشاهدتها لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- إغماء، نوبة صرع وفقدان الذاكرة العابر، تورم الجفنين، احمرار العينين، انخفاض السمع المفاجئ أو فقدان السمع، شرى (كدمات حمراء تسبب حكة على الجلد)، نزيف من القضيب، وجود الدم في المنى، وفرط التعرق.

تم الإبلاغ عن حالات نادرة من النوبة القلبية والسكتة الدماغية أيضا لدى الرجال الذين يتناولون سياليس. عانى معظم هؤلاء الرجال من مشاكل قلبية قبل البدء بتناول الدواء.

تم الإبلاغ في حالات نادرة عن انخفاض جزئي، مؤقت أو دائم في الرؤية أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو في كلا العينين.

تم الإبلاغ عن بعض الأعراض الجانبية النادرة لدى الرجال الذين تناولوا سياليس، ولكنها لم تظهر في التجارب السريرية. تشتمل هذه الأعراض على:

- الشقيقة، وذمة في الوجه، رد فعل تحسسي حاد يتجسد في وذمة في الوجه أو الحلق، طفح جلدي حاد، اضطرابات في تدفق الدم إلى العينين، نظم قلب غير منتظم، ذبحة صدرية، وموت مفاجئ لأسباب قلبية.
- رؤية مركزية مشوهة، ضبابية، مشوشة أو تراجع مفاجئ في الرؤية (وتيرة غير معروفة).

حدثت دوخة في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن 75 عاما الذين تناولوا سياليس. كما حدث إسهال في أحيان قريبة أكثر لدى الرجال فوق سن 65 عاما الذين تناولوا سياليس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أيّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)

الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزّن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا يجوز التسبب بالتقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة واللويحة (البليستر). تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من ذات الشهر المُشار إليه. سياليس 2.5 ملغ، 10 ملغ و 20 ملغ: يجب تخزينه تحت 30°C.

سياليس 5 ملغ: يجب تخزينه تحت 25°C.

يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الرطوبة. يُمنع إلقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلّة النفايات المنزلية. استشر الطبيب أو الصيدلي لمعرفة كيفية التخلص من الدواء. تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Tablet Core: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate.

Film-coat:

Cialis 2.5 mg: Color Mixture Yellow (32K12891), talc.

Cialis 5 mg: Color Mixture Yellow (Y-30-12863-A), talc.

Cialis 10 mg: Color Mixture II Yellow (32K92031), talc.

Cialis 20 mg: Color Mixture II Yellow (32K12884), talc.

يحتوي كل قرص 2.5 ملغ على 87 ملغ لاكتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 5 ملغ على 121 ملغ لاكتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 10 ملغ على 170 ملغ لاكتوز (ك مونوهيدرات).

يحتوي كل قرص 20 ملغ على 233 ملغ لاكتوز (ك مونوهيدرات).

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

سياليس 2.5 ملغ هو قرص لوزي الشكل، مطليّ بلون برتقالي-أصفر. العلامة "C 2 ½" مطبوعة على جانب واحد من القرص.
يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 12، 28، أو 30 قرصاً.
سياليس 5 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر فاتح. العلامة "C 5" مطبوعة على جانب واحد من القرص.
يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 4، 14، 28 أو 30 قرصاً.
سياليس 10 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر فاتح. العلامة "C 10" مطبوعة على جانب واحد من القرص.
يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 2، 4 أو 8 أقراص.
سياليس 20 ملغ هو قرص لوزي الشكل مطليّ بلون أصفر. العلامة "C 20" مطبوعة على جانب واحد من القرص.
يسوق المستحضر في عبوات كرتونية تحتوي على 2، 4 أو 8 أقراص.

قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: إيلي ليلي إسرائيلي م.ض.، شارع هشيراف 4، ص.ب. 4246، رعنا 4366411.
اسم المنتج وعنوانه: ليلي S.A، ألكوبنداس، مدريد، إسبانيا.

تم تحريرها في أيلول 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

سياليس 2.5 ملغ: 139-19-31765-00

سياليس 5 ملغ: 139-20-31766-00

سياليس 10 ملغ: 128-19-30677-21

سياليس 20 ملغ: 128-20-30678-21

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.