



עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טרםדקס® טיפות, 100 מ"ג/מ"ל

כל 1 מ"ל (40 טיפות) מכיל: טראמדול הידרוchlוריד (Tramadol hydrochloride) 100 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 " מידע נוסף " ובסעיף 2 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 14.

תרופות משפחת האופיאידים עלולות לגרום להתקפות, בעיקר בשימוש ממושך, והן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמיגן יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות.
ודא כי אתה מכיר את שם התרופה, המינון שאתה לוקח, תדריות המtan, משך הטיפול, תופעת הלואוי והטיכונים הפוטנציאליים.

מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

נטילת תרופה זו עם תרופות משפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוויות عمוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימת), תרדמת ומומות.

1. למה מיועדת התרופה?

טרםדקס טיפות מיועדת לטיפול באכ卜 בגין עד חמוץ.

קובוצה רפואיית: אופיאידים.

טרומдол, החומר הפעיל בטרםדקס טיפות, הוא משכך כאבים השיך לקבוצת האופיאידים והוא פועל על מערכת העצבים המרכזית. הוא משכך כאבים על ידי השפעה על תא עצב בעמוד השדרה ובמוח.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (טרומдол הידרוchlוריד) או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אם אתה במצב של הרעליה חריפה של אלכוהול, גלולות שינה, משככי כאבים או תרופות פסיקטורפיות אחרות (תרופות המשפיעות על מצב רוח ורגשות).
- אם אתה נוטל מעכבי מונומין אוקסידאז (MAO) (תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון), או אם נתלת אותם במהלך 14 הימים לפני נטילת **טרםדקס טיפות** (ראה סעיף "תגובהות בין תרופתיות").
- אם אתה חולה אפילפסיה והתקפים אינם נשלטים כהלה על ידי הטיפול שאתה מקבל.
- כתחליף לגמילה מסמים.

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בטרםדקס טיפות, ספר לרופא אם:

- אתה חושב שאתה סובל או סבלת בעבר מבעיות במשככי כאבים אחרים (אופיאידים), אלכוהול, תרופות מרשם או תרופה שאינה חוקית.
- סבלת בעבר מתסמי גמילה כגון: אי שקט, חרדה, רעד או צעה כאשר הפסיקת לצרוך אלכוהול או סמים.

- אתה חש צורך ליטול עוד טרמడוקס **טיפול** כדי להשיג את אותה רמה של שיכוך כאב, "תacen שזה מעיד על התחלתה של סבלות להשפעות התראפה והתחלה של התמכרות אליה. פנה לרופא שידון על טיפולך ואולי ישנה לך את המינון או יחליף את הטיפול למשכך כאב אחר.
- אתה סובל מהפרעות במצב ההכרה (אם אתה מרגיש שאתה עומד להתעלף).
- אתה במצב של שוק (זיהה קרה יכולה להיות סימן לכך).
- אתה סובל מלחץ מוגבר על המוח (יכול לקרות בעקבות פגיעת ראש או מחלת מוחית).
- אתה סובל מתקשי נשימה.
- אתה סובל מאפלפסיה או נתיחה לפרכוסים, כיוון שהסיכון לפרכוסים עלול לגודל.
- אתה סובל מדיכאון ותאלה נוטל תרופות נוגדות דיכאון מכיוון שחלקן עשויות להגיב עם טרמડול (ראה בהמשך "תגובהות בין תרופתיות").
- אתה סובל ממחלה כבד או כלוות.

בעיות נשימה הקשורות לשינה

טרמડוקס **טיפול** מכיל חומר פעל השיר לקבוצת תרופות הנקראט אופיאואידים. אופיאואידים יכולים לגרום לביעות הקשורות לשינה, לדוגמה הפסיקת הנשימה בשינה (נשימה שטוחה/-dom נשימה בשינה [אפניאה]), ולהיפוקסמיית הקשורה לשינה (רמת חמצן נמוכה בدم). הסיכון לחווות הפסיקת נשימה בשינה תלוי במינון של האופיאואיד. הרופא שלך עשוי לשקל הורדת המינון הכללי של האופיאואיד שאתא נוטל אם אתה חוות הפסיקת נשימה בשינה.

קיים סיכון קטן לחוות תסמנות סחוטונין אשר עלולה להתעורר לאחר נטילת טרמડול בשילוב עם תרופות נוגדות דיכאון מסוימות או לאחר נטילת טרמડול בלבד. פנה מייד ליעוץ רפואי אם יש לך אחד מההסתמים הקשורים לתסמנות חמומה זו (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

התקפים אפילפטיים דווחו במטופלים הנוטלים טרמડול ברמת המינון המומלצת. הסיכון עלול לגודל כאשר מינוני הטרמડול גבוהים מהגבול העליון של המינון היומי המומלץ (400 מ"ג).

נטילת תרופה זו באופן קבוע, במיוחד במקרה של הנדרש, מתי רצוי להפסיק וכיום לעשות זאת באופן בטוח. לעיתים רוחקות, העלתה המינון של התרופה עלולה לגרום לך להיות רגש יותר לכאב. אם אתה חוות זאת, אנא דבר עם הרופא המטפל אודוות הטיפול.

התמכרות עלולה לגרום לתסמייני גמילה כאשר מפסיקים ליטול תרופה זו. תסמייני גמילה יכולים לכלול חוסר מנוחה, קשיי נשינה, עצבנות, אי שקט, חרדה, מודעות לפעימות הלב, עלייה בלוץ הדם, בחילה או הקאה, שלשלולים, אובדן תיאנון, רעד או הזעה. הרופא שלך ידוע כיצד להפחית את המינון בהדרגה לפני הפסיקת נטילת התרופה. חשוב שלא תפסיק לקחת את התרופה בבהת אחת, מפני שכך עליה הסיכון לחווות תסמייני גמילה.

אופיאואידים אמורים להיות בשימוש רק על ידי מי שהרופא רשם להם אותם. אין למת את התרופה לאף אחד אחר. נטילת מינון גבוה או בתדירות גבוהה יותר של אופיאואידים עלולה להעלות את הסיכון להתמכרות. שימוש יתר ושימוש לא נכון עלולים להוביל למינון יתר ו/או למומות.

טרמડול עבר עיבוד בכבד על ידי אנדים. לחלק מהאנשים יש סוג מסוים של האנדים וזה עלול להשפיע עליהם בדרכים שונות. אצל אנשים מסוימים, ההשפעה על הכאב לא תהיה מורגשת מספיק, בעוד אנשים אחרים עלולים לסבול מתופעות לוואי חמורות ובסירות גבוהה יותר. אם אתה מבחין באחת מתופעות הלואוי הבאות, אתה חייב להפסיק את נטילת התרופה ולפנות מיד לרופא: נשימה איטית או שתחית, בלבול, ישנווניות, אישונים מוקטנים, הרגשות בחילה או הקאה, עצירות, חוסר תיאנון.

שוחח עם הרופא שלך אם אתה חוות כאב אחד מההסתמים הבאים בזמן נטילת **טרמડוקס טיפול**:

עיפויות קיצונית, איבוד תיאבון, כאב בטן חמוץ, בחילה, הקאה או לחץ דם נמוך. זה עשוי להצביע על כך שיש לאר סייקה של יתרת הכליה (רמות נמוכות של קוורטיזול). אם אתה חווית תסמים אלה, צור קשר עם הרופא שלך, אשר יחליט אם אתה צריך לקחת תוסף הורמוני.

תגובה בין רפואיות
אם אתה לוקח, או אם לך תרופה אחרת כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
אין ליטול טרמడקס טיפול ייחד עם מעכבי SAO (טיפול מסויימות לטיפול בדיכאון) או אם נטלה אותם במהלך 14 הימים לפני Nutzung טרמડקס טיפול.

תיתכן ירידה בהשפעה של טרמಡקס טיפות ומשך השפעתה יכול להתקצר אם נלקחת יחד עם תרופות המכילות:

- קרבמאזפין (טיפול בהתקפי אפילפסיה)
 - אונדנסטרון (למניעת חילוות)

הרופא שלך יגיד לך האם אתה צריך לקחת ט

הסיכון לתופעות לוואי עשוי/agadol אם אתה לוגח:

- משככי כאבים אחרים כמו מורפין וקוקאין (גם לצורך הקלה בשיעול) או אלכוהול בזמן שאתה מוטל טרמడקס טיפול. אתה עלול להרגיש מנוחה או להרגיש שאתה עלול להתעלף. אם זה קורה לך, פנה אל הרופא שלך.
 - שימוש במרקבל טרמಡקס טיפול יחד עם תרופות להרגעה או לשינה (לדוגמה בנזודיאזפינים) מעלה את הסיכון לישגנויות, קשיי נשימה ("דיכוי נשימתו"), תרדמת ועלול להיות מסκן חיים. מכיוון שכך, שימוש במרקבל צריך להישקל רק אם חלופות תרופתיות אחרות אין אפשריות. עם זאת, אם הרופא שלך רושם לך טרמડקס טיפול עם תרופות מרדיימות, הרשי שהמרקבל המקביל צריכים להיות מוגבלים על ידי הרופא. אנא ספר לרופא שלך על כל התרופות המרדיימות שאתה לוקח, ומלא באידיאות אחר המלצות הרופא שלך למינן. בקשה מהחברים או הקוראים להיות מודעים לסימנים ולתסמינים יכולת עזרו. צור קשר עם הרופא שלך אם אתה חווה תסמנים אלו.
 - תרופות שיכولات לגרום לפרכוסים (התקפים אפילפטיים), למשל סוגים מסוימים של תרופות נגד דיכאון או תרופות אנטיביסיכוטיות. הסיכון לקלבת התקף עלול להיות גבוה יותר אם תיקח טרמಡקס טיפול באותו זמן. הרופא שלך יגיד לך האם טרמಡקס טיפול מתאימה לך.
 - תרופות מסוימות נגד דיכאון. טרמಡקס טיפול עלולה להגיב ייחד איתן ואתה עלול לחווות תסמנות סרוטוניין (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
 - נוגדי קריישה מגזירות קומරין (טרופות לדילול הדם), כמו וורפרין. פעילות תרופות אלו על קריישה הדם עלולה להיות מושפעת ואז עלול להוביל לדROWSINESS.

שימוש בתהופה ומזון

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אל תשנה משקאות אלכוהוליים במהלך הטיפול בטרםדקס טיפות, מאחר שהשפעה עלולה להתחזק.

ילדים ומתבגרים

טרמדול אינו ממלץ לילדים עם קשיי נשימה, מאחר שההטסמים של הרעלת טרמדול עלולים להיות חמורים יותר ילדים אלו.

הירון, הנקה ופוריות

אל תקח טרמడקס טיפות אם את בהירין או חשבת שתת בהירין, אלא אם דיברת על כך עם הרופא והתוועלת שבטיפול עליה על הסיכון לפגיעה בתינוק. אם את נוטלת טרמડקס טיפות במהלך ההריון, זה עלול לגרום לתינוק לתלות ולהוות תסמנין גמיליה לאחר הלידה, המציגים טיפול.

אין ליטול טרמડקס טיפות בהנקה מפני טרמડול מופרש בחלב אם ועלול להשפיע על תינוק.

בתתבסס על ניסיון בני אדם, טרמડול אינו משפיע על פוריות האישה או הגבר.

נהיגה ושימוש במכוניות

טרמಡקס טיפות עלולה לגרום לשינויות, סחרחוות וראיה מוטשטשת, וכן עלולה לגרום בתגובהותיך. אם אתה מרגיש שהתגובה שלך מושפעות, אל תנהג במכונית או בכלי רכב אחרים, אל תפעיל מכשור חשמלי או מכונות.

התרופה עלולה להשפיע על יכולותך לנוהג מפני שהוא עשוי לגרום לשינויות או סחרחוות. אל תנהג במהלך נטילת תרופה זו עד שתדע כיצד היא משפיעה עלייך.

דבר עם הרופא שלך או עם הרוקח אם אין משוכנע שבתו בשבייך לנוהג במהלך נטילת תרופה זו. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה סוכרוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך סובלים לסתורים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. עלול להזיק לשניים.

התרופה מכילה מקרוגולגליצרול הידרוקסיטרטט, העולגอาจ לגרום לאי נוחות בקייבת ושלשול.

התרופה מכילה 150 מ"ג פרופילין גליקול בכל מ"ל.

התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתן (23 מ"ג) בכל מ"ל, כלומר היא למעשה "נטולת נתן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנווגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון צריך להיות מותאם לחומרת הכאב ולרגישות האישית שלך בלבד.

באופן כללי, יש לקחת את המינון הנומור ביותר שימושך כאב. אין ליטול יותר מ-400 מ"ג טרמડול הידרוכולוריד (160 טיפות) ביום, אלא אם הרופא שלך הינה אוורה לנוהג כך.

אליא אם כן הונחית בצדקה אחרת על ידי הרופא שלך, המינון המקובל הוא:

מבוגרים ומתבגרים מגיל 14 ומעלה: 50-100 מ"ג טרמડול הידרוכולוריד (40-20 טיפות) כל 6-4 שעות.

ילדים

טרמડקס טיפות אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 14.

אוכלויסיה מבוגרת

באוכלויסיה מבוגרת (מעל גיל 75) הפרשת טרמડול מהגוף עשוי להיות מעוכבת. אם זה נכון לגבר, הרופא שלך עשוי להמליץ על הגדרת המרווחים בין המנות.

מחלת כבד או כלות חמורה (אי ספיקה)/חולי דיאלייזה

מטופלים עם אי ספיקת כבד /או כליה ברמה חמורה צריכים להימנע מנטילת **טרמડקס טיפות**. אם אתה סובל מאין ספיקה ברמה מתונה או בינונית, יתכן שהרופא ימליץ להאריך את המרווח בין המנות.

אין לעבר על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש לבולע עם מעט מים או לטפטף על מעט סוכר.
- שים לב!** יש להקפיד על מדידת המנה בטפטפת של הבקבוק.

כמה זמן עליך לקחת טרמડקס טיפות?

הרופא שלך אמר היה לשוחח איתך על משך הטיפול הנדרש ולהיכן תוכנית להפסקת הטיפול. תוכנית זו מתוויה כיצד להפחית בהדרגה את המינון עד להפסקת הנטילה.

אם נטלה בעות מינון גבוה יותר

בדרכך, אם בטיעות נטלה מנה נוספת, זה לא אומר לגרום לתופעות שליליות. המשך לקחת את המנה הבאה כפי שנדרש.

אם אתה (או מישחו אחר) נוטל כמות גדולה של **טרמડקס טיפות** בפעם אחת, יש לפנות מיד לבית חולים או לרופא. הבא אויתת התרופה איתך.

סימנים של מינון יתר כוללים אישונים קטנים מאוד, הקאות, ירידת לחץ הדם, דפוקות לב מואצות, התמוטטות, איבוד הכרה, פרכוסים וקשי נשימה או נשימה שטוחה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליקחת טרמಡקס טיפות, סביר שהכאב יחזר. אל תיקח מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה, פשוט המשך ליקחת את התרופה כמו קודם.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה בביטחון אחת. אם ברצונך להפסיק ליקחת את התרופה, התייעץ קודם עם הרופא. הוא יסביר לך כיצד לעשות זאת, בדרך כלל על ידי הפחתת המינון בהדרגה, כך שתופעות הגמילה הלא נעימות יהיו מינימליות.

תסמנני גמילה כגון חוסר מנוחה, קשיי שינה, עצבנות, אי שקט, חרדה, מודעות לפעימות הלב, עלייה בליחן הדם, בחילה או הקאה, שלשול, רעד או חזעה עלולים להופיע אם תפסיק את הנטילה בביטחון אחת. יש להתמיד בטיפול כפי שהוא מזמן על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זזוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטרמಡקס טיפות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

עליך לפנות מיד לרופא אם אתה חווה תסמננים של תגובה אלרגית כמו התנופחות של הפנים, הלשון /או הגרון /או קשיי בליעה או סרפדת (hives, חבורות אדומות בעור) יחד עם קשיי נשימה.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביוטר משתמש אחד מעשרה):

- סחרחות.
- בחילות.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מ/users מ扭转 100):

- כאבי ראש, ישנויות.
- עייפות.
- עצירות, יובש בפה, הקאות.
- החזה.

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מ/users מ扭转 1,000):

- השפעות על הלב ועל מחזור הדם (מודעות לפעימות הלב, דופק מהיר, תחושת עילפון או התמוטטות).
- תופעות לוואי אלו מתרכשות בעיקר במצב עמידה או תחת מאיץ פיז'.
- דחף להקיא, בעיות בבטן (כגון תחושת לחץ בבטן, נפיחות), שלשול.
- תגובות עוריות (למשל גירוד, פריחה).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-1 מ/users מ扭转 10,000):

- תגובות אלרגיות (כמו קשיי נשימה, צפצופים, נפיחות בעור) ושוק (כשל פתאומי בזרימת הדם).
- דופק איטי.
- עלייה בליחן הדם.

תשומשות לא רגילים (למשל גירוד, עקצוץ, חוסר תחושה), רעד, התקפים אפילפטיים, התכווצויות שרירים, חוסר תיאום בתנועות, אי-בוד הכרה זמנית (עלפון), הפרעות בדיבור.

- התקפים אפילפטיים התרכשו בעיקר במינונים גבוהים של טרמડול או כאשר טרמડול נלקח במקביל לתרופות אחרות שעולות לעורר התקפים.
- שינויים בתיאבן.

הzieot, הבלבול, הפרעות שינה, דליריום, חרדות וסיטוי לילה.

תלונות על בעיות פסיקולוגיות עשויות להופיע לאחר הטיפול בטרמಡקס טיפות. עצמתן ואופיין עשויים להשנות (בהתאם לאישיות המטופל ולמשך הטיפול). הן עשויות להופיע בצורה שנייה במצב הרוח (לרוב

מצב רוח מרומם, לעתים נרגז), שינוי בפעולות (בדרכ כלירידה, לעתים עליה) וירידה בתפיסה הקוגניטיבית והחושית (מודעות פחותה ויכולת פחותה לקבל החלטות, מה שעלול להוביל לטעויות בשיקול הדעת).

- טשטוש ראייה, הרחבת יתר של האישונים, התכווצות האישונים.
- נשימה איטית, קוצר נשימה.
- דוח על החמרה במצב האסתמה, אך לא הוכח שהיא נגרמה על ידי טרמಡול. אם חורגים מהמיןונים המותרים או שתראות אחרות המדכאות את התפקיד המוחי נלקחות במקביל, יתכן שתהיה האטה בנשימה.
- חולשת שרירים.
- קשיים או כאבים בהטלת שתן, מיעוט שתן.

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמאפיינן בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- עליה באנדימי כבד.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- רמה נמוכה מדי של סוכר בدم.
- שיוקם.
- תסמנת סרוטוני שיכולה להתבטא כ שינוי מצב נפשי (הכולל תס敏ים כגון: אי שקט, היזות, תרדמתה (קומה) והשפעות אחרות, כגון חום, עליה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב, עוינות בלתי רציניות, נזונות, שרירים, חוסר קואורדינציה /או תס敏ים במערכת העיכול (למשל בחילות, הקאות, שלשלולים) (ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה").
- תלות והתמכרות (ראה בהמשך "יכד אדע אם אני מכור").

גמילה מהתרופה:

כאשר מPsiיקים נתילה של **טרמಡקס** **טיפולים** לחווות תסמי גמילה הכלולים חוסר מנוחה, קשיי שינה, עצבנות, חרדה, מודעות לפעימות הלב, עליה בלחץ הדם, בחילה, שלשלולים, רעד, הצעה.

יכד אדע אם אני מכור?

אם הבדיקה באחד מהסימנים הבאים בזמן נתילת **טרמડקס טיפול**, יתכן שהה סימן להתמכרות:

- אתה חש צורך ליטול את התרופה בזמן ארוך יותר מאשר המומלץ לך.
- אתה מרגיש שאתה צריך להשתמש ביותר מהמינון המומלץ.
- אתה משתמש בתרופה מסיבות אחרות מאשרמו.
- כאשרת מפסיק לקחת את התרופה אתה מרגיש לא טוב, ושוב מרגיש טוב עם נתילת התרופה.

אם הבדיקה באחד מהסימנים המוזכרים, חשוב שמדובר עם הרופא שלך.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לידיו על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסון מתחת ל- $-C^{\circ}25$. לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים.
- אין להשאיר תרופות לביב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח אוර להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Purified water, sucrose, propylene glycol, glycerol, sodium cyclamate, saccharin sodium, potassium sorbate, macrogolglycerol hydroxystearate, mint oil, anise flavour artificial

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיישה שקופה עד צהבהבה, מעט צמיגה.

בקבוק התרופה כולל טפטפת למדידה מדוייקת של כמות התרופה. כל בקבוק מכיל 10 מ"ל של תכשיר.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 109-27636

נערך בינואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לשם הפשטות ולהקלת הקရיה, עלון זה נوش בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

צורך ובעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל