نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة

(مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

فوريكونازول تيڤع جديد

أقراص مطلية
التركيبة
يحتوي كل قرص مطلي على:
فوريكونازول 200 ملغ
Voriconazole 200 mg

للحصول على معلومات عن المركّبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

ڤوريكونازول تيڤع عبارة عن دواء مضاد للفطريات، واسع الطيف ومخصص لعلاج:

- داء الرشاشيات الغزوي (تلوث تسببه فطريات من نوع الرشاشيات).
- تلوثات المبيضات (كانديدا) في الجهاز الدموي (وجود المبيضات في الدم) لدى المرضى غير المصابين بقلّة العدلات.
- تلوثات المبيضات الغزوية المقاومة لفلوكونازول (دواء آخر مضاد للفطريات) بما في ذلك C. Krusei.
- التلوثات الفطرية الخطيرة التي تسببها فطريات من النوعين Scedosporium و-Fusarium.

ڤوريكونازول تيڤع مخصص للمرضى المصابين بتلوثات فطرية خطيرة، بل ربما تشكّل خطرًا على الحياة.

ڤوريكونازول تيڤع مخصص لمنع التلوثات الفطرية الغزوية لدى الأشخاص الذين خضعوا لزراعة النخاع العظمي والمعرّضين لخطورة عالية.

الفصيلة العلاجية:
مضاد للفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو إيقاف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب التلوثات.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركّبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء، انظر البند 6.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء مع تيرفينادين (للأرجية)، أستيميزول (للأرجية)، سيزاپريد (للمشاكل في المعدة)، پيموزيد (للمشاكل النفسية)، كينيدين (للمشاكل في نظم القلب)، إيڤابرادين (لعلاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (لعلاج السل)، ريفامپيتسين (لعلاج السل)، كاربامازپين (لعلاج الاختلاجات)، فينوباربيتال (لعلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقات الإيرجوت (إيرجوتامين، ديهيدرو إيرجوتامين؛ لعلاج الصداع النصفي)، سيروليموس (لدى المرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)، إيفاڤيرينز بجرعة دوائية مقدارها 400 ملغ فما فوق تعطى مرة واحدة في اليوم (لعلاج HIV)، ريتونافير بجرعة دوائية مقدارها 400 ملغ فما فوق في كل مرة تعطى مرتين في اليوم (لعلاج HIV)، نبتة العرن (St. John's Wort)، نالوكسيچول (لعلاج الإمساك الناجم تحديدًا عن استعمال مسكنات الآلام من نوع الأفيونيات (مثلاً مورفين، أوكسيكودون، فينتانيل، ترامادول، كودينين))، تولڤاپتان (المستعمل لعلاج نقص الصوديوم في الدم (المستويات المنخفضة للصوديوم في الدم) أو يُستعمل لإبطاء التدنّي في وظيفة الكليتين لدى متلقي العلاج المصابين بداء الكلية المتعددة الكيسات)، لوراسيدون (لعلاج الاكتئاب)، ڤينيتوكلاكس (لعلاج متلقي العلاج المصابين بابيضاض الدم الليمفاوي المزمن- CLL).

قبل العلاج بڤوريكونازول تيڤع، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي على مستحضرات من فصيلة الأزولات.
- كنت تعاني من مرض في عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب)، نظم قلبي غير منتظم أو بطيء، أو من شذوذ في مخطط كهربية القلب (إي كي چي) يسمى "متلازمة QTc الطويلة".
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من مرض في الكبد. سيراقب الطبيب وظائف الكبد عن طريق إجراء فحوص للدم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- يجب الامتناع عن أي ضوء شمس وعن التعرّض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واق ذي معامل وقاية (SPF) عالٍ، لأنه قد تزداد حساسية الجلد لإشعاع الشمس (UV). ينطبق هذا التحذير أيضًا على الأولاد.
- أثناء استعمال الدواء، أخبر الطبيب بشكل فوري إذا تطور لديك: حرق شمسي، طفح جلدي شديد أو حويصلات في الجلد، آلام في العظام.
- إذا ظهر أحد هذه الأعراض الجلدية، فقد يحيلك الطبيب إلى طبيب الجلد. هناك احتمال ضئيل لتطور سرطان الجلد عند الاستعمال الطويل الأمد لڤوريكونازول تيڤع.
- إذا تطورت لديك علامات على "فشل الغدة الكظرية"، وهي حالة طبية لا تقوم الغدتان الكظريتان فيها بإنتاج كميات كافية من هرمونات ستيرويدية معينة مثل كورتيزول، مما قد يسبب أعراضًا مثل التعب المزمن أو المتواصل، ضعف العضلات، فقدان الشهية، نقصان الوزن، آلام البطن، فيرجى إخبار الطبيب.
- إذا تطورت لديك أعراض لـ"متلازمة كوشينج" التي يُنتج الجسم فيها فائضًا من هرمون الكورتيزول الذي قد يؤدي إلى أعراض مثل: ارتفاع الوزن، نسيج دهني بين الكتفين، وجه مستدير، اغمقاق الجلد في البطن، الركبتين، الثديين والذراعين، جلد رقيق، ميل إلى التكدم بسهولة، سكر مرتفع في الدم، فرط الشعر، فرط التعرّق، فيرجى إخبار الطبيب.
- سيراقب الطبيب وظائف الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم خلال فترة العلاج بڤوريكونازول تيڤع.
- قبل البدء بالعلاج وخلاله يجب إجراء مراقبة للاضطرابات في مستويات الكهارل مثل المستويات المنخفضة للبوتاسيوم، المغنيزيوم والكالسيوم.

الأولاد والمراهقون
هذا الدواء غير مخصص للأولاد والأطفال الرضع الذين عمرهم أقل من عامين.

الفحوص والمتابعة
بما أن ڤوريكونازول تيڤع يؤثر على الكبد والكليتين، فسيراقب الطبيب وظيفة الكبد والكليتين عن طريق إجراء فحوص الدم. يرجى إخبار الطبيب إذا أحسست بآلام البطن أو إذا كان هناك تغير في قوام البراز.

التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصةً إذا كنت تستعمل:
أدويةً يجب الامتناع قدر الإمكان عن استعمالها بالدمج مع ڤوريكونازول تيڤع وهناك حاجة إلى ملاءمة الجرعة الدوائية إذا تم إعطاؤها سويةً معه:

- فينيتوئين (لعلاج الصرع). إذا كنت تستعمل هذا الدواء فيجب مراقبة مستوى فينيتوئين في الدم.
- ريتونافير (لعلاج HIV) بجرعة دوائية منخفضة مقدارها 100 ملغ مرتين في اليوم. لا يمكن تناول جرعات دوائية معينة من ريتونافير مع ڤوريكونازول تيڤع. انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.
- چلاسديچيب (لعلاج السرطان) - إذا كان عليك استعمال الدواءين، فسيراقب طبيبك نظم القلب في أحيان أكثر تقاربًا. دمج ڤوريكونازول تيڤع مع الأدوية التالية قد يتطلب ملاءمة الجرعة الدوائية والمتابعة للتأكد من أن الأدوية و/أو ڤوريكونازول تيڤع لا تزال ذات التأثير المرغوب به:
- وارفارين ومضادات التخثر الأخرى (مثل فينپروكومون، أسينوكوماروِل)
- سيكلوسپورين، تاكرولیموس (للمرضى الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- أدوية من نوع سولفونيل يوريا (مثل تولبوتاميد، چليپيزيد وچليبوريد) (لعلاج السكري)
- ستاتينات (مثل أتورڤاستاتين، سيمڤاستاتين، لوڤاستاتين) (لخفض مستويات الكوليسترول)
- بينزوديازپينات (مثل ميدازولام، ألپرازولام وتريازولام) (لعلاج الأرق الشديد وللتهدئة)
- أوميپرازول (لعلاج قرحة المعدة)
- حبوب منع الحمل (قد تنشأ أعراض جانبية مثل الغثيان والاضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشتقات ڤينكا (مثل ڤينكريستين، ڤينبلاستين) (لعلاج السرطان)
- مثبطات تيروزين كيناز (مثل: أكسيتينيب، بوسوتينيب، كابوزانتينيب، سيريتينيب، كوبيميتينيب، دابرافينيب، دازاتينيب، نيلوتينيب، سونيتينيب، إيبروتينيب، ريبوسيكليب) (لعلاج السرطان)
- تريتينوين (لعلاج ابيضاض الدم)
- إيندیناڤير والمثبطات الأخرى للإنزيم HIV پروتياز (لعلاج HIV)
- أدوية من فصيلة NNRTI لعلاج HIV (مثل ديلاڤيردين، نيڤيراپين، إيفاڤيرينز) لا يمكن تناول جرعات دوائية معينة من إيفاڤيرينز مع ڤوريكونازول تيڤع، انظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند)
- ميثادون (لعلاج الإدمان)
- الأفيونات القصيرة الأمد (مثل ألفينتانيل، فينتانيل، سوفينتانيل) (مسكنات للآلام في الإجراءات الجراحية)
- أوكسيكودون وهيدروكودون (لتسكين الآلام المتوسطة إلى الشديدة)
- أدوية مضادة للالتهاب لاستيرويدية (مثل إيبوپروفين وديكلوفيناك) (لعلاج الألم والالتهاب)
- فلوكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية)
- إيڤيروليموس (لعلاج السرطان المتقدم في الكلية ومتلقّي العلاج الذين خضعوا لزراعة الأعضاء)
- ليتيرموڤير (لمنع مرض يسببه الڤيروس المضخم للخلايا (CMV) بعد زراعة النخاع العظمي)
- إيڤاكافتور (لعلاج التليف الكيسي (CF))
- فلوكلوكساسيلين (مضاد حيوي يُستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية)

للحصول على قائمة الأدوية التي لا يجوز استعمالها بالتزامن مع ڤوريكونازول تيڤع، انظر رجاءً "لا يجوز استعمال الدواء إذا" في هذا البند.

الحمل والإرضاع
لا يجوز استعمال الدواء إذا كنتِ حاملًا، إلا إذا تلقيتِ تعليمات صريحة من الطبيب. يجب على النساء في سن الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل أثناء استعمال الدواء. إذا حملتِ أثناء استعمال ڤوريكونازول تيڤع فراجعي طبيبك فورًا.
إذا كنتِ حاملًا أو مرضعًا، تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، فاستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء.

السياقة واستعمال الماكنات
قد يسبب ڤوريكونازول تيڤع تشوشًا في الرؤية أو حساسية للضوء. إذا تأثرت من ذلك فلا يجوز السياقة أو تشغيل الماكنات الخطرة. بالنسبة للأولاد فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء

- يحتوي القرص على اللاكتوز ولذلك إذا أخبرك الطبيب بأن لديك عدم تحمّل لسكريات معينة، فراجع الطبيب قبل استعمال الدواء.
- يحتوي القرص على أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) من الصوديوم، أي أنه يُعتبر "خاليًا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب.
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.
الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. سيتم تحديد الجرعة الدوائية استنادًا إلى وزنك وإلى نوع التلوث.
اعتمادًا على استجابتك للعلاج، قد يرفع الطبيب أو يخفض الجرعة الدوائية اليومية.
إذا كان لديك مرض في الكبد، فقد يقلل الطبيب جرعتك الدوائية.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!
إذا كنت تستعمل أو كان ولدك يستعمل ڤوريكونازول تيڤع لمنع التلوثات الفطرية، فقد يوقف الطبيب العلاج إذا نشأت لديك أو لدى ولدك أعراض جانبية مرافقة للعلاج.

- يجب إعطاء الأقراص فقط إذا كان الولد قادرًا على بلع الأقراص.

يجب تناول القرص قبل وجبة الطعام بساعة أو بعدها بساعة على الأقل. يجب بلع القرص بأكمله مع القليل من الماء.
عند عدم وجود خط للشطر - يُمنع شطر القرص. لا تتوفر معلومات بالنسبة للهرس/المضغ.

إذا تناولت خطأً جرعةً دوائية أكبر من اللازم
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجّه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. قد تشعر بحساسية متزايدة للضوء نتيجةً للتناول المفرط.

إذا نسيت تناول الدواء
من المهم تناول الدواء كل يوم في نفس الساعة.
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناوَل الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن استعمال الدواء
يجب الاستمرار في استعمال الدواء إلى أن يرشدك الطبيب إلى التوقف عن ذلك. إذا توقفت عن استعمال الدواء في وقت مبكر، فقد يستمر التلوث لديك أو قد يعاودك. قد يتطلب الأمر علاجًا طويل الأمد لمنع معاودة التلوث لدى متلقي العلاج ذوي الجهاز المناعي المضعّف أو المصابين بتلوثات صعبة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع المُلصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال ڤوريكونازول تيڤع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.
أعراض جانبية خطيرة - يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب في الحالات التالية:

- طفح جلدي
- يرقان؛ تغير في نتائج فحص وظائف الكبد في فحص الدم
- التهاب في البنكرياس (پانكرياتيتيس)

أعراض جانبية أخرى
أعراض جانبية شائعة جدًا (قد تظهر لدى أكثر من شخص 1 من بين 10 أشخاص):

- خلل في الرؤية (تغيرات في الرؤية، بما في ذلك: رؤية مشوّشة، تغيرات في الألوان، حساسية متزايدة للضوء، عمى الألوان، خلل في العين، رؤية هالة ضوئية، عمى ليلي، اهتزازية في الرؤية، رؤية شرارات، رؤية أورة، انخفاض في حدة الرؤية، إبهار ضوئي، تقليص مجال الرؤية، بقع/نقاط في مجال الرؤية)
- حمّى مرتفعة
- طفح جلدي
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- انتفاخ في الأطراف
- آلام البطن
- صعوبات في التنفس
- ارتفاع في أنزيمات الكبد

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 10 أشخاص):

- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب في اللثة، قشعريرة، ضعف
- مستوى منخفض، يشمل المستوى المنخفض بشكل خطير، لجزء من خلايا الدم الحمراء و/أو البيضاء (أحيانًا مصحوب بالحمّى)، مستوى منخفض للصفائح الدموية التي تساعد على تخثر الدم
- مستوى منخفض للسكر في الدم، مستوى منخفض للبوتاسيوم في الدم، مستوى منخفض للصوديوم في الدم
- قلق، تململ، اكتئاب، ارتباك، صعوبات في النوم، هلوسات
- اختلاجات، ارتجاف أو حركات لا إرادية في العضلات، إحساس بالوخز أو أحاسيس جلدية غير عادية، ارتفاع في التوتر العضلي، ميل إلى النوم، دوار
- نزيف دموي في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك النبض السريع/البطيء جدًا، إغماء
- ضغط دم منخفض، التهاب الأوردة (الالتهاب الوريدي)
- صعوبات شديدة في التنفس، ألم في الصدر، انتفاخ في الوجه (الفم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين
- إمساك، صعوبات في الهضم، التهاب في الشفتين
- يرقان، التهاب في الكبد (هيپاتيتيس) وتضرر الكبد
- طفوح جلدية قد تسبب تقشّرًا خطيرًا في الجلد وحويصلات جلدية تتميز بمنطقة حمراء ومسطحة في الجلد ومغطاة بنتوءات صغيرة متصلة ببعضها، احمرار الجلد
- حكّة
- تساقط الشعر
- ألم في الظهر
- فشل كلويّ، دم في البول، تغيرات في فحوص وظيفة الكليتين

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 100 شخص):

- أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تهيج والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب في الجهاز الهضمي يسبب الإسهال، التهاب الأوعية الليمفاوية
- التهاب في النسيج الدقيق الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يغطي التجويف البطني
- غدد ليمفاوية متضخمة (أحيانًا مؤلمة)، فشل النخاع العظميّ، ارتفاع في مستوى اليوزينيات في الدم
- انخفاض في وظيفة الغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية
- وظيفة غير سوية للدماغ، أعراض شبيهة بالپاركينسون، تضرر عصبي يسبب الخدر، الألم، الوخز أو الإحساس بالاحتراق في الأطراف
- مشكلة في التوازن أو في التناسق الحركي
- انتفاخ في الدماغ
- رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين تشمل: ألمًا والتهابًا في العينين والأجفان، حركية غير عادية للعين، ضررًا للعصب البصري يسبب اضطرابًا في الرؤية، انتفاخًا في القرص البصري
- انخفاض في الحساسية للمس
- تغير في حاسّة الذوق
- اضطرابات في السمع، طنين في الأذنين، ڤيرتيچو (شعور بالدوار)
- التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، انتفاخ والتهاب في اللسان
- تضخم الكبد، فشل كبديّ، حصى أو مرض في حويصلة المرارة
- التهاب المفاصل، التهاب الأوردة المصحوب بتكوّن خثرة دموية (خثار)
- التهاب في الكلية، پروتين في البول، ضرر للكلية
- نظم قلبي سريع جدًا أو إنقاص دقات - مصحوب أحيانًا بتدفعات كهربائية غير ثابتة
- تغيرات في مخطط كهربية القلب
- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ارتفاع في مستوى اليوريا في الدم
- ردود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الحالات الجلدية التي تشكّل خطرًا على الحياة وتسبب ظهور حويصلات مؤلمة، جروح/تأليل في الجلد والأغشية المخاطية، خاصةً في الفم، التهاب الجلد، شرى، حروق شمسية أو ردود فعل جلدية خطيرة نتيجةً للتعرض للضوء أو للشمس، جلد محمرّ ومتهيج، بقع حمراء أو بنفسجية في الجلد في أعقاب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، إيكزيما
- رد فعل تحسسي أو رد فعل شاذ للجهاز المناعي

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى شخص 1 كحدّ أقصى من بين 1,000 شخص):

- فرط نشاط الغدة الدرقية
- تدهور الوظيفة الدماغية (من المضاعفات الخطيرة لمرض في الكبد)
- ضرر شديد للعصب البصري، تعكر في القرنية، حركات لا إرادية للعينين
- ظهور حويصلات نتيجةً للحساسية/التعرض للضوء
- اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي في الجسم جزءًا من الجهاز العصبي المحيطي
- مشاكل في نظم أو موصلية القلب (أحيانًا تشكّل خطرًا على الحياة)
- رد فعل تحسسي يشكّل خطرًا على الحياة
- اضطراب في نظام التخثر في الدم
- ردود فعل تحسسية في الجلد (خطيرة أحيانًا) بما في ذلك الانتفاخ السريع (وذمة) في الجلد، بقع مثيرة للحكة أو مؤلمة من الجلد السميك، المحمرّ مع القشرة، حكة في الجلد والأغشية المخاطية - حالة جلدية تشكّل خطرًا على الحياة وتسبب انفصال أجزاء واسعة من الأدمة (طبقة الجلد الخارجية) عن طبقات الجلد السفلية
- بقع جلدية صغيرة، جافة وحرشفية، أحيانًا متغلظة مع "قرون"

أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد):

- نمش وبقع تصبّغ

أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعها بعد)، لكنها مهمة ويجب التبليغ عنها للطبيب المعالج بشكل فوري:

- سرطان الجلد
- التهاب النسيج المحيط بالعظم
- مناطق حمراء ومتقشرة في الجلد أو كدمات في الجلد شكلها شبيه بالحلقة وقد تكون عرضًا لمرض مناعي ذاتي يسمى الذئبة الحمامية الجلدية

تتواجد تبليغات عن تطور سرطان الجلد لدى متلقي العلاج الذين استعملوا ڤوريكونازول لفترة طويلة.
شوهد حرق شمسي أو رد فعل جلدي خطير، نتيجةً للتعرض للضوء أو الشمس، بشيوع أكبر لدى الأولاد. إذا نشأت لديك/لدى ولدك اضطرابات في الجلد، فقد يحيلك طبيبك المعالج إلى طبيب الجلد، والذي سيقرر بعد المشورة ما إذا كان من المهم أن تحضُر/يحضر ولدك للمتابعة على أساس دائم. شوهد أيضًا ارتفاع في إنزيمات الكبد بشيوع أكبر لدى الأولاد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك سنمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- **يجب التخزين في درجة حرارة دون 25°C.**

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:
Lactose monohydrate, pregelatinised maize starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
قرص مطلي، أبيض، مطوّل، على أحد جانبيه مطبوع "V" وعلى الجانب الآخر "200".
يُسوق الدواء في عبوة بليستر (شرائط حويصلات) تحتوي على 14، 28 أو 30 قرصًا مطليًا.
قد لا تُسوق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه:
تيڤع إسرائيل م.ض.
شارع دڤوره هانيڤيئه 124، تل أبيب 6944020

تم تحرير النشرة في أيلول/سپتمبر 2023 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
168-68-36179-00
من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

VORICONAZOLE TABS PIL MW0923

teva