

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירום) התשמ"ג – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריבלסוא 3 מ"ג

ריבלסוא 7 מ"ג

ריבלסוא 14 מ"ג

טבליות

חומר פעיל:

ריבלסוא 3 מ"ג: כל טבליה מכילה ס מגלאוטיד 3 מ"ג (semaglutide 3 mg)

ריבלסוא 7 מ"ג: כל טבליה מכילה ס מגלאוטיד 7 מ"ג (semaglutide 7 mg)

ריבלסוא 14 מ"ג: כל טבליה מכילה ס מגלאוטיד 14 מ"ג (semaglutide 14 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה בפרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קראו בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו גרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ריבלסוא מיועדת לטיפול במוגרים החוליםם בסוכרת מסוג 2 שאינה מאוזנת במידה מספקת לשיפור האיזון ברמת הסוכר בנוסף למשטר תזונתי ופעולות גופניות:

- כתרופה ייחודית – כאשר טיפול במטרופרמין אינו מתאים עקב אי סבירותו או התוויות נגד לשימוש.
- יחד עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת.

חשוב שתתmeshיך בתכנית התזונה והפעולות הגוףוניות כפי שהוסכם עם הרופא, הרוקח או האחות.

קבוצה טיפולית: תרופות לסוכרת. אנלוג ל-1 GLP-1 (Glucagon-like peptide-1).

מהי סוכרת מסוג 2?

סוכרת מסוג 2 היא מצב שבו גופך אינו מייצר אינסולין בכמות מספקת, והאינסולין שי מיוצר אינו מוריד את הסוכר בדם במידה הנדרשת. במקרים מסוימים, גופך יכול לייצר יותר מדי סוכר בדם. אם הסוכר בדם עולה ונוטר ברמה גבוהה למשך זמן רב, הדבר עלול להוביל להשפעות מזיהקות כמו בעיות לב, מחלת כליאות, הפרעות בעיניים וזרימת דם לא מספקת לאגן. מסיבה זו, חשוב לשמור שרמות הסוכר בדם יהיו בתחום התקין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- | |
|--|
| • אתה רגיש (אלרגי) לס מגלאוטיד, או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוספת"). |
|--|

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בריבלסוא שוחח עם הרופא שלך.

ازהרות כלליות:

- תרופה זו אינה זהה לאינסולין ואין להשתמש בה אם:
- יש לך סוכרת סוג 1 (גופר אינו מייצר אינסולין כלל)
 - אתה מפתח קמצת קטוטית (קטואצידזיט) סוכרתית. זהו סיבור של סוכרת הכרוך בסוכר גובה בدم, קשיי נשימה, הבלבול, צמא מוגבר, ריח נשימה מתוק או טעם מתוק או מתכתית בהפה.

בעיות בבטן ובקיבה והתייבשות
במהלך הטיפול בתרופה זו, יתכן שתרגיש בחילה או תקיא, או שהיה לך שלשול. תופעות אלו יכולות לגרום להתייבשות (איבוד נזלים). חשוב שתשתנה נזלים בכמות מסוימת כדי למנוע התאייבשות. זה חשוב במיוחד אם יש לך בעיות בכליות. שוחח עם הרופא אם יש לך שאלות או חששות.

כאב בטן חמוץ ומתחשר העול מהיגרם מדלקת לבלב
אם יש לך כאב חמוץ ומתחשר באזורי הבطن – פנה מיד לרופא, מפני זהה עלול להיות סימן של דלקת לבלב (דלקת לבלב חריפה).

סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה)
נטילת תרופה ממפחחת סולפונילאוריאה או אינסולין יחד עם ריבלוסו עלולה להגבר את הסיכון לסוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה). ראה פרק 4 את סימני האזהרה לרמות סוכר נמוכות בדם.

הרופא שלך עשוי לבדוק מכך לבדוק את רמות הסוכר בדמך. זה ישיע להחליט אם יש צורך לשנות את מנת הסולפונילאוריאה או האינסולין כדי להפחית את הסיכון של סוכר נמוך בדם.

מחלמת עיניים סוכרתית (רטינופתיה)
шибורים מהירים באיזון הסוכר בדם עלולים להוביל להחמרה זמנית במחלת עיניים סוכרתית. אם יש לך מחלת עיניים סוכרתית אתה חוויה בעיות עיניים במהלך השימוש בתרופה זו, פנה לרופא שלך.

תגובה לטיפול
אם התגובה לטיפול בסמגלאוטיד פחותה מהצפוי, יתכן שהסיבה לכך היא ספייגה נמוכה הנגרמת משינוי בספייגה ומרמה נמוכה של זמינות ביולוגית מוחלטת. עליך לפעול בהתאם להוראות בפרק 3 לקבלת השפעה מיטבית של סמגלאוטיד.

ילדים ומתתברים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתתברים מתחת לגיל 18 מפני שהbettichות והיעילות בקבוצת גיל זו לא הוכחו.

תגובהות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- לبوتירוקסין, המשמש לטיפול במחלת בלוטת התריס. הסיבה היא שייתכן כי הרופא שלך יctrarך לבדוק את רמת הפעילות של בלוטת התריס שלך אם אתה משתמש בריבלוסו יחד עם לבוטירוקסין.
- וארפרין או תרופות דומות הנלקחות דרך הפה להחחתת קרישיות הדם (נוגדי קרישה פומיים). יתכן שתצטרכך בבדיקות דם תכופות כדי לבדוק באיזו מהירות דם נקרש.
- אם אתה משתמש באינסולין, הרופא שלך יגיד לך איך להפחית את מנת האינסולין וימליך לך לעקוב אחר הסוכר בדמך בתדירות גבוהה יותר, כדי להימנע מהיפרגליקמיה (סוכר גובה בדם) ומהמצטקת קטוטית סוכרתית (סיבור של סוכרת המתרחש כאשר הגוף לא מסוגל לפרך גלוקוז כי אין מספיק אינסולין).

שימוש בתרופה ומזון
יש ליתול את התרופה על בטן ריקה עם מעט מים (עד 120 מ"ל). יש להמתין לפחות 30 דקות לפני אכילה או שתיה לאחר נטילת התרופה. המתנה של פחות מ-30 דקות מפחיתה את הספייגה של סמגלאוטיד.

הרין והנקה
אם את בהריון או מיניקה, חשבת שאתה בהריון או מתכנתה בהריון, היועץ ברופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

אין להשתמש בתרופה זו במהלך ההריון, מפני שלא ידוע אם היא עלולה להשפיע על העובר. لكن, מומלץ להשתמש באמצעות מניעה במהלך הטיפול בתרופה זו. אם ברצונך להרות, דברי עם הרופא שלך כיצד לשנות Rybelsus IL PIL NOV23 – notification

את הטיפול שלך, מאחר ועליך להפסיק ליטול תרופה זו חודשים מראש לפחות. אם הרǐת בזמן שתתמלט תרופה זו, דברי מיד עם הרופא שלך, מפני שהיא צריכה לשנות את הטיפול שלך.

אל תשתמשי בתרופה זו אם את מיניקה, מפני שלא ידוע אם היא עוברת בחלב אם.

נהיגה ושימוש במכונות לא סביר שלריבلسו יש השפעה על יכולת הנהוג ולהשתמש במכונות.

חלק מהמתופלים עלולים להרגיש סחרחות כאשר הם נוטלים ריבلسו. אם אתה מרגיש סחרחות עלייה להיות זהיר במיוחד בעת נהיגה או שימוש במכונות. שוחח עם הרופא שלך למידע נוסף.

אם אתה משתמש בתרופה זו בשילוב עם תרופה משפחת הסולפוניילוריאה או אינסולין, עלול להתפתח מצב של סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) אשר עלול לגרום ביכולה הרכוץ שלך. אל תנגן ואל תשתמש במכונות אם יש לך סימנים של סוכר נמוך בדם. עיין בפרק 2 בסעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" למידע על סיכון מוגבר לסוכר נמוך בדם, ובפרק 4 ליתמי האזהרה של סוכר נמוך בדם. פנה לרופא שלך לקבלת מידע נוסף.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה 23 מ"ג גנרטן (הרכיב העיקרי במלח בישול/שולחן) בכל טבלייה. תכולה זו שווה-ערך ל- 1% מהצריכה המרבית היומית המומלצת של נתן עבור מבוגר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
 - המננה ההתחלטיבית היא טבלייה אחת של 3 מ"ג פעמיים ביום, למשך חדש אחד.
 - לאחר חדש אחד, הרופא יעלה את המננה לשך ל- 7 מ"ג פעמיים ביום.
 - הרופא עשוי להעלות את המננה לשך ל- 14 מ"ג פעמיים ביום, אם הסוכר בדרך אין מazon בצורה מספקת על ידי מנה של 7 מ"ג פעמיים ביום.

הרופא ייתן לך מרשם עבור החזק המתאים לך. אל תנסה את המננה שלך אלא אם כן הרופא שלך הורה לך לעשות זאת. לא מומלץ ליטול שתי טבליות של 7 מ"ג כדי לקבל את ההשפעה של טבליית 14 מ"ג אחת, מפני שהדבר לא נחקר.

אין לעבור על המננה המומלצת.

אופן נטילת התרופה

- קח את טבליית ריבلسו על בטן ריקה בזמן כלשהו במהלך היום.
- בלע את טבליית ריבلسו בשלמותה עם מעט מים (עד 120 מ"ל).
- לאחר שנטلت את טבליית ריבلسו, המתן 30 דקות לפחות לפני אכילת ארוחה או שתיית משקה, או לפני שתיקח תרופות אחרות דרך הפה.

כתיישה/חציה/לעיסה
לא מומלץ לחלק, למעור או ללווע את הטבלייה, מפני שלא ידוע אם הדבר משפיע על הספיגה של סמגולוטיד.

אם נטلت בעוטה מינון גבוה יותר

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות נטלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו. יתכן שייהיו לך תופעות לוואי כמו בחילה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול מנת של התרופה, דלג על המנה שנשכח וקח את המנה הבאה למשך זמן הרגיל.
יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם תפסיך להשתמש בתרופה, רמת הסוכר בدمך עלולה לעלות.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התוויות והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה **זקוק להם**.
אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בריבلسוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות לוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי חמורות

- **תופעות לוואי שכיחות** (יכולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)
- סיבוכים של מחלת עיניים סוכרטית (רטינופתיה). **עליך לדוחה לרופא** אם אתה מפתח בעיות עיניים, כמו שינוים בראיה, במהלך הטיפול בתרופה זו.

תופעות לוואי נדירות (יכולות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 משתמשים):

- תגבות אלרגיות חמורות (>tagבות אנafilktיות). עליך לפנות לקבלת סיוע רפואי מיידי ולידע מיד את הרופא אם יש לך תסמינים כמו בעיות נשימה, נפיחות של הפנים והגרון, צפצפים, קצב לב מהיר, עור חיוך וקר, תחושת סחרורת או חולשה.
- דלקת בלבל (דלקת בלבל חריפה) עלולה לגרום כאב חריף בבטן ובגב שאינו חולף. עליך להגיע לרופא מייד אם הבנתה בתסמינים אלה.

תופעות לוואי אחרות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (יכולות להשפיע על יותר מ-1 מתוך 10 משתמשים)

- בחילה – בדרך כלל חולפת עם הזמן
- שלשול – בדרך כלל חולף עם הזמן
- סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) – כאשר משתמשים בתרופה זו יחד עם תרופות אחרות ממפחית סולפונילאוריאה או אינסולין. הרופא שלך עשוי להפחית את המנה של תרופות אלה לפני שתתחליל להשתמש בריבلسוס.

סימני האזהרה של סוכר נמוך בדם יכולים להופיע בפתאומיות. הם יכולים לכלול: **zieha קרה, עור חיוך וקריר, כאב ראש, קצב לב מהיר, בחילה או תחושת רעב מוגברת, שינוים בראיה, תחושת ישנות או חולשה, תחושת עצבנות, חרדה או בלבול, קשי ריכוז או רעדות.** הרופא שלך יכול לטפל בסוכר נמוך בדם ומה לעשות אם תבחן בסימני אזהרה אלה.

תופעות לוואי שכיחות (יכולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- סוכר נמוך בדם (היפוגליקמיה) כאשר משתמשים בתרופה זו יחד עם תרופה לסוכרת הנלקחת דרך הפה שאינה סולפונילאוריאה או אינסולין.
- הקאות
- בעיות בקיבה או קשיי עיכול
- דלקת קיבה (גסטרייטיס) – הסימנים כוללים כאב בطن, בחילות או הקאות
- החזר קיבתי ושתוי (רפלווקס או צרבת)
- כאב בطن
- נפיחות של הבطن
- עצירות
- עייפות
- ריזידה בתיאבן
- גזים
- עליה באנזימי הלבלב (כמו ליפאצ ועמילאצ) הנראית בבדיקות דם.
- הרגשת סחרורת

תופעות לוואי שאין שכיחות (יכולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 משתמשים)

- ירידה במשקל
- אבנים במרה
- גיהוקים
- דופק מהיר
- תגבות אלרגיות כמו פריחה, גרד או חרלהת האטה בריקון הקיבה
- שינוי בטעםם של מזון ומשקאות.

אם הופיעה תופעת לוזאי, אם אחת מתופעות הלוזאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוזאי שלא ציינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוזאי

ניתן לבדוק על תופעות לוזאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוזאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדיוח על תופעות לוזאי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי המגשית והאריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

אחסן באזיזה המקורית כדי להגן מפני אור ולחות. יש לשמר בטמפרטורה עד C°30. אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח שלך כיצד להשילר תרופות שאין משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו לשמירה על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
salcaprozate sodium, cellulose microcrystalline, magnesium stearate, povidone K90

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
 ריבלסוס 3 מ"ג: טבליות אוביוליות (7.5 מ"מ x 13.5 מ"מ) בצדע לבן עד צהבהב. בצדן האחיד מופיעה הספרה '3', ובצדן השני 'סוכח'.
 ריבלסוס 7 מ"ג: טבליות אוביוליות (7.5 מ"מ x 13.5 מ"מ) בצדע לבן עד צהבהב. בצדן האחיד מופיעה הספרה '7', ובצדן השני 'סוכח'.
 ריבלסוס 14 מ"ג: טבליות אוביוליות (7.5 מ"מ x 13.5 מ"מ) בצדע לבן עד צהבהב. בצדן האחיד מופיעה הספרה '14', ובצדן השני 'סוכח'.
טבליות זמניות במגשיות אלומיניום.
 טבליות ריבלסוס 3 מ"ג זמניות באזיזה של 30 טבליות.
 טבליות ריבלסוס 7 מ"ג ו- 14 מ"ג זמניות באזיזות של 30 ו-90 טבליות.

יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקים.

שם בעל הרישום וכתובתו:
 נבו נורדיסק בע"מ,
 רח' עתיר ידע 1,
 כפר-סבא 4464301

שם היצרן וכתובתו:
 נבו נורדיסק אי.אס, נבו אלה, ד.ק" – 2880 בגסورد, דנמרק.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ריבلسו 3 מ"ג: 166-72-36539

ריבلسו 7 מ"ג: 166-73-36540

ריבلسו 14 מ"ג: 166-74-36541

לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נושא בלשון זכר, על אף זאת התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Rybelsus IL PIL NOV23 – notification

Rybelsus IL PIL NOV23 – notification