

General guidance - Please show this card to any doctor or healthcare professional involved in your medical care (e.g. in case of an emergency).

Important side effects - This drug may affect your liver function and certain cells in your blood that are important to fight infections. Therefore, a blood test and blood pressure should be checked before the start of the treatment and regularly thereafter.

If you have any of the following side effects, please contact your doctor immediately:

- Your skin or the whites of your eyes turn yellow, dark urine, nausea or vomiting and abdominal pain. In this case you may have a problem with your liver.
- High fever, shaking, chills, swollen glands, reduced or painful urine flow, or confusion. In this case you may have an infection.

For female patients only: Pregnancy

- Do not start **Teriflunomide Taro** when you are pregnant, or you think you may be pregnant.

Your doctor may ask you to do a pregnancy test to make sure.

- Use reliable contraception while using **Teriflunomide Taro**.
- If you become pregnant or think you are pregnant, **contact your doctor immediately**.
- In case of pregnancy, your doctor may suggest treatment with certain medicines to remove **Teriflunomide Taro rapidly and sufficiently** from your body.
- You should also discuss with your doctor if you plan to or are breastfeeding.

For more information, consult the Patient Information Leaflet (PIL) or call Taro at: 1-800-46-46-64. To report suspected adverse reactions to the Ministry of Health use the on-line form: <https://sideeffects.health.gov.il>

Additionally, you may report directly to Taro: 1-800-46-46-64.

This brochure was approved according to the guidelines of the Ministry of Health in August 2023.

Patient name: _____

Date Teriflunomide Taro was first prescribed: _____

Name of Medical center: _____ Name of Attending doctor: _____

Phone of Attending doctor: _____

טריפלונומיד תרו - כרטיס למטופל

כרטיס למטופל זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת כאשר אתה מקבל טיפול בטריפלונומיד תרו. לקבלת מידע מלא, יש לקרוא את העלון לצרכן.

טריפלונומיד תרו – بطاقة للمتعالج

تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة التي يجب عليك معرفتها عندما تتلقى العلاج بـ تريفلونوميديد تارو. للحصول على معلومات كاملة، يجب قراءة النشرة للمستهلك.

Teriflunomide Taro – Patient Card

This Patient Card contains important safety information you need to be aware of when receiving treatment with Teriflunomide Taro. Please refer to the patient leaflet for complete information.



מידע כללי - אנא הצג כרטיס זה לכל רופא או איש צוות רפואי המעורב בטיפול הרפואי בך (לדוגמה, במצבי חירום).

תופעות לוואי חשובות - תרופה זו עשויה להשפיע על תפקוד הכבד שלך ותאים מסוימים בדם שנלחמים בזיהומים. לכן יש לבצע בדיקת דם ובדיקת לחץ דם לפני תחילת הטיפול ובמהלך הטיפול באופן סדיר.

אם הופיע אצלך אחד מהתסמינים הבאים, פנה בדחיפות לרופא המטפל:

- הצהבה של העור או האזור הלבן בעיניים, שתן כהה, בחילות או הקאות וכאבי בטן. במקרה זה ייתכן שהתפתחה אצלך בעיית כבד.
- חום גבוה, רעד, צמרמורת, בלוטות נפוחות, הפחתה או כאב ברמת השתן או בלבול. במקרה זה, ייתכן שיש לך זיהום.

לנשים בלבד- היריון

- אין להתחיל טיפול בטרופולנומיד תרו אם את בהיריון או שאת חושבת שאולי את בהיריון.
- על מנת לוודא זאת, הרופא שלך עשוי לבקש ממך לבצע בדיקת היריון.
- השתמשי באמצעי מניעה אמין במהלך הטיפול בטרופולנומיד תרו.
- אם נכנסת להיריון או שאת חושבת שאת בהיריון, פני לרופא המטפל שלך מיד.
- במקרה של היריון, הרופא שלך עשוי להמליץ על טיפול תרופתי לפניו מהיר ויעיל של טרופולנומיד תרו מגופך.
- עלייך לשוחח עם הרופא שלך אם בכוונתך להניק או שאת כבר מניקה.

למידע נוסף, יש לעיין בעלון לצרכן או לפנות לחברת תרו: 1-800-46-46-64. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>.

כמו כן ניתן לדווח ישירות לחברת תרו: 1-800-46-46-64.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, כרטיס זה נוסח בלשון זכר. המידע מיועד לבני שני המינים. הכרטיס אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות באוגוסט 2023.

שם המטופל: _____ התאריך שבו ניתן המרשם הראשון לטרופולנומיד תרו: _____

שם המרכז הרפואי: _____ שם הרופא המטפל: _____

מס' טלפון של הרופא המטפל: _____

מידע כללי - ירגי ערש זהה הבטחה לאי טיבב או פרד מן הטאקמ הטבב המטארכ פי עלאכ הטבב (עלי סביל המאל, פי חאלאט הטוארי).

אעראש גאנבניע ממהע - קד יוזרר זהא דווא עלי וזפיעה הכבד לניכ ובעש חלאיה דמ לתי חארב חאלאט העדוי. לנאלכ יגב עירא עפס דמ ופכס צעט דמ קבל עד עע עעל ואתא עעל עבסורה מנתזע.

יזא זפער לניכ אי מן האעראש התאליע, תוגע אל הטבב העעל עשכל עאגל:

- אספרא גלדו או בייאז העינין, בול דאכ, חאלאט עגינאן או תעיזאט ואלמ פי הבטן. פי זהה חאלע, רימא טוכן קד טפזרט לניכ משכלע פי הכבד.
- סכזעה מרעעע, ארעגאפ, טשערייע, אנתאח פי הגעד, קלע או אלמ פי נתפף הבול או ארעכא. פי זהה חאלע, קד טוכן לניכ עדוי.

ללנשא קפץ - החמל

• יזמע עד עעל עב טריפולנומיד תרו יזא כנת חאמל או טענתדין באתך רימא טוכנין חאמל.

• מן אגל התאכד מן לאלכ, קד יזטלב מנכ טבביכ עירא עפס חמל.

• אסעמלי וסיעה מווקע למנע חמל אתא עעל עב טריפולנומיד תרו.

• יזא אסכית חאמל או טענתדין באתך חמל, תוגעי אל הטבב העעל עלי הפזר.

• פי חאלע החמל, קד בוצעי טבביכ בעל ע דואני לטצריפ סריע ונאע ל טריפולנומיד תרו מן גיסק.

• עליכ התכדט מע טבביכ יזא כנת תזיין הרצאע או יזא כנת תרצעין באלפל.

למזיד מן המעלומאט, יגב קראה הנשרה למסעלה במען או תוגע אל שרעה תרו: 1-800-46-46-64.

ימכן התבליע ען אעראש גאנבניע לוזרעה הסעה בואסעה הרעב התאלי: <https://sideeffects.health.gov.il>.

כאלכ ימכן איצנא התבליע מייאשרה לשרעה תרו: 1-800-46-46-64.

לתביט קראה זהה הנשרה וטעיפלה רוד הנצן בציעה המזכר. מע זהא פאלדווא מעד לכלא הגניסין.

תמט המצאקה עלי הבטחה וקף תעלימאט וזרעה הסעה בתריח אב 2023.

אסמ המעעל: _____ התריח הזי אעטיבת פיח הוועפה הטבביע האוליע ל טריפולנומיד תרו: _____

אסמ המרכז הטבבי: _____ אסמ הטבב העעל: _____

רעקם חאטפ הטבב העעל: _____