

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986

يُتوقَّع هذا الدواء بدون وصفة طبيب

بيتي أقراص 262 ملغ Bitni tablets 262 mg

يحتوي كل قرص على: بيسموث سابساليسيلات 262 ملغ

Bismuth Subsalicylate 262 mg

لتفصيل المركبات الأخرى في الدواء انظر البند 6 - معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12. يجب التوجه إلى الطبيب إذا كانت سن متلقي العلاج أقل من 12 عامًا.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الواحدة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد يومين. كذلك يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان الإسهال مصحوباً بالحمى الشديدة، أو إذا نشأ طنين في الأذنين أو فقدان للسمع.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من حالات الإسهال، الغثيان، الغازات، الأم البطن الشرجية، وتقلع المعدة وغسر الهضم. لمنع الإسهال لدى المسافرين.

2. قبل استعمال الدواء:

❌ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.
- لا يجوز الاستعمال عند المعاناة من أمراض مصحوبة بالحمى مثل الإنفلونزا والحمى (جديري الماء) (خوفاً من نشوء متلازمة ريبس).
- كنت حساساً للسالييلات (بما في ذلك الأسبيرين)، أو كنت تستعمل مستحضرات أخرى تحتوي على سالييلات. يحتوي الدواء على سالييلات.
- كنت تعاني من قرحة المعدة، النزيف الدموي، البراز الدموي أو الأسود.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- ❗ قبل البدء بالعلاج ببتي أقراص، أخبر الطبيب إذا:
- كنت حاملاً أو مرضعاً.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (مثل الربو)، الكلية/الجهاز البولي، الجهاز الهضمي (مثل قرحة المعدة)، الجهاز الدموي (مثل التخثر وما إلى ذلك)، النقرس، التحفاف أو إذا كانت لديك حمى.
- كنت حساساً لغذاء ما أو لدواء ما، خاصةً للأسبيرين والسالييلات.
- ❗ لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد والمراهقين الذين لا تتجاوز سنهم الـ 20، الذين يعانون من الإنفلونزا أو الحمى (جديري الماء) أو الحمى أو الذين فقدوا الكثير من السوائل.
- ❗ لا يجوز إعطاؤه للأولاد، والبالغين لعلاج الغثيان العضوي المنشأ.

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد يومين.

❗ لا يجوز استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو لفترة متواصلة دون استشارة الطبيب.

❗ التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

خصوصاً يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل:

- أسبيرين وسالييلاتات
- أدوية مضادة لتخثر الدم
- أدوية مضادة للنقرس مثل بروبيبنسيد أو سولفينبيرازون
- نيتراسيكليبات
- أدوية للسكَّر
- أدوية للتهاب المفاصل (أرثريتينس)

❗ استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدون.

❗ استعمال الدواء واستهلاك الحول:

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء.

❗ الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فيتوجب عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الجرعة الواحدة (قرصين)

فذلك يُعتبر خالياً من الصوديوم.

يحتوي الدواء على Ponceau 4R الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الواحدة ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الواحدة الاعتيادية عادةً هي:

البالغون والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12: قرصان.

الأولاد الذين سنهم دون الـ 12: يجب استشارة الطبيب.

إذا أوصى الطبيب بذلك - الأولاد الذين سنهم دون الـ 9: يوصى باستعمال

بتي المسائل.

بالإمكان تكرار تناول هذه الجرعة الواحدة بحسب الحاجة كل نصف ساعة إلى ساعة، حتى 8 مرات على مدار 24 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية تناول

يجب ابتلاع الدواء مع الماء.

الهرس / التطير / المضغ:

لا يجوز المضغ القرص مخصص للبلع.

لا يجوز شطر القرص بهدف تناول كمية أقل.

على الرغم من ذلك، ومن أجل تسهيل البلع، يمكن هرس/شطر القرص لاستعمال الفوري، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يجب بلع جميع الأجزاء فوراً بعد الهرس/التطير.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية المطلوبة: إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. لا تسبب التقيؤ بدون

تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء: إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟ في حالة الإسهال يجب الأكل من شرب السوائل التي لا تحتوي على الكافيين من أجل التغلب على فقدان السوائل.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تناول فيها الدواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا وفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بيتني أقراص إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

ظهرت الأعراض التالية: ضعف، تشنجات، مشاكل في التنفس، تشوش الرؤية، ارتباك، طنين في الأذنين أو فقدان السمع، إمساك شديد.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا:

ظهرت علامات فرط الجرعة مثل النعاس، الصداع، والإسهال المصحوب بالحمى الشديدة.

قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البراز أو اللسان. لا تستدعي هذه التغيرات الفلأني.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة

المخصصة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد، وأول الأطفال الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على:

Calcium carbonate, Povidone K-25, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose 4910, Magnesium Stearate, Ponceau 4R, Macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

تحتوي العبوة على 2، 7، 10، 15، 20، 30، 50، 60 قرصاً مطلياً وردي اللون، مستديراً ومحتباً من كلا الجانبين.

قد لا تسبب جميع أحجام العبوات.

اسم الجهة المصنعة وصاحب الامتياز وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض، شارع كهيما 3، كريات ملأخي.

تم تحرير هذه النشرة في 11/2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 1406531601

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

